

20437/B

~~Gallego~~
~~1/8~~

22101402488



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30532358_0008

DICTIONNAIRE

RAISONNÉ-UNIVERSEL

DE

MATIERE MÉDICALE,

TOME VIII.

42550
DICTIONNAIRE
RAISONNÉ-UNIVERSEL
DE
MATIERE MÉDICALE,

C O N C E R N A N T

Les Végétaux , les Animaux & les Minéraux qui sont d'usage en Médecine ; leurs descriptions , leurs analyses , leurs vertus , leurs propriétés , &c. recueillis de Manuscrits originaux , & des meilleurs Auteurs anciens & modernes , tant étrangers que de notre pays.

Avec une Table raisonnée de tous les noms que chaque pays a donnés aux mêmes végétaux , animaux & minéraux.

T O M E H U I T I E M E.



A P A R I S ,

Chez P. FRANÇ. DIDOT le jeune , Libraire de la Faculté de Médecine , quai des Augustins.

M. D C C. L X X I I I.

AVEC APPROBATION , ET PRIVILEGE DU ROI.

Call 9
~~15~~





DICTIONNAIRE RAISONNÉ, UNIVERSEL, DE MATIERE MÉDICALE.

U N I

ULMAIRE. *Voyez* REINE DES PRÉS.

UNICORNE. Licorne de mer ; ou Narhwal.
Voyez BALEINE, tom. II. p. 30.

UNICORNE fossile. *Unicornu fossile*, seu *Ebur fossile*, off. Germaniæ. *Lapis ceratites*, GESNER. *Xylostea quadrupedum lapidea*, WALLER. Min.

Substance pierreuse, qui, par sa couleur, sa forme & son poli, paroît représenter la corne, la dent, ou l'os d'un animal. La croûte extérieure est assez dure, jaune, brune ou cendrée ; la substance qui se trouve au centre est compacte, molle, friable, astringente, & quelquefois d'une odeur agréable.

Ce sont, à ce qu'il paroît, des pétrifications qu'on tire de la terre en différents endroits, & principalement en Allemagne.

L'unicorne, dit M. VOGEL, n'a pas la dureté de
Tome VIII. A

la pierre; elle est plus ou moins fragile, & comme calcinée. Cette substance (que l'on a estimée beaucoup en Allemagne) possède une vertu astringente, absorbante & dessiccative. On la prescrivoit autrefois à la dose d'un demi scrupule dans les flux de ventre & autres maladies où il faut resserrer. On lui a aussi attribué une vertu bézoardique & sudorifique.

M. GEOFFROI remarque qu'elle contient quelquefois de l'arsenic, ce qui arrive lorsqu'elle est tirée d'une terre arsénicale.

URINE de bouc. *Voyez* CHEVRE, première espèce.

URINE de chien. *Voyez* CHIEN.

URINE humaine. *Voyez* HOMME.

URINE de sanglier. *Voyez* COCHON SAUVAGE.

URINE de singe. *Voyez* SINGE.

URINE de vache, ou Eau de mille fleurs. *Voyez* BŒUF.

URUCU. *Voyez* ACHIOTL.

USNÉE. *Voyez* MOUSSE de crâne humain, n°. V.

UVULAIRE. *Voyez* GANTELÉE.

V

VACHE, femelle du taureau. *Voyez* BŒUF.

VACHE marine. *Voyez* LAMENTIN.

VALÉRIANE des jardins. Valériane franche, ou grande Valériane. *Valeriana hortensis*, off. *Valeriana hortensis*, *Phu folio olusatris*, Dioscoridis, C. B. Pin. & Tourn. Inst. r. h. *Valeriana major odoratâ radice*, J. B. *Phu majus*, sive *Valeriana major*, PARK. *Valeriana vera*, seu *Nardus agrestis*, TRAG. *Phu magnum*, MATTH. *Phu ponticum*,



Valeriana hortensis.

Valeriane des jardins.



Dessiné par M^r de Saxe.

Le Genre par M^r de Saxe.

sive *Valeriana pontica*, TABERN. *Valeriana floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis*, LINN.

Sa racine, qui est de la grosseur d'un pouce, est placée transversalement, & à fleur de terre, ridée, garnie de beaucoup de fibres assez grosses. Sa couleur est jaunâtre ou brune; son odeur est forte & désagréable, & sa saveur aromatique. Il s'en élève d'environ trois pieds des tiges rondes, grêles, creuses, branchues. Ses feuilles naissent opposées deux à deux; les unes sont découpées profondément, & les autres entières. Ses fleurs, qui sont des especes d'ombelles, sont portées sur les sommités des tiges & des rameaux; elles sont petites, d'un blanc purpurin, formant un tuyau évasé, divisé en cinq parties, d'une odeur agréable. A ces fleurs succèdent des graines applaties, oblongues, aigrettées.

On trouve cette plante dans les forêts, parmi les buissons, dans les endroits humides, & même dans les jardins. Elle donne sa fleur en Avril, en Mai & en Juin.

On se sert principalement de sa racine. Elle exhale, dit M. VOGEL, une odeur forte, aromatique, & a une saveur âcre & amere. Elle est résolutive, apéritive, sudorifique, diurétique, purgative même, & contient même quelque chose d'anodyn. Sa décoction faite avec de la biere, est d'un excellent secours contre la cachexie; SPIES, *Diff.* p. 32. contre les fievres intermittentes, la lepre, la passion hystérique, le rhumatisme, & les douleurs arthritiques; *Comm. Norimb.* 1734. p. 374. Outre cela plusieurs ont remarqué qu'elle avoit une vertu antiépileptique; ce que FABIVS COLUMNA, *Phytobas.* p. 120. a reconnu sur lui-même; & RIVIERE, *l. j. c.* 7. 8. PITCARN, *Elem. med.* p. 121;

MEAD , *de imper. sol. & lun. p. m.* 223. BURGRAV , *de aere , aq. & loc. Francof. p.* 110. sur les malades qu'ils ont traités ou vus. Ils la donnoient dans du vin , à la dose de demi-gros , & quelquefois d'un gros & demi. Il est bon cependant d'observer que cette racine ne convient pas dans toutes les especes d'épilepsie , ce qui fait qu'il y a des auteurs qui doutent de cette vertu. (*Breslav. 1718 , menſe Febr.*) BERNARDUS , *chym. Erfar. p.* 107. a même été témoin , après son usage , d'accès très fréquents, quoique dans d'autres malades elle ait eu le succès qu'il en attendoit , *ibid. p.* 187. L'espece d'épilepsie à laquelle il remédie principalement , est celle qui est causée par les vers ; ce que confirment les observations de M. MARCHANT , qui a vu rendre des vers à ceux qui ont été foulagés par l'usage de la valériane ; *mém. de l'acad. des ſc. de Paris, 1706. p.* 430. SPIES , *l. c. p.* 32. a observé que la décoction de la plante nouvelle , faite dans de la biere , procuroit une abondante évacuation par bas ; & que l'eau distillée , qu'on en avoit tirée , avoit guéri une cachexie commençante , accompagnée d'une enflure œdémateuse aux pieds. CAMERARIUS , *Hort. med. p.* 175. vante son extrait comme un remede souverain contre la difficulté & la rétention d'urine.

Extérieurement on fait usage de la poudre de cette racine , comme sternutatoire ; elle facilite l'excrétion de la salive , & est utile contre la foiblesse de la vue ; A. N. C. *vol. iij. obs.* 125. Son eau distillée est aussi d'un bon secours , on s'en sert comme de collyre : enfin la décoction de toutes les parties de la plante est utile contre les ulceres malins.

La racine de valériane fait aussi du bien dans les vapeurs hystériques & hypochondriaques ; mais cet effet n'est pas constant. C'est encore un apéritif béchique & expectorant , qui convient dans l'asthme convulsif ;



Fabiana Sylvestris.
Faleriane Sauvage.



convulsif; non seulement il calme la toux, mais il emporte encore la cause de l'éréthisme.

L'eau distillée de la plante ou de la fleur se prescrit intérieurement jusqu'à cinq onces; l'extrait de la racine, qui mérite d'être employée, se prend à la dose d'un scrupule, & la conserve à celle de deux gros.

II^o. VALÉRIANE sauvage, ou des bois; Valériane commune; petite Valériane. *Valeriana sylvestris*, off. *Valeriana sylvestris major*, C. B. Pin. & TOURN. Inst. r. h. *Valeriana sylvestris magna aquatica*, J. B. *Valeriana sylvestris*, DODON. Pempt. *Phu parvum*, MATTH. *Phu Dioscoridis*, BRUNSF. *Valeriana vulgaris*, TRAGI. *Phu germanicum*, FUCHS. *Valeriana foliis omnibus pinnatis*, LINN.

De sa racine, qui est rampante, blanchâtre, fibreuse, s'élevent de cinq à six pieds des tiges droites, grêles, fistuleuses, cannelées, noueuses, légèrement velues. Ses feuilles ressemblent à celles de l'espece précédente, mais elles sont plus divisées, plus vertes, parsemées de grosses veines, dentelées sur leurs bords, lanugineuses ou velues en dessous. Aux sommités des tiges & des rameaux naissent des fleurs d'un blanc purpurin, lesquelles sont semblables à celles de la valériane des jardins. Les graines, qui leur succèdent, ne different point de celles de la premiere espece.

Cette plante, qui donne sa fleur en Mai & en Juin, se plaît dans les lieux humides, ombrageux, & sur le bord des ruisseaux; on la trouve aussi dans les bois.

On ne remarque aucune odeur dans ses feuilles; mais la racine a en une fort pénétrante, & une saveur aromatique, sur-tout lorsqu'elle est seche. le suc des feuilles rougit assez le papier bleu; celui des racines le rougit beaucoup moins.

Elle possède les mêmes vertus que la précédente. M. VOGEL ajoute qu'elle est un peu inférieure en vertu à la valériane des jardins. On l'emploie communément, dit-il, pour éclaircir la vue & pour dissiper les nuages qui obscurcissent les yeux. Son efficacité est si grande, suivant M. STARCK, *diff* p. 15, que dès le premier jour où l'on a fait usage de sa décoction, on se sent soulagé considérablement.

III^e. VALÉRIANE des prés ou des marais; petite Valériane aquatique. *Valeriana palustris*, off. *Valeriana palustris minor*, C. B. Pin. & TOURNEF. Inst. r. h. *Valeriana minor pratensis vel aquatica*, J. B. *Valeriana minima*, DODON. Pempt. *Valeriana sylvestris minor*, PARK. *Valeriana foliis caulinis pinnatis sexu distincta*, LINN. *Phu minimum palustre sive aquaticum*, nonnullorum.

Sa racine est rampante, menue, blanchâtre garnie de fibres fort menues; il s'en élève d'un pieu une tige noueuse, grêle, anguleuse, rayée. Les feuilles, qui sortent des nœuds de cette tige, sont opposées deux à deux, & découpées jusqu'à la côte & n'ont point de pédicules: les feuilles, qui naissent de la racine, sont portées sur un long pédicule elles sont presque entières & arrondies. Au sommet de la tige croissent en manière d'ombelle de fleurs semblables à la valériane des bois, d'un blanc rougeâtre, lesquelles deviennent des semences aigrettées.

Cette plante, qui fleurit en Avril & en Mai, se trouve dans les lieux humides & marécageux, dans les prés, aux environs de Paris.

On se sert beaucoup moins de cette espèce en médecine, parcequ'elle n'a pas autant de vertu que les deux précédentes.



a. 4.



a. 4.



a. 4.



Valeriane des prés,
Valeriana palustris.



a. 1.



a. 1.

VANILLE. *Vanilla* ; *Vaniglia* ; *Aracus aromaticus* , off. C'est le fruit ou gouffe d'une plante de l'Amérique , qui a été désignée par les botanistes sous ces phrases : *Volubilis siliquosa mexicana foliis plantaginis* , RAI , hist. *Aracus aromaticus* , Tlil-xochitl , seu *Flos niger Mexicanis dictus* , HERNAND. *Vanillas piperis arbori jamaicensis innascens* , PLUCK. Almag. *Epidendron foliis ovato-oblongis , nervosis sessilibus , caulinis , cirrhis spiralibus* , ROYEN. Lugd. *Volubilis siliquosa plantaginis folio* , CATESBY , Carol. *Vanilla flore viridi & albo , fructu nigrescente* , PLUMM. Nov. pl. amer. Voyez la figure de CARDAMOME ; celle de VANILLE y est représentée.

Les racines de cette plante (qui est une espece de liseron) sont presque de la grosseur du petit doigt , dit le pere PLUMIER , longues d'environ deux pieds , s'enfonçant profondément dans la terre , & s'y étendant au large , tendres , succulentes , d'un roux pâle. Il s'en élève une tige grosse comme le doigt , cylindrique , noueuse , qui grimpe jusqu'au haut des arbres. Des nœuds de la tige sortent des feuilles alternes , pointues , assez épaisses , lisses , nerveuses , molles , longues de neuf à dix pouces ; il sort aussi de ces nœuds , ou plutôt de l'aisselle des feuilles supérieures , de longs rameaux qui en produisent d'autres , lesquels donnent naissance eux-mêmes à de plus petits , genouillés , qui portent une fleur irréguliere à six pétales étroits , oblongs , blancs en dedans , verdâtres en dehors. L'embryon qui est long , verd , cylindrique , charnu , devient un fruit mou , charnu , gros comme le petit doigt , sans odeur , noirâtre dans sa maturité , & rempli d'un grand nombre de semences noires.

Cette plante , qui fleurit au mois de Mai , se trouve dans l'isle de saint Domingue ; l'espece qui

croît dans le Mexique produit des fleurs noires , & la gouffe est une d'odeur agréable.

On fait la récolte de cette gouffe depuis la fin de Septembre jusqu'à la fin de Décembre ; on la laisse ensuite sécher pendant quinze ou vingt jours.

On regarde la vanille comme restaurante, échauffante, stomachique. On la dit bonne pour rétablir les forces de l'estomac, pour aider à la digestion, pour dissiper les vents. On veut encore qu'elle soit emménagogue & diurétique, qu'elle facilite l'accouchement. Les Anglois prétendent que c'est un spécifique contre les affections mélancoliques. Elle se prescrit en substance depuis douze grains jusqu'à demi-gros ; & en infusion ou en décoction dans du lait, du petit lait, du vin, de l'eau, ou autre liqueur convenable, jusqu'à la dose de deux gros. Il faut cependant être réservé sur son usage, & ne pas le continuer trop long temps, car elle échauffe les humeurs, & y porte l'incendie.

La vanille est employée sous la forme de trochisque par les Chinois, pour réparer l'épuisement des forces, & remédier aux attaques d'apoplexie, & à leurs suites ; les grands seigneurs des pays orientaux la mêlent avec du tabac, & en prennent la fumée par le moyen d'une pipe, contre la foiblesse de tête, & s'en trouvent bien ; *Append. A N.C. j. p. 121.* On la fait entrer comme analeptique dans la préparation du chocolat.

VANNEAU. *Vanellus*, off. & omnium ferè auctorum. *Capella* & *Parrus*, BELLON. *Capella*, seu *Vanellus*, ALDROV. Ornith. *Vanellus*, sive *Capella*, JONST. *Capella*, sive *Vanellus*, WILLUGHBY, Ornith. *Tringa cristâ dependente, pectore nigro*, LINN. *Gavia vulgaris*, KLEIN. *Parra*, PLINII. *Pavo sylvestris* ; *Kyvitta*, Germanor. *Capra* seu *Capella*

cœlestis, quorumd. Voyez la figure de la HUPPE ; celle du VANNEAU y est représentée.

Cet oiseau, dit WILLUGHBY, est de la grandeur d'un pigeon domestique ; il pèse environ huit onces. Le sommet de la tête est d'un noir luisant ; du derrière de la tête naît une crête, ou huppe, composée de vingt plumes, dont les trois ou quatre antérieures sont beaucoup plus longues que les autres, ayant plus de trois pouces. Sa gorge est noire depuis le bec jusqu'au commencement de la poitrine ; le ventre & la poitrine sont blancs, aussi bien que les plumes inférieures qui recouvrent les ailes ; les plus longues plumes des ailes sont noires, & leurs extrémités blanches : le milieu du dos est d'un verd luisant, semé d'une tache purpurine qui s'étend le long des ailes ; la queue est d'un bai brun. Le bec du vanneau est arrondi, noir, dur, long d'un pouce ; la mâchoire supérieure un peu plus avancée que l'inférieure : quant aux yeux, l'iris est couleur de noisette. Les pieds de l'oiseau sont longs, rougeâtres ou bruns.

La femelle est moins grande que le mâle ; elle a la gorge toute blanche jusqu'au collier. Ses couleurs au reste varient, comme elles varient aussi dans le mâle.

Cet oiseau fait son nid par terre au milieu des champs, & presque à découvert. La femelle pond quatre ou cinq œufs, d'un jaune sale, picotés de taches noires. Un duvet épais recouvre les petits qui ne font qu'éclore, & qui dès ce moment abandonnent le nid & suivent leur mère.

Le vanneau se nourrit d'insectes, qu'il prend en volant ; il mange aussi des vers de terre. En hiver les vanneaux vont par troupes ; il n'en est pas ainsi durant l'été.

Cet oiseau se sert sur toutes les tables. Sa chair

est estimée & se digere aisément ; mais ce qu'elle fournit d'aliment est peu considérable.


Quelques uns l'ont regardé comme aliment médicamenteux ; & on dit que mangé rôti ou bouilli , il purifioit le sang , faisoit couler les urines , fortifioit le cerveau , & remédioit à l'épilepsie. On a encore avancé , trop gratuitement sans doute , qu'après l'avoir desséché & réduit en poudre , il convenoit pour remplir les mêmes vues , & qu'en en donnant un demi-gros ou un gros dans une eau céphalique , il soulageoit les épileptiques.

VEAU. Voyez BŒUF.

VEAU MARIN : ou Phocas. *Phoca* , off. & plurimorum auctorum. *Phoca* , feu *Vitulus marinus* , GESNER , de aquat. ALDROV. & JONST. *Vitulus marinus* , BELLON. *Phoca dentibus caninis teētis* , LINN. *Phoca* , *Vitulus* , feu *Bos marinus* ; *Canis* , feu *Lupus marinus* , nonnullorum.

Ce poisson , tel qu'il se trouve décrit dans les mémoires de l'académie des sciences , avoit le col long , & la tête assez dégagée des épaules. Sa poitrine étoit large ; sa longueur étoit de vingt-huit pouces depuis le museau jusqu'au bout des pieds de derriere , qui , selon la disposition qu'ils ont naturellement dans cet animal , étoient étendus & joints l'un contre l'autre , ayant en cela seulement la forme de la queue d'un poisson ; les doigts de ces pieds n'étoient pas si formés ni si distincts qu'aux pieds de devant ; & ces deux pieds allongés , ainsi qu'ils l'étoient , & ferrés l'un contre l'autre , avoient plutôt la forme de la queue d'un poisson , que celle des pieds des animaux qui en ont , & qui se replient ordinairement sous le ventre : ces pieds étoient semblables à ceux des plongeurs , qui ne peuvent marcher comme les autres oiseaux , en

Phoca, Veau marin.



tenant leur corps parallele à la terre , mais qui sont contraints d'aller droit comme l'homme. L'avant-bras & le coude étoient enfermés sous la peau , il n'y avoit que les pattes qui sortissent dehors : ces pattes , ainsi ferrées & raccourcies , n'ont pas semblé pouvoir servir à la femelle pour embrasser ses petits , ainsi qu'OPPIEN dit qu'elle le fait , lorsqu'elle les mene promener dans la mer : elles paroissent même , ainsi que les pieds de derriere , plus propres à nager qu'à marcher , quoiqu'à la vérité ni les uns ni les autres de ces pieds ne le soient guere pour aller commodément.

La tête n'étoit point courte ni ronde , comme RONDELET la décrit , & son museau étoit assez long pour le faire ressembler à la tête d'un veau ; mais ses yeux étoient cachés , & comme plongés dans une orbite dont le rebord de dessus n'étoit pas relevé comme il l'est au veau. Ses dents étoient longues & aiguës , & ressembloient mieux aux dents d'un loup qu'à celles du veau. Toute sa peau étoit garnie d'un poil court , & fort semblable à celui du veau terrestre , d'une couleur qui tenoit le milieu entre le gris & le fauve , un peu plus déchargé vers le ventre que vers le dos , qui étoit parsemé de taches de la grandeur de l'ongle , de couleur rouge-brun. Sa peau étoit dure & épaisse.


Ce poisson se trouve dans plusieurs mers. On dit que ceux du détroit de Davis parviennent à la grandeur de deux hommes. Ils ont entre la peau & la chair environ quatre doigts d'épais de graisse , qui donne de fort bonne huile. La pêche de la baleine , dit M. ANDERSON , n'étant plus à beaucoup près si avantageuse qu'elle l'étoit autrefois , on tâche de se dédommager dans ces voyages le mieux qu'on peut ; & comme la peau de ce poisson est fort recherchée ,

l'on équipe tous les ans quelques petits bâtiments pour leur faire la chasse. Ces especes de chasseurs marins les surprennent sur la glace quand ils dorment ; ils les tuent avec de gros bâtons en les frappant sur le nez , où ces animaux sont fort sensibles , ou bien ils les percent à coups de lance. Ils sont d'une utilité incroyable aux habitants sauvages du détroit de Davis. La chair leur sert de nourriture ; le sang , de médecine ; la peau d'habillements , & de cordage pour les bateaux ; les tendons & les intestins , de vitrage , de voiles , de fil à coudre & de ficelle à lier ; les os , de toutes sortes d'ustensiles de ménage & de chasse , &c. M. RAY dit avoir appris des habitants du cap de Cornouaille qu'on voit dans cette mer des veaux marins quelquefois de la grandeur d'un taureau de deux ans.

La chair du veau marin , dit LÉMERY , *traité des aliments* , n'est pas à beaucoup près si ferme que celle du lamentin : elle est au contraire si molle , si grasse & si spongieuse , qu'en la pressant longtemps entre les mains , elle se fond presque entièrement. C'est pourquoi elle rassasie très vite , donne des nausées , & produit un mauvais aliment : aussi peu de gens , même de la lie du peuple , en mangent dans les lieux où ce poisson est commun.

La graisse est la seule partie de cet animal qui soit ou puisse être d'usage en médecine. Elle est émolliente , anodyne & anti-hystérique : on en frotte la région de la matrice pour provoquer les regles chez les femmes , & pour calmer les vapeurs. On fait avec la peau des souliers , auxquels on attribue la vertu de préserver de la goutte. Idée chimérique sans doute.

VÉGÉTAL (REGNE). *Regnum vegetabile*. On entend par végétaux , des êtres organisés , capables d'accroissement ,



Velvotte,
Elatine.



d'accroissement, mais qui n'ont ni sentiment ni mouvement bien marqué ou local; ce qui a fait dire qu'ils tenoient le milieu entre les minéraux & les animaux. Ce regne produit bien des genres, qui se divisent en une infinité d'espèces. C'est du regne végétal que presque tous les animaux tirent une partie de leur nourriture : les végétaux fournissent encore quantité de remèdes, plus ou moins efficaces, aussi anciens que la médecine. Ceux qu'on tire du regne minéral ne datent pas d'aussi loin. Quoiqu'Hippocrate & ceux qui l'ont suivi en aient pris de quoi soulager leurs semblables dans leurs maladies, ils avoient beaucoup plus de ressource dans le regne végétal. Aujourd'hui même que la chymie a enrichi la médecine d'une foule de secours qu'elle a sçu se procurer des minéraux, elle emploie encore avec succès toutes les parties des plantes, qui, sans avoir pour l'ordinaire autant d'activité, n'en sont pas moins utiles dans les cas où la nature ne demande pas à être secouée, & où il faut seulement adoucir, détendre, délayer, humecter, rafraîchir, &c.

L'étendue de ce regne a mérité l'attention d'un nombre de sçavants, qui ont imaginé différents systèmes pour en faciliter l'étude & la connoissance. On connoît celui de RAY, de TOURNEFORT, de LINNÆUS, &c.

VELAR. Voyez TORTELLE.

VELVOTE; Véroniquefemelle. *Elatine*, & *Veronica femina*, offic. *Linaria segetum nummularia folio villoso*, TOURNEF. Inst. r. h. *Elatine folio subrotundo*, C. B. Pin. *Elatine mas folio subrotundo*, J. B. *Veronica femina*, FUCHS. sive *Elatine*, DOD. Pempt. *Verbasculum*, quorundam.

Sa racine, qui s'enfonce perpendiculairement en

Tome VIII.

C

terre, est simple, blanche, menue, garnie de quelques fibres. Il s'en élève une tige de six pouces, cylindrique, grêle; les rameaux, qu'elle jette à terre de côté & d'autre, ont quatre à cinq pouces de longueur. Ses feuilles sont arrondies, velues, molles, d'un verd-pâle, entières, mais quelquefois dentelées, portées sur de courts pédicules. De l'aisselle des feuilles sort un pédicule long & grêle, qui soutient une petite fleur, d'une seule piece, irrégulière, en masque, partagée antérieurement en deux levres, ainsi que celle de la linaire. Son calyce est à cinq feuilles; il en sort un pistil, qui devient un fruit ou coque membraneuse, arrondie, partagée en deux loges, où sont contenues plusieurs petites semences arrondies.

Cette plante, qui fleurit vers le temps de la moisson, croît dans les terres labourables.

Ses feuilles sont très ameres, légèrement astringentes, & d'une odeur oléagineuse. Elles sont reconnues pour vulnéraires, détersives, apéritives & résolutives. On les emploie ou en infusion, ou en décoction; le suc se donne à la dose de trois onces, & même de cinq. On recommande l'usage de cette plante contre les écouelles, la lepre, les dartres, le cancer, la goutte, l'hydropisie.

On fait avec ses feuilles un onguent, vanté par M. TOURNEFORT, contre les écouelles, les ulcères & les hémorrhoides.

On se sert encore de la décoction en lavement, pour la dyssenterie & les autres flux du ventre.

VENIN de la vipere; les accidents qu'il cause; remèdes qui les calment. Voyez VIPERE.

VENTOUSE. *Cucurbitula*. On donne ce nom à un petit vaisseau ordinairement de verre, fait en poire, semblable à un petit chapiteau de cucurbite

sans bec , avec une base large & ouverte qu'on applique sur la peau , pour attirer avec violence les humeurs du dedans au dehors. On en peut faire d'argent , de corne , de bois. On remplit à moitié le vaisseau d'une étoupe légère , qu'on fait tenir dans son fond avec de la térébenthine ou de la cire. On allume cette étoupe , & l'on place aussi-tôt la ventouse qu'on a un peu échauffée , de peur qu'elle ne se casse. La flamme s'éteint peu de temps après , mais sa chaleur fait raréfier l'air renfermé dans le vaisseau. La peau , trouvant moins de résistance dans la ventouse , s'y élève avec ses vaisseaux , & les humeurs qu'ils contiennent.

On distingue les ventouses en seches & en humides. Les seches s'appliquent sans effusion de sang. Dans les humides , on fait des scarifications à la peau avec une lancette , après l'application des seches. On applique de nouveau la ventouse sur la partie scarifiée : alors le sang coule abondamment par les petites incisions faites à la tumeur.

Elles s'appliquent sur les omoplates , sur le dos , à la partie postérieure du cou , aux cuisses , aux jambes. Les ventouses seches ont moins d'efficacité que les ventouses scarifiées , qui ne le cedent point à la saignée pour les bons effets : on les estime même plus utiles , dit M. LIEUTAUD , la douleur que causent les ventouses scarifiées ayant sur la saignée l'avantage de dissiper l'engourdissement des sens , quand on s'en sert dans l'apoplexie & dans les autres affections comateuses. C'est par la même action qu'elles operent , dans les maladies convulsives , une révulsion qui est extrêmement salutaire. Les ventouses scarifiées n'ont pas moins de succès dans les autres maladies de la tête , dans celles des yeux , de la bouche , &c. Il est prouvé , par des observa-


tions multipliées de praticiens habiles , qu'elles procurent souvent le plus grand soulagement dans la pleurésie , quand elles sont appliquées proche du siege de cette maladie.

VER A SOIE ; ou Chenille filant la soie. *Bombyx* , off. & multorum auctorum. *Papilio bombycum* , CHARLET. *Phalæna pectinicornis elinguis* , *Bombyx dicta* , LINN. Faun. suec. *Eruca* , *Bombyx in officinis dicta* ; *Papilio Bombyx* ; *Vermis indus* , sive *indicus* ; *Vermis lanificus* , vel *serificus* ; *Eruca bombycivoma* ; *Ser* seu *Seres* , quorumdam.

La chenille que l'on nomme *ver à soie* est la seule qui soit utile à l'homme : elle est sauvage dans plusieurs pays chauds , & vit de feuilles comme les autres chenilles , mais principalement de celles de mûriers noirs & blancs. Elle vient de la Chine & de l'Inde , d'où elle a été transportée en Europe. On l'a , pour ainsi dire , cultivée , afin de jouir de la soie qu'elle file , & avec laquelle on fait les plus belles étoffes. Cette soie a aussi quelque utilité en médecine.


Le ver à soie , ayant pris toute sa croissance , est communément long de trois pouces , & gros comme le bout du petit doigt. Sa couleur est d'un blanc jaune. Il est composé d'une petite tête armée de deux crochets , qui lui servent à couper les portions des feuilles dont il se nourrit. Son corps est composé d'onze anneaux , dont les trois premiers sont ridés & tachetés , & tous les autres unis & lisses ; le dernier est orné d'une corne molle. Il a six jambes écailleuses , pointues , deux à deux , trois de chaque côté , qui partent des trois premiers anneaux. Il a huit autres jambes , qui naissent vers le milieu du corps des sixieme , septieme , huitieme & neuvieme anneaux , enveloppées d'une peau molle &

Bombix.



Papillon.


Duvet.



Vers couplés.



Papillon.



Dos de la Chrisalide.

Ventre.



Coque.



Bombix, Ver à Soie.



dessiné par M. de Garfaule

et gravé par Martinet

flexible. Ces dernieres s'allongent, se raccourcissent, se gonflent & s'applatissent au gré de l'insecte : les premieres, au contraire, quoiqu'elles puissent se recourber plus ou moins, sont incapables d'allongements & de raccourcissements sensibles. Il y a encore deux jambes attachées au dernier anneau ; ce qui fait seize jambes en tout.

Il change entièrement de peau depuis le dixieme ou l'onzieme jour de sa naissance, tous les six jours, jusqu'à ce qu'il ait vingt-huit ou vingt-neuf jours. Quelques jours après sa derniere mue, il ne mange plus, & va s'attacher en quelque endroit de l'arbre ou des rameaux qu'on lui met à ce dessein. Il fait alors agir sa filiere, qui est un petit mammelon percé, situé au dessous de sa bouche : la matiere gluante qu'il en fait sortir se seche & s'allonge à mesure qu'il éloigne sa tête de l'endroit où il a commencé à la coller. C'est ainsi qu'en promenant sa tête, il attache ses soies sans ordre jusqu'à ce qu'il y soit caché. Le ver continue de filer plus fin, en formant plusieurs zigzags autour de lui, & n'est bientôt plus visible. Il finit sa loge en tirant de son sac une gomme, dont il forme un fil moins beau, & qu'il épaisit avec une forte glu, qui sert à lier & à coller tous les derniers rangs de ce fil les uns sur les autres : ainsi l'insecte se trouve enseveli sous trois especes d'enveloppes. Sa coque finie, il se transforme en chrysalide. Au bout de vingt jours, le papillon quitte l'état de chrysalide, ouvre la coque, & sort tout mouillé. Il est bientôt séché, & se met en marche ; car il ne vole point, quoiqu'il ait quatre ailes. Ce papillon est entièrement blanc. Sitôt qu'un mâle & une femelle se rencontrent, ils s'accouplent sur le champ : pendant l'accouplement, qui dure un quart d'heure, le mâle

agit perpétuellement ses ailes. Cet accouplement continue de la sorte pendant quatre jours, avec des intervalles. Peu après la femelle pond grand nombre d'œufs gros comme une tête d'épingle, en divers endroits & à différentes fois : ils sont jaunes d'abord, puis noirs, & éclosent d'eux-mêmes au printemps suivant.

On a dit que la foie, tant crue que brûlée, étoit utile contre l'épilepsie & contre les hémorrhagies. On a recommandé la foie brûlée pour déterger les ulcères : mais la foie crue, teinte en écarlate, entroit autrefois dans la confection alkermès. En Angleterre on prépare avec la foie crue un esprit bézoardique, qui se vend beaucoup plus cher que l'esprit de corne de cerf, mais qui n'a cependant pas plus d'efficacité, quoiqu'on l'ait vanté comme le remède le plus souverain.

Cet esprit, connu sous le nom de *Gouttes d'Angleterre*, se prépare ainsi.

Prenez de la foie crue, remplissez-en une corne lutée, puis donnez-y un feu doux. Il en sortira un phlegme, un sel volatil, & une huile qui se fige comme du beurre. Prenez ensuite quatre onces de ce sel volatil, un gros d'huile essentielle de lavande, & deux onces d'esprit de vin rectifié : mettez le tout dans une petite cornue de verre, adaptez-y un récipient, lutez les jointures, & laissez digérer pendant vingt-quatre heures. Placez-le ensuite sur le feu de sable, le sel passera alors en forme sèche ; il viendra ensuite l'esprit éthéré de lavande & de vin imprégné de sel volatil. Ce n'est autre chose qu'un esprit volatil dulcifié.

Ce remède est de l'invention de M. GOEDAR, qui reçut, pour l'avoir trouvé, une grande récompense de Charles II, roi d'Angleterre. Les chy-

mistes tâcherent de l'imiter par divers procédés ; mais on en ignora la véritable composition , jusqu'à ce que le roi d'Angleterre eût acheté le secret de l'auteur. Mylord PORTLAND le découvrit à M. DE TOURNEFORT , qui le rendit public dans les Mémoires de l'Académie des Sciences , année 1700.

Ce sel est bon pour les vaporeux : en le flairant , il éloigne & dissipe les accès.

Les gouttes sont céphaliques ; elles ont les mêmes vertus que les alkalis volatils aromatiques. Elles sont nervines , cordiales , alexipharmiques , capables de fondre les obstructions.

Le sel se donne depuis un jusqu'à cinq grains ; & l'esprit , depuis trois gouttes jusqu'à huit , dans une liqueur appropriée , comme vin d'Espagne ou autres , dans les affections soporeuses , dans les fièvres malignes , putrides , dans la paralysie & autres maladies du genre nerveux , dans les maladies hypocondriaques.

VER DE TERRE ; Lombric ; Achée ou Aschée ; Lesche. *Lumbricus* , seu *Vermis terrestris* , offic. *Lumbricus terrestris* , JONST. & aliorum. *Lumbricus terrenus* , SCHROD. *Vermes terrestres majores* , MERRIAN. *Vermes* , sive *Lumbrici terreni* , BOSSCH. *Lumbricus lavis* , LINN. *Lumbricus terrestris major* , RAI, Insect. *Lumbrici* , seu *Vermes terræ* ; *Intestina terræ* ; *Vermis* , sive *Lumbricus terrestris* , nonnullorum. Voyez la figure de MOULE DE MER ; celle de VER DE TERRE y est représentée.

Insecte rampant , qui n'a ni yeux , ni oreilles , ni pieds , ni os. Il est gros comme un tuyau de plume , rond , mou , charnu. Il s'allonge plus ou moins , & se raccourcit considérablement quand il veut. Il est composé d'une infinité d'anneaux , & de fibres longitudinales qui les croisent. Il est d'un rouge-pâle , sans odeur & a une saveur terreuse.



Cet insecte est hermaphrodite & ovipare. RéDI assure avoir souvent compté jusqu'à deux cents œufs répandus dans la cavité même du ventre. Il a au-dessus de l'ouverture de la bouche une trompe, avec laquelle il perce & élève la terre. En s'accouplant, les vers de terre ne se joignent point directement vers la queue, comme font la plupart des animaux, mais vers la tête. Durant l'hiver ils se tiennent cachés dans la terre : au printemps & en été, de même qu'en automne, ils en sortent en foule, surtout quand il pleut, & la nuit lorsqu'il tombe beaucoup de rosée. Ils sont la proie des poissons, des oiseaux, du lézard, de la salamandre, & de plusieurs autres animaux.

Ils peuvent être de quelque utilité en médecine ; on leur donne pour cela une préparation. On les lave bien, pour les nettoyer de la terre qui se trouve dans leur corps ; on les fait ensuite sécher, & on les réduit en poudre. En cet état on leur attribue une vertu anodyne, diurétique & diaphorétique : on dit qu'ils sont spécialement utiles pour calmer les mouvements convulsifs, pour appaiser les douleurs de la goutte, contre le rhumatisme & la difficulté d'uriner. Mais, dit M. VOGEL, ceux qui vantent ces propriétés des vers de terre n'ont assurément aucune observation à produire que ces insectes, donnés seuls, aient soulagé dans ces cas.

On pourroit tirer des vers de terre un esprit & un sel volatil. C'est cet esprit volatil qu'ils contiennent qui communique à l'huile, connue sous le nom d'*huile des vers*, les propriétés qu'elle possède. Elle est employée pour fortifier les nerfs affoiblis : on en frotte & on en oint les parties affectées de rachitis, de paralysie, de la goutte.

Pour préparer cette huile, on prend une livre de

Verge d'Or. . Virga aurea.



gros vers de terre , qu'on lave bien dans l'eau , & qu'on met infuser ensuite dans une livre d'excellente huile d'olives , ajoutant par dessus un verre de vin blanc : après avoir infusé pendant vingt-quatre heures , on fait bouillir le tout sur un feu modéré , jusqu'à l'évaporation du vin. On passe ensuite avec expression cette huile , qu'on garde pour le besoin.

VERDET. Voyez CUIVRE.

VERDURE D'HIVER. Voyez PYROLE.

I^o. VERGE D'OR à feuilles étroites : petite Verge dorée. *Virga aurea minor*, off. *Virga aurea angustifolia minor serrata*, C. B. Pin. *Virga aurea vulgaris latifolia*, J. B. & Tourn. Inst. r. h. *Solidago sarracenica*, TRAG. *Consolida aurea*, TAB. *Solidago caule erecto, racemis alternis erectis*, LINN. *Herba doria*; *Herba judaica & pagana*, nonnullor.

Sa racine est traçante , brune , genouillée , garnie de fibres blanchâtres , d'une saveur aromatique. Il s'en élève de trois pieds une ou plusieurs tiges droites , fermes , cannelées , légèrement velues , & remplies d'une moëlle fongueuse. Ses feuilles , qui naissent alternes , sont oblongues , velues , dentelées sur leurs bords , d'un verd noirâtre. Ses fleurs , qui ont une belle couleur d'or , sont disposées en épis le long de la tige , & radiées , garnies de cinq étamines : le calyce , qui soutient chaque fleur , est écailleux. Elles se changent en des graines oblongues , aigrettées.

Cette plante , dont la fleur paroît en Juillet & en Août , est fort commune dans les lieux incultes , dans les bois , sur les montagnes.

II^o. VERGE D'OR à larges feuilles : grande Verge dorée. *Virga aurea major*, off. *Virga aurea latifolia serrata*, C. B. Pin. & Tourn. Inst. r. h. *Virga aurea*,

sive *Solidago sarracenica latifolia, serrata*, J. B. *Virga aurea margine crenato*, DODON. Pempt. *Virga aurea*, Arnoldi Villanovani, GER. *Virga aurea serratis foliis*, PARK. *Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis*, LINN. *Consolida sarracenica major*, Lugd. Hist. *Virga aurea altera*, LOBEL. *Virga aurea folio latiore serrato*, quorumdam.

Sa racine, qui s'enfonce obliquement en terre, est longue, fibreuse, vivace. Il s'en élève de trois pieds & au delà une tige droite, ferme, cannelée, remplie de moëlle fongueuse. Ses feuilles ont plus de longueur & plus de largeur que celles de l'espece précédente; elles sont aussi plus dentelées sur leurs bords. Ses fleurs, qui naissent comme en ombelle au sommet de la tige, sont radiées & d'une belle couleur d'or : leur calyce est écailleux. Elles sont remplacées par des semences aigretées.

Cette plante fleurit aux mois d'Août, de Septembre & d'Octobre.

Elle est amere & a un peu d'astringtion, dit M. VOGEL. Elle tient un des premiers rangs parmi les vulnéraires & les toniques, & c'est à ce titre qu'on la fait entrer dans les baumes & dans les décoctions vulnéraires. On la recommande principalement contre la néphrétique & contre les ulcères de l'urethre & des reins, suivant LISCHWITZ, *dissert.*; contre le pissement de sang, selon BURGR. A. N. C. *vol. v. obs. 8*; & pour l'expulsion du calcul. C'est dans cette vue qu'on en donne quelquefois trois dragmes en poudre, dont la reprise est répétée trois fois en huit heures; FULV. GHERLI, *obs. 56*.

VERGE ou Priape de sanglier. Voyez COCHON sauvage.

VERMICULAIRE brûlante; ou Poivre des murailles. Voyez JOUBARBE âcre, n°. iij.

VERMIFUGES. *Vermifuga medicamenta.* On les appelle aussi ANTHELMINTHIQUES, ανδελμινθικά φάρμακα. Quoiqu'il en soit déjà parlé dans l'introduction, on mettra ici ce qu'en dit un célèbre professeur.

Le corps humain est sujet à des vers, qui se logent plus communément dans l'œsophage, l'estomac & les intestins. Ils dévorent les aliments, & privent le corps d'une partie de sa nourriture; ils gâtent & corrompent le chyle, & sont un obstacle à la digestion & au cours des matieres dans les intestins. Ils produisent la colique de *miserere*, ou la passion iliaque. Fauté d'aliments, ils s'attachent aux intestins; ils les picotent, les déchirent, y attirent des inflammations, & excitent des convulsions, des mouvements épileptiques, des fièvres continues, putrides, appelées vermineuses, sur-tout lorsque la matiere vermineuse passe dans le sang. Les autres parties du corps servent aussi quelquefois de demeure & de nourriture aux vers, comme les sinus du nez, le conduit interne & externe de l'oreille, les dents cariées, le dessous de la langue. On en a trouvé dans le péricarde, dans la substance du foie & des reins: enfin il arrive quelquefois des ulceres malins qui en fourmillent.

Les vers, qui attaquent l'œsophage, l'estomac & les intestins, sont de quatre sortes.

Les vers longs & ronds habitent plus particulièrement l'estomac & les intestins grêles: on les nomme en latin *vermes teretes*.

Les vers ascarides, menus comme des aiguilles, ramassés plusieurs ensemble, sont les plus importuns & les plus difficiles à détruire: ils se tiennent le plus souvent dans le rectum & dans les gros intestins.

Le ver folitaire est très long, large, plat comme un ruban, distingué par anneaux. Il est ordinairement seul. Il s'étend sur presque toute la longueur des intestins grêles, dont il suit toutes les circonvolutions, & se colle à leur surface interne. Il se nomme en latin *tania*, ou *fasciadatus vermis*.

Les vers cucurbitaires, ainsi appelés à cause de leur ressemblance avec la semence d'une courge, ne sont que des portions du *tania*.

Les expériences & les observations ont entièrement détrompé du préjugé des anciens, qui attribuent à la pourriture la génération des vers & des insectes.

On s'est même convaincu que les plus petits s'accouplent, & qu'ils fournissent une prodigieuse quantité d'œufs. Ainsi le mouvement de pourriture ne donne pas l'organisation, mais une chaleur douce & modérée, & une humidité volatile capable de mettre en mouvement les liqueurs des œufs, d'en étendre & d'en développer toutes les parties. Quand le ver a atteint toute sa perfection, il perce & abandonne toutes ses enveloppes pour se nourrir de la même nourriture qui lui a servi de matrice.

Tout ce qui est animé dans la nature reconnoît pour principe de vie l'union du mâle & de la femelle, & pour origine un œuf. Les vers du corps de l'homme, quoique différents des vers ordinaires, ne sont pas exempts de la loi générale & uniforme que la nature suit dans ses productions.

Examinons maintenant la cause qui fait éclore ces œufs, qui entretient & fait croître ces œufs & ces vers éclos dans le corps humain. Quoique l'œuf contienne toutes les parties de l'animal en raccourci, & une quantité suffisante d'humeur pour sa nourriture & son développement, tout y reste dans
une

une espece de repos , jusqu'à ce que la chaleur du soleil , l'humidité de la terre , ou le mouvement excité dans les matieres qui se corrompent & dans les eaux croupissantes , donnent de l'activité aux humeurs de l'œuf , & leur fassent pénétrer les vaisseaux repliés de l'embryon , & par là suscitent l'oscillation des fibres.

Pour que le développement se fasse , il faut une chaleur douce & modérée. Lorsqu'elle est trop violente , les liqueurs brisent & déchirent les vaisseaux , parcequ'elles se raréfient , & l'organisation est détruite. Ainsi , quoique l'air que nous respirons , & les nourritures que nous prenons , soient chargés d'œufs d'insectes , cependant , dans l'état de santé , les œufs n'éclosent point , parceque l'activité de nos liqueurs , la qualité de nos digestions , & la chaleur trop vive de l'estomac & des intestins s'y opposent. Mais lorsque cette chaleur est ralentie , que les digestions se dérangent , que la matiere chyleuse acquiert une qualité aigre , & qu'elle séjourne dans le bas-ventre , alors ces œufs trouvent une matiere propre à les faire éclore , & les vers une nourriture qui leur convient.

Les enfants sont plus sujets aux vers que les adultes. Quand ils en sont attaqués , ils ont l'haleine mauvaise & des rapports aigres ; ils se frottent le nez , à cause de l'impression que fait sur la membrane pituitaire la vapeur qui s'exhale de la pourriture contenue dans l'estomac & dans les intestins.

Dans les vues curatives qu'on se propose , il faut avoir égard au dérangement des digestions , & à la matiere vermineuse propre à faire éclore & à entretenir les vers. Parmi les moyens qu'on emploie , les uns remédient aux vices des premieres voies , comme les purgatifs & les émétiques. Il y

en a qui rétablissent les digestions , tels sont les stomachiques & les amers ; les autres agissent sur les vers directement , & les font périr.

Par l'action des émétiques & des purgatifs , le mouvement péristaltique des intestins est augmenté ; les vers , heurtés & froissés en différents sens , sont obligés de céder & de se laisser entraîner par les voies ordinaires.

Les stomachiques & âcres corrigent le caractère de la matiere vermineuse ; ils empêchent le développement des œufs : & les vers déjà éclos , ne trouvant plus de nourriture , s'affoiblissent peu à peu.

Les remedes, qui détruisent les vers , en les attaquant directement , sont les huiles , qui , par leurs parties rameuses & branchues , bouchent les trachées & les organes de la respiration de ces petits animaux , & par là ils périssent en peu de temps. Enfin il y a des remedes qui détruisent la tissure des parties des vers , & qui corrompent leur fluide , comme le mercure & ses préparations. On ne peut pas espérer que les plantes vermifuges , simplement ameres & stomachiques , détruisent la matiere vermineuse & les vers , à moins que l'on n'ait fait précéder les purgatifs & les émétiques pour vider les premieres voies , & emporter la plus grande parties des matieres qui y croupissent. On ne sçauroit continuer long-temps l'usage des purgatifs : c'est pourquoi , s'ils n'ont pas encore entièrement dissipé d'abord la semence des vers , il faut recourir aux vermifuges amers & stomachiques , pour rétablir les fonctions de l'estomac & des intestins , pour soutenir la digestion , & par là prévenir le développement nouveau des vers. L'usage des huiles sera excellent , & conviendra sur-tout aux enfants dans le cas de colique & d'inflammation excitées par l'ir-

ritation des vers. Quant à l'énonciation des substances vermifuges, voy. l'INTRODUCTION, p. 77. 78.

VERMILLON. Voyez KERMÈS.

VERMILLON, ou Herbe de la laque. Voyez MORELLE à grappe, iij^e espece.

VERNIS de la Chine. Réfine qu'on tire d'un arbre dont il y a plusieurs especes. On rapportera ici la description de celle que les botanistes désignent sous les phrasés suivantes : *Arbor americana, alatis foliis, succo lacteo venenata*, PLUCK. Almag. *Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboïde*, DILLEN. Hort. elth. *Rhus foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro*, LINN. mat. med. *Arbor poyson-vood-tree*, Philos. transact. n^o. 367. Sitz, seu Sitz-dsiu, KÆMPF. Amœnit. 791. *Toxicodendron carolinianum, foliis pinnatis, floribus minimis herbaceis*, MILLER.

Sa tige, suivant MILLER, est forte, ligneuse, haute de vingt pieds pour le moins; mais en Angleterre elle ne s'élève ordinairement que de cinq ou six pieds, parceque c'est une plante trop tendre pour pouvoir supporter des froids rigoureux. L'écorce est d'un brun clair & comme cendré. L'arbre jette des branches de toutes parts. Les feuilles sont composées de trois ou quatre paires de folioles, & terminées par une impaire. La forme de ces folioles varie beaucoup : la plupart sont en ovale, terminées en pointe aiguë, longues d'environ trois pouces, sur un pouce & demie de largeur au milieu, souvent arrondies par le bas, lisses & d'un verd brillant en dessus, pâles & un peu velues par dessous. Les queues des feuilles deviennent d'un pourpre éclatant : vers la fin de l'été & en automne toutes les feuilles se colorent d'un beau rouge avant de


tomber. Les fleurs sont petites, d'un blanc herbeux, en panicules épars, & sont épanouies dans le mois de Juillet. Les fruits n'ont pas une forme constante : celle qui leur est la plus ordinaire est arrondie, & accompagnée d'une protubérance, & ressemble assez au pois chiche.

Pour tirer le vernis de cet arbre, dit KÆMPFER, on choisit principalement les troncs qui ont trois ans. On fait d'abord quelques entailles, & l'on reçoit la liqueur qui en distille; puis on fait de nouvelles plaies, jusqu'à ce que le tronc soit épuisé de suc. Alors on le coupe promptement jusque contre terre : les racines reproduisent des jets, que l'on traite de même au bout de trois ans.

On cultive beaucoup de ces arbres dans les campagnes des provinces de Tsi-kocko & Figo. Les environs de la ville de Jassino ont la réputation de fournir le meilleur vernis du Japon, & même du reste de l'univers.

En général, les toxicodendrons sont des plantes malfaisantes : on prétend que l'on feroit empoisonné, si l'on en prenoit intérieurement. Le suc des especes à trois folioles occasionne souvent sur la peau des pustules érépélateuses, plus ou moins abondantes, & accompagnées de chaleur & de démangeaisons fort vives, qui durent quelquefois des mois entiers. Cela est aussi arrivé dans la bouche des personnes qui en avoient imprudemment goûté. D'autres fois l'effet de ce suc est borné à des taches rouges, semblables à des piqures de puces; ce qui est cause que les Canadiens nomment ces plantes *Herbe à la puce*, ou *Herbe à puce*.

Les érépèles occasionnées par les toxidendrons à trois folioles peuvent être traités avec des cataplasmes adoucissants, & avec la fleur de sureau.





Veronica mas.
Veronique mâle.



Mais quand ils résistent, la crème douce appliquée seule calme les accidents, & les dissipe sans retour.

On dit que le vernis apaise les douleurs des hémorroïdes; mais si le suc de ces plantes est si caustique, que l'application du vernis sur les hémorroïdes peut devenir fort dangereux.

1°. VÉRONIQUE mâle : Thé de l'Europe. *Veronica mas*, off. *Veronica mas supina & vulgatissima*, C. B. Pin. & Tourn. Inst. r. h. *Veronica vulgatio folio rotundiore*, J. B. *Veronica mas serpens*, Dod. Pempt. *Veronica vera & major*, GERAR. *Veronica mas vulgaris supina*, PARK. *Betonica*, PAULI ÆGINETÆ, seu *Teucrium*, TRAGI. *Auricula muris tertia*, CÆSALP. *Teucree quarta species*, CLUS. Hist. *Betonica altera Dioscoridis*, CORN. *Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente*, LINN. *Thee europæum vulgò*, quorumdam.

Sa racine se répand en terre de côtés & d'autres. Elle est fibreuse, menue, vivace. Les tiges qu'elle pousse sont longues, menues, rondes, velues, garnies de nœuds, & pour l'ordinaire couchées à terre. Ses feuilles, qui ressemblent assez à celles du prunier, naissent opposées deux à deux; elles sont velues & dentelées sur leurs bords, d'une saveur âcre & amère. Ses fleurs sont disposées en manière d'épis. Elles sont petites, bleuâtres ou blanchâtres, formant une rosette à quatre quartiers, garnies de deux étamines. Le fruit qui succède à ces fleurs est taillé en cœur, & partagé en deux loges, où sont contenues plusieurs graines menues, rondes, noirâtres.


Cette plante, qui fleurit au printemps & en été, croît dans les endroits incultes, arides, pierreux, sablonneux, dans les bois, dans les bruyères, &c. Elle conserve sa verdure toute l'année.

II°. VÉRONIQUE des prés ; ou Germandrée bâtarde. *Veronica pratensis*, off. *Chamædrys spuria major angustifolia*, C. B. Pin. *Chamædrys spuria angustifolia*, J. B. *Veronica spuria facie Teucrii pratensis*, LOBEL. Icon. & Tourn. Inst. r. h. *Teucrium primum*, MATTH. *Teucrium secundum*, TABERN. Icon. *Auricula muris quinta*, CÆSALP. *Teucrii tertia species*, CLUS. Hist. *Chamædrys vulgaris mas*, FUSCH. *Chamædrys falsa insipida*, floribus cæruleis, GESN. *Veronica*, floribus racemosis decussatis, foliis oblongo-sagittatis dentatis, GUETTARD, observ. *Pseudo-chamædrys*, seu *Chamædrys sylvestris* ; *Teucrium pratense alterum* ; Hierobotane, vel *Herba sacra*, seu *Verbenaca supina fœmina*, DODON. nonnullorum.

D'une racine menue, rampante, fibreuse, boisée, longue, vivace, sortent plusieurs tiges ordinairement couchées à terre, & quelquefois un peu relevées : elles sont rondes, velues, ligneuses, longues d'un demi-pied. Ses feuilles, qui naissent opposées deux à deux, sont oblongues, & dentelées sur leurs bords. Aux sommités des rameaux naissent des fleurs disposées en épi, & bleues. Il leur succede des capsules où sont contenues plusieurs graines menues, arrondies.

Elle croît dans les prés, dans les bois, le long des eaux. Elle fleurit en Mai & en Juin.

III°. VÉRONIQUE de bois ou des haies. *Veronica rotundifolia*, off. *Chamædrys spuria minor rotundifolia*, C. B. Pin. *Chamædrys spuria latifolia*, J. B. *Veronica minor foliis imis rotundioribus*, MOR. Hist. oxon. & Tourn. Inst. r. h. *Chamædrys sylvestris*, GER. & RAIL. *Chamædrys spuria sylvestris*, PARK. *Teucrium tertium minus*, TABERN. Icon. *Auricula muris sexta*, CÆSALP. *Teucrium pratense*




Veronique des prez ,
. Veronica pratensis .





a. 2.



a. 1.


Veronica foemina minor.

a. 3.

Veronique de haye.



a. 4.



Veronica Spicata Veronique à épi.

& *supinum spurium chamædryoides*, LOBEL. Icon. *Hierobotane mas*, DOD. *Teucrium pratense*, RUDB. *Pseudo-chamædrys*, TILL. *Veronica floribus racemosis lateralibus*, *foliis ovatis plicatis dentatis*, LINN.

D'une racine déliée, fibreuse & rampante, s'élevant, tantôt de six pouces, tantôt de dix-huit, des tiges velues, rondes, menues, foibles. Ses feuilles, qui n'ont presque point de pédicules, naissent opposées; elles sont dentelées sur leurs bords, arrondies, ridées, velues, d'un verd foncé. De l'aisselle de ces feuilles sortent des fleurs bleues, & quelquefois blanches, d'une seule piece, & soutenues sur de courts pédicules. Elles se changent en des capsules féminales applaties, divisées en deux loges, où sont renfermées de petites graines rondes.

Cette espece, qui fleurit en Mai & en Juin, se trouve dans les prés, dans les bois & ailleurs. Sa saveur est un peu amere; son odeur est très foible.

IV^o. VÉRONIQUE à épi. *Veronica spicata*, off. *Veronica spicata minor*, C. B. Pin. *Veronica spicata recta major & minor*, J. B. *Veronica assurgens*, sive *spicata*, GER. *Veronica erecta angustifolia*, PARK. *Veronica recta minima*, CLUS. Hist. *Veronica foliis obtusis*, *caule non ramoso spicâ nudâ terminato*, HALLER. Helv. *Veronica floribus spicatis*, *foliis oppositis*, *caule erecto*, LINN. *Veronica spicata angustifolia*; *Veronica minor erecta*, nonnullorum.

Les feuilles de véronique sont ameres & légèrement astringentes. Leur suc donne au papier bleu une couleur rouge. Cette plante est mise au rang des sudorifiques, des vulnéraires, des détersives,

des diurétiques, des incisives, des apéritives. Elle est vulnérable extérieurement, dit BARTHOLIN, *centur. iij. hist. 97*; & même son eau distillée, E. N. C. *decur. ij. ann. iij. obs. 166*. On la vante intérieurement contre la phthisie, *Bresl. 1722. mens. Febr.* & contre le pissement de sang, FISCH. *de senio*, p. 217. A raison de sa vertu tonique, elle convient dans la toux, dans la difficulté de respirer, & contre la pierre des reins, E. N. C. *decur. j. ann. j. obs. 107. & comm. norimb. 1735. pag. 44*. BOERHAAVE dit que deux onces de suc de véronique bues tous les jours, guérissent de la goutte. HOFFMAN & J. FRANAN ont conseillé de s'en servir au lieu de thé de la Chine.

VÉRONIQUE femelle. Voyez VELVOTTE.

VERRE D'ANTIMOINE. Voyez ANTIMOINE.

VERRE DE MOSCOVIE. V. PIERRE SPÉCULAIRE.

VERRUES de cheval. Voyez CHEVAL.

VERVEINE. *Verbena*, off. *Verbena communis flore cœruleo*, C. B. Pin. & Tourn. *Inst. r. h. Verbena vulgaris*, J. B. *Verbenaca recta*, Dod. *Pempt. Verbenaca recta & Verbenaca mas*, TABERN. *Herba sacra*, ANGUILL. *Hierobotane mas*, BRUNSF. *Columbalis*, HERMOLAI BARBARI. *Verbena communis*, sive *sacra procerior recta*, LOBEL. *Adv. Verbenaca recta*, sive *Peristereon*, Dioscor. & *Verbenaca mas*, Plinii, HOFFM. *Verbena (tetandra) spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis*, LINN. *Verbena foliis laciniatis, superioribus tripartitis, spicis angustis longissimis*, HALLER. *Helv. Herba sagminalis vel ferraria; Columbina*, quorumdam.

Sa racine, dont la grosseur n'égale pas le petit doigt, est oblongue, garnie de fibres, blanche, d'une saveur un peu amère. Ses tiges, qui s'élèvent de

Verveine. Verbena.



de dix-huit pouces, sont quarrées, couvertes d'un léger duvet, dures, branchues, rougeâtres. Ses feuilles, qui naissent opposées deux à deux, sont oblongues, ridées, découpées profondément, d'un verd foncé en dessus, plus pâle en dessous, d'une saveur amere & désagréable. Ses fleurs, qui forment un épi long & grêle, sont petites, en gueule, bleues ou blanchâtres, & garnies de quatre étamines. Le calyce devient un fruit ou capsule, qui renferme quatre graines jointes ensemble, grêles & oblongues.

Cette plante, qui fleurit en Juin, en Juillet & en Août, croît presque par-tout dans les lieux incultes & le long des chemins. Sa saveur est légèrement amere & astringente.

On la regarde comme vulnérable, détersive, hystérique & fébrifuge. Elle appaise les douleurs de tête, même en la suspendant seulement au col, selon FORESTUS, *lib. xvj. obs. 52*. Elle remédie à la douleur de dents, en les lavant avec sa décoction. Elle guérit l'alopecie, ou chute des cheveux, en faisant des lotions sur la tête avec cette même décoction. Elle dissipe la fièvre : son extrait est vanté par CHOMEL comme ayant cette propriété. On en prend un gros deux fois le jour. Les anciens employoient fréquemment la verveine pour consolider les plaies occasionnées par les instruments tranchants. FULVIUS TESTI, *Giorn. degli litterat. xxij. p. 166*, vante comme un secret pour la goutte le baume fait avec l'huile de cette plante. Les femmes se servent extérieurement de l'eau de verveine pour empêcher l'avortement, & contre les douleurs de tête. Ses feuilles sont utiles, appliquées sur les inflammations. On ne sçait pas bien si elle pousse le gravier & le calcul ; mais cela est

probable, puisque les astringents procurent cet effet.

VESCE noire ou commune. *Vicia*, off. *Vicia sativa vulgaris semine nigro*, C. B. Pin. & Tourn. Inst. r. h. *Vicia vulgaris sativa*, J. B. *Orobus sativus*, & *Vicia major prima*, Tragi. *Ervum*, Brunf. *Vicia major*, Fuchs. *Aracus*, seu *Cracca primum genus*, Dodon. *Vicia vulgaris sativa*, Clus. *Apsaca vera*, Lugd. Hist. *Vicia nigra*; *Orobus perperam*, officinis; *Aphace Græcorum*; *Os mundi*, nonnullorum.

De sa racine, qui est fibreuse, déliée, annuelle, s'élevont de dix-huit pouces ou de deux pieds, plusieurs tiges cannelées, velues, creuses. Ses feuilles sont étroites, oblongues, velues, portées par paires sur une côte terminée par une main, avec laquelle elle s'attache aux corps voisins. Ses fleurs sont légumineuses, purpurines ou bleuâtres. Elles se changent en des gousses applaties, composées de deux cosses; elles renferment des graines arrondies & noires, d'une saveur désagréable.

On sème cette plante dans les champs, pour la nourriture des chevaux. Elle donne sa fleur en Mai & en Juin : sa semence est dans sa maturité au mois d'Août ou en Septembre.

VESCE blanche. *Vicia alba*, offic. *Vicia sativa alba*, C. B. Pin. & Tournef. Inst. r. h. *Vicia albo semine*, J. B. *Ervum candidum*, vel *Faba veterum*, Tragi. *Vicia major folio cordato, flore rubro, fructu albo, pisti minoris instar*, Mor. *Vicia siliquis sessilibus erectis, foliis cordatis*, Hall. Helv. *Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis dentatis*, Linn. Hist. cliff.

De sa racine, qui est menue & fibrée, s'élevont

Vicia. Vesce.



d'environ deux pieds plusieurs tiges angulaires, creuses, foibles. A l'égard de ses feuilles, les unes sont rondes, & les autres longues & étroites. Sa fleur est simple & double, mêlée de taches purpurines, portée sur un court pédicule. Ses gousses renferment des graines, ou blanches ou purpurines, ou d'un verd-pâle, ou bigarrées, assez semblables aux pois verts par leur figure, par leur couleur & par leur grosseur.

Cette espece se sème aussi dans les champs, où elle fleurit dans la même saison que la précédente, & porte aussi sa graine mûre au mois d'Août.

On tire de la semence de vesce une farine qui possède les mêmes vertus que celle d'orobe : d'ailleurs, la vesce est astringente, épaississante, consolidante, & propre contre les cours de ventre. La farine entre dans les cataplasmes émollients, résolutifs & fortifiants.

VESCE de Loup, ou VESSE de Loup. Voyez CHAMPIGNON, troisième espece.

VESSICATOIRES. *Vesicantia*. On dit aussi un *Vessicatoire*. *Vesicatorium*.

Le nom de vessicatoires a été donné à ces remèdes, parceq' ils font élever sur la peau de petites vessies transparentes remplies de sérosités. Ils sont aussi appelés *épispastiques*.

L'action des vessicatoires est plus foible que celle des escarotiques. Leurs parties, dit un professeur célèbre, étant plus fixes, elles occasionnent seulement la rupture des petits vaisseaux lymphatiques & des adhérences de la cuticule avec la peau : ce qui donne lieu à l'épanchement de la sérosité, qui se ramasse peu à peu, & souleve la peau en forme de petites cloches, dont le fond est fort vif & douloureux.

On applique les vessicatoires sur des parties saines.

& entieres , pour ébranler le genre nerveux , dans les affections soporeuses , pour donner issue & détourner une humeur qui se jette sur quelque partie importante.

Leur usage doit être un peu plus développé.

On applique sur la peau l'emplâtre vésicatoire , pour procurer une évacuation prompte & abondante de la sérosité âcre du sang. Il excite de petites vessies remplies de sérosité, lesquelles, ouvertes avec des ciseaux, laissent écouler une certaine quantité de lymphe. On met en usage les vésicatoires dans les fièvres continues & malignes, accompagnées d'un penchant au sommeil, dans la léthargie, dans le carus, dans l'apoplexie, dans les fluxions des yeux, des dents & des levres. On les applique entre les deux épaules; mais jamais derrière les oreilles, à cause de la grande sensibilité de cette partie. Dans les fièvres malignes (1), lorsqu'il s'agit de réveiller le malade, on prépare un vésicatoire avec deux ou trois gros de l'emplâtre

(1) Le vésicatoire n'est pas indistinctement avantageux dans toutes sortes de fièvres; il n'est utile que dans celle qui procède de l'épaississement ou de la coagulation des humeurs, ce qu'il est important de remarquer. Dans cette espèce de fièvre maligne, on applique le vésicatoire entre les deux épaules, lorsque, malgré les purgatifs & les émétiques, le malade est accablé par un sommeil opiniâtre, avec un pouls foible & quelquefois intermittent, & que ce sommeil ne peut être assez dissipé, ni par les cordiaux, ni par les sudorifiques. Dans ce cas le vésicatoire est mis en usage, non pas pour évacuer les sérosités, mais afin que les parties des cantharides, portées dans le sang, en divisent les parties intégrantes & en détruisent l'épaississement; & afin que le sang coule plus aisément, que le cerveau soit délivré de l'engorgement & de la pesanteur qui l'accabloit, que la dépuration du sang s'opère plus facilement par le moyen des purgatifs.

épispastique ou vésicatoire des boutiques, qu'on étend sur un morceau de linge taillé en rond, & de la grandeur de la paume de la main, & sur lequel on répand ensuite de nouvelle poudre de cantharides, afin d'en obtenir un effet plus prompt; ou bien on prépare sur le moment un vésicatoire avec de vieux levain détremé avec du fort vinaigre, & une quatrième partie de cantharides.

On les prescrit sous cette formule :

Prenez d'emplâtre vésicatoire des
boutiques, trois gros.
de poudre de cantharides, un scrup.

Faites-en un emplâtre pour être appliqué au derrière de la tête, ou entre les deux épaules. Les vésicules étant formées, on les ouvre avec des ciseaux, & on les panse avec du beurre & des feuilles de bette.

On prépare de cette manière l'emplâtre épispastique des boutiques :

Prenez de cantharides, deux onces.
de poix blanche, }
de cire jaune, } de chaq. une onc.
de térébenthine, }

Mêlez le tout pour faire un emplâtre suivant l'art.

Il est inutile d'ajouter au vésicatoire de l'euphorbe, de la moutarde, de la pyrethre, du poivre, comme le font quelques-uns; car on rend le vésicatoire bien plus puissant par l'addition d'une bonne quantité de poudre de cantharides. On le prépare de la manière qui suit :

Prenez de poudre de cantharides ,
 du vieux levain délayé
 avec du fort vinaig. } quantité suffis.

Mêlez-les ensemble , & faites un emplâtre.

On applique les vésicatoires sur les os coronal & occipital dans les affections soporeuses , opiniâtres & continuelles , sur-tout dans celles qui accompagnent la fièvre maligne. Ils sont bons aussi contre la violente douleur du front , qu'on nomme *clou* (*clavus*) , & qui se fait sentir jusqu'aux yeux , lorsqu'elle revient périodiquement tourmenter avec fureur les malades. Il n'y a point , en ce cas , de remède plus efficace pour dissiper ce mal , qu'un vésicatoire : on peut en entretenir l'écoulement pendant environ quinze jours.

On peut préparer un vésicatoire plus doux , dont l'efficacité peut se conserver pendant trois ou quatre mois. On le nomme *cauterium volans Montalbani*. On lui donne une forme d'onguent ; mais avant que de l'employer , on applique sur la partie le vésicatoire suivant , qui est préférable à toutes les autres especes.

Prenez d'emplâtre de bétoine , quatre onces.
 d'huile rosat , deux onces.
 Faites fondre sur le feu ,
 puis mêlez y de poudre
 nouvelle de cantharides , deux onces.

Pour un emplâtre.

Cet emplâtre excite des vésicules , qu'il ne faut pas ouvrir avec les ciseaux , mais qu'il faut seulement panser avec l'onguent suivant , qu'on appelle

cautere volant (*cauterium volans*) , & dont voici la formule.

Prenez d'onguent basilicon , deux onces.
d'onguent populeum , une once.

Faites fondre sur le feu dans un
vaisseau de terre , & après l'en
avoir retiré , ajoutez-y

de poudre de cantharides , demi-once.

On aura un onguent qu'on conservera pour l'usage.

Lorsque , par l'effet de l'emplâtre vésicatoire , il s'est élevé des vésies sur la peau , on en met dessus matin & soir , pendant tout le temps qu'on veut procurer l'écoulement de la sérosité ; mais on aura soin de diminuer ou d'augmenter sur le linge la quantité de l'onguent , à proportion de l'effet plus ou moins considérable du vésicatoire.

Le cautere volant est spécialement utile à ceux qui sont sujets aux fluxions sur le nez ou sur les yeux. Il affoiblit même assez souvent le virus scrophuleux , en tant qu'une partie de cette sérosité caustique sort par ces vésicules : mais il n'est pas rare que le vésicatoire excite une dysurie insupportable , à cause du sel âcre & volatil des cantharides , lequel , porté dans le sang , fait naître dans les voies urinaires une phlogose , & rend l'urine âcre. Dès que ce symptôme se manifeste , il faut ôter le vésicatoire , & appaiser la dysurie par des saignées , par des ptisanes délayantes , & par de doux purgatifs. Comme rarement on ordonne des emplâtres pour être préparés sur le moment , il n'est pas nécessaire de parler de la préparation ; mais on remarquera qu'on mêle souvent dans les emplâtres des boutiques plusieurs sortes de poudres , pour leur donner plus d'efficacité. On y ajoute aussi

différentes sortes d'huiles & des aromats, suivant les maladies.

VESSIE de cerf. Voyez CERF.

VESSIE de sanglier. Voyez SANGLIER.

VIGNE cultivée, haute, moyenne & basse. *Vitis*, offic. *Vitis vinifera*, ex cujus uvis acerbis immaturis, omphacium exprimitur, BOERH. *Vitis sativa*, magna, media, & parva; *Vinea*, *Mater vini* feu *nectaris*; *Lignum tortuosum* & *princeps vegetabilium*, quorundam.

Sa racine est longue, peu profonde, ligneuse, vivace. Sa tige, qui s'élève quelquefois très haut, est tortue, revêtue d'une écorce brune-rougeâtre, & crevassée, divisée en plusieurs rameaux ou sarments garnis de vrilles, avec lesquelles ils s'attachent aux corps voisins. Ses feuilles sont amples, grandes, arrondies, découpées, d'un verd luisant, un peu rudes au toucher, d'une saveur astringente. De l'aisselle des feuilles sortent de petites fleurs odorantes, à cinq pétales & à cinq étamines. Elles se changent en des baies rondes ou ovales, ramassées, & formant de grosses grappes. Ces baies sont d'abord vertes & aigres : en mûrissant elles deviennent blanches, rouges ou noires. Elles contiennent alors un suc doux & agréable, & dans une seule loge intérieure, cinq pepins osseux.

Personne n'ignore avec quel soin on cultive la vigne dans les pays chauds & tempérés. Ses especes sont en grand nombre. On ne les rapportera pas ici : elles appartiennent moins à la matiere médicale, qu'à la botanique & à l'économie.

Au printemps, si l'on coupe les sommités de la vigne, qui est en seve, il en coule une liqueur en larme, laquelle, prise intérieurement, est regardée comme apéritive & bonne contre les graviers des reins & de la vessie. Elle passe aussi pour ophthal-



mique : on en fait frotter les yeux , dont elle nettoie la sanie.

Les anciens exprimoient le suc des bourgeons & des feuilles de la vigne , qu'ils faisoient prendre intérieurement pour arrêter le cours de ventre & les dyssenteries. Depuis on s'est contenté de mettre sécher ces feuilles , & d'en donner la poudre dans la même vue , à la dose d'un gros dans du bouillon.

La cendre des sarments de vigne est apéritive. Pour l'avoir , on brûle les sarments seuls dans un endroit propre , on passe ensuite cette cendre au tamis , & on en met une once dans deux livres d'eau bouillante. Après l'avoir laissé reposer , on verse par inclination cette eau dans un autre vase , & on en fait sa boisson ordinaire. On augmente peu à peu la dose des cendres. Cette espece de ptisane convient dans la leucophlegmatie , dans l'hydropisie ascite & dans l'œdème. Si l'on fait avec du vinaigre & avec cette cendre un cataplasme , on a un bon remede contre les condylomes.

On tire des raisins verts un suc qu'on nomme VERJUS. Il est un peu astringent ; & en cette qualité , il a la vertu d'arrêter les cours de ventre bilieux , & de donner plus de ton à l'estomac.

On mange les raisins parfaitement mûrs. Ils lâchent doucement le ventre , adoucissent les âcretés de la poitrine , excitent l'appétit ; mais lorsqu'on en fait un usage immodéré , ils causent des coliques venteuses. Quoiqu'on puisse en permettre l'usage à toutes sortes de personnes , ils ne conviennent point aux vieillards.

On fait aussi sécher les raisins au soleil & au four. On en distingue de trois especes.

I°. RAISINS DE DAMAS. *Uva passa maxima* , seu *Passula damascena* , off. *Zibib* , Arabum. *Zibiba* , quorumdam. Voyez la figure du FIGUIER ; celle du RAISIN DE DAMAS y est représentée.

Ils portent le nom du pays où on les recueille & où on les prépare. Ils sont alors ridés, aplatis, bruns, à demi-transparents, charnus, couverts d'un sel essentiel doux & semblable au sucre.

La vigne qui produit ce raisin est désignée ainsi : *Vitis damascena*, H. R. Par.

Elle diffère des autres espèces de vignes par la grosseur de ses grains, qui ont la figure d'une olive.

II°. RAISINS PASSES ou Passerilles; Raisins de Provence. *Uva passa minores*, seu *vulgares*, off. *Passula massiliotica*, quorumdam.

Comme les raisins de Damas, ceux-ci sont séchés au soleil. Ils sont plus petits, d'une faveur douce & agréable, & comme confits. On les prépare dans la Provence & dans le Languedoc, mais on ne les coupe pas sur la même espèce de vigne.

Les habitants de Montpellier, dit M. GEOFFROY, sechent ainsi leurs raisins. Ils attachent les grappes deux à deux avec un fil, après en avoir ôté les grains gâtés avec des ciseaux; ils les plongent dans de l'eau bouillante, à laquelle ils ont ajouté un peu d'huile, jusqu'à ce que les grains se rident & se fanent; ensuite ils placent ces grappes sur des perches pour les sécher, & trois ou quatre jours après ils les mettent au soleil.

III°. RAISINS DE CORINTHE. *Uva passa minima*; *Passula corinthiaca*, off. Voy. la figure du FIGUIER; celle du RAISIN DE CORINTHE y est représentée.

Ce sont des raisins secs d'un noir purpurin, de la grosseur des grains de grosseilles ou des baies de sureau, sans pepins, d'une faveur douce, & agréablement acide.

Ils portent le nom d'une ville de la Grece, où croissoit cette vigne; mais on ne la trouve plus dans cette contrée. Au reste, les feuilles de cette
espèce

espece sont très amples , peu découpées , obtuses , fort épaisses , blanches en dessous. Les pepins de son fruit sont petits , & ne sont guere plus gros que ceux des groseilles. Elle se cultive dans les isles de Zacynthe , de Céphalonie , & autres isles de la domination des Vénitiens.

Voici la maniere de les préparer. Au mois d'Août , lorsque les raisins sont mûrs , après les avoir coupés , on les met à terre éloignés les uns des autres , pour les faire sécher au soleil. Lorsqu'ils sont secs on les nettoie , on les porte dans des magasins , on les y jette par une ouverture pratiquée au haut du toit , & on les remplit jusqu'au haut. Ces raisins se pressent par leur propre poids , de telle sorte qu'il faut pour les tirer de là des fers pointus. Pour les transporter , on en remplit des tonneaux , qu'on foule avec les pieds , afin qu'ils en tiennent une plus grande quantité , & que l'air en étant exclu , ils se conservent plus long-temps.

Les raisins secs , dont on a ôté les pepins , adoucissent le ventre & la sécheresse du gosier. Mangés avec les pepins , ils resserrent. On les fait entrer dans les ptisanes pectorales & adoucissantes ; ils facilitent l'expectoration. La dose est d'une once par livre d'eau. SCHULZIUS dit avoir éprouvé qu'en en mangeant une once , on se trouvoit soulagé de l'ardeur d'estomac.

Personne n'ignore que c'est avec le suc des raisins qu'on fait le VIN , cette liqueur agréable , dont les hommes tireroient plus d'utilité , s'ils en usoient avec modération. C'est un excellent cordial & un bon stomachique. Mais les excès du vin échauffent , & produisent à la fin l'apoplexie , la paralysie , la léthargie , & autres maux.

Il y a une infinité de vins différents , qui sont plutôt les délices des tables , qu'ils ne sont employés

en médecine , quoiqu'elle en prescrive quelquefois aux malades quelques uns par préférence aux autres.

On a imaginé de préparer , avec le vin , différentes liqueurs connues sous le nom de *vins médicaux*. On les fait de deux manières , ou par la fermentation , ou par la simple infusion.

I°. Ceux qu'on prépare par la fermentation , se font en mêlant les ingrédients avec le suc des raisins nouvellement exprimé , & qu'on fait fermenter ensemble ; mais la fermentation , dont le propre est de changer la nature du moût , change aussi celle des drogues qu'on y soumet , au point que les purgatifs les plus violents conservent à peine quelques propriétés laxatives après leur fermentation. Les sucres amers des végétaux , comme celui de l'absinthe , perdent considérablement de leur saveur , en se changeant en liqueur spiritueuse avec le moût , comme je l'ai éprouvé plusieurs fois. La résine des sucres gommeux résineux , qu'on soumet à la fermentation , se sépare , & fait partie de la lie , après s'être décomposée presque entièrement. Il semble que la nature , en faisant fermenter des corps de nature différente , tend à les amener tous au même état , & à les réduire tous à n'avoir que les mêmes propriétés. Comme la médecine ne peut retirer que peu ou point de secours des vins médicamenteux faits par fermentation , nous ne nous y arrêterons pas davantage , & nous allons examiner ceux qu'on prépare par infusion. *Elém. de pharm.*

II°. On va donner quelques exemples des vins médicaux par infusion.

Prenez de quinquina concassé , deux onces.
de vin rouge de Bourgogne , deux livres.

On met le tout dans une bouteille , qu'on bouche

bien ; on la tient dans un endroit frais pendant douze ou quinze jours , en ayant soin de l'agiter deux ou trois fois par jour , au bout desquels on filtre le vin au travers d'un papier gris. On le conserve à la cave dans des bouteilles , qui doivent être toujours entièrement pleines.

REMARQUES. On peut de la même manière préparer tous les vins médicinaux par infusion.

Ceux qui sont faits pour l'usage intérieur , doivent être préparés à froid , & être exposés dans un endroit frais , à l'abri du soleil. Il convient que le vaisseau dans lequel on fait l'infusion soit exactement bouché , parceque le vin contient un principe spiritueux qui se dissiperoit ; le vin acquerrait une qualité aigre , il seroit hors d'état d'extraire la même quantité de principes , que lorsqu'il contient toute sa partie spiritueuse.

Quelques pharmacopées prescrivent de faire digérer les vins dans des vaisseaux à une douce chaleur , sous prétexte d'extraire plus de principes dissolubles dans le vin. J'ai remarqué que la chaleur , en agissant sur le vin , en dérange sensiblement les principes , l'aigrit , ou le dispose à la fermentation acide ; & que d'ailleurs il ne se trouve pas plus chargé de principes extractifs , que par une infusion à froid suffisamment longue. Cette observation néanmoins ne doit s'entendre que pour les vins officinaux , qui doivent se conserver un certain temps : mais à l'égard de ceux qu'on prescrit à mesure qu'on en a besoin , on a recours à la chaleur du bain-marie , parceque le malade ne peut attendre la longueur de l'infusion à froid.

On ne doit jamais faire entrer dans la composition des vins officinaux que des substances seches , du moins que très peu de celles qui sont récentes ,

à cause de l'humidité qu'elles fournissent , qui affoiblit le vin & le fait gâter promptement. C'est à quoi l'on a eu grande attention dans la pharmacopée de Paris. Il n'en est pas de même des vins magistraux : comme ils ne sont faits que pour durer un certain temps , on peut y faire entrer les substances récentes.

Les plantes anti-scorbutiques doivent être employées récentes. L'humidité qu'elles fournissent au vin n'a pas la propriété de le faire gâter aussi promptement , que la plupart des suc des autres végétaux. Les vins anti-scorbutiques sont officinaux , & doivent être préparés par infusion à froid , lorsqu'on en a le temps & la commodité.

On emploie le vin blanc , le vin rouge , les vins de liqueur , pour la préparation des vins médicinaux. Le vin de quinquina fait avec du vin rouge , perd sa couleur au bout d'un certain temps. Il y a lieu de présumer que c'est le principe astringent du quinquina qui précipite la couleur du vin , comme le fait celui de la noix de galle , & celui de toutes les substances de même nature.

Vin émétique.

Prenez de foie d'antimoine , quatre onces.
de vin blanc , une livre.

On met ces deux substances dans une bouteille qui bouche bien ; on l'agite trois ou quatre fois par jour. On laisse ce vin en infusion à froid pendant huit à dix jours avant de l'employer , & on le conserve sur son marc.

REMARQUES. Ce vin émétique est donné dans toutes les pharmacopées : les doses de foie d'antimoine varient suivant les auteurs. Celles que nous

adoptons ici , sont celles qui sont prescrites dans la pharmacopée de Paris. Nous remarquerons que les effets de ce vin émétique sont sujets à varier considérablement.

1°. Par la nature du foie d'antimoine ou safran des métaux , qui n'en differe pas beaucoup , & qui se prépare , ou sans nitre , ou avec du nitre.

2°. Le vin blanc , qui n'est jamais d'une acidité égale , dissout plus de safran des métaux lorsqu'il est plus acide.

3°. Enfin cette préparation d'antimoine se dissout encore dans des proportions différentes dans le même vin blanc , suivant qu'elle est plus ou moins pulvérisée.

C'est vraisemblablement pour toutes ces raisons qu'on a retranché dans la nouvelle édition du codex de Paris le vin émétique , préparé avec le vin d'Espagne , destiné à être pris par la bouche : on l'ordonnoit parfaitement clair , & même filtré. On a conservé seulement celui qu'on prépare avec le vin ordinaire , & qui n'est employé que dans les remèdes âcres & très actifs. Les effets de ce vin sont plus violents lorsqu'on l'emploie trouble , que lorsqu'il est parfaitement clair. On le fait entrer dans les lavements dans ces deux états : c'est au médecin qui l'ordonne d'avoir une attention singulière de ne pas oublier de marquer sur sa formule l'état où il veut qu'on l'emploie , afin de ne pas mettre l'apothicaire dans le cas de faire contre son intention.

Il vaudroit beaucoup mieux préparer le vin émétique en dissolvant du tartre émétique dans du vin blanc ordinaire , ou dans du vin d'Espagne. Les effets de ce vin seroient beaucoup plus sûrs.

Laudanum liquide de SYDENHAM.

Prenez d'opium,	deux onces.
de safran,	une once.
de cannelle,	} ana un gros.
de girofle,	
de vin d'Espagne,	
	une livre.

On coupe menu l'opium & le safran, on concasse les girofles & la cannelle; on met toutes ces substances dans un matras, avec le vin d'Espagne; on bouche le matras avec de la vessie mouillée, qu'on assujettit avec du fil. On fait digérer ce mélange au soleil pendant douze ou quinze jours, ou au bain-marie, à une chaleur équivalente à celle du soleil: on agite le matras plusieurs fois par jour. Au bout de ce temps, on passe avec forte expression; on met la liqueur dans un flacon, on la laisse déposer; on la tire par inclination, ou bien on la filtre au travers d'un papier gris. On conserve cette teinture dans une bouteille qui bouche bien. Le vin d'Espagne est un vin de liqueur, qui n'est pas susceptible de s'altérer par la chaleur de la digestion, comme les vins ordinaires: il n'est pas non plus susceptible de s'aigrir avec la même facilité. *Elém. de pharm.*

Le MARC DES RAISINS n'est pas tellement exprimé, qu'il n'y reste encore des esprits spiritueux, capables d'être extraits. Aussi les gens de la campagne s'en servent-ils pour en obtenir, en versant de l'eau dessus. une liqueur qui devient pour eux une boisson: mais elle est sujette à s'aigrir. Elle ne convient point aux personnes qui ont l'estomac délicat; elle excite même des tranchées, cause des obstructions, & tous les accidents qui sont les effets des vins acides.

Ce marc en fermentation est d'un grand secours en certains cas : on en enveloppe les membres attaqués de rhumatismes , de paralysie ou de goutte sciatique , & pour fortifier les nerfs.

EAU-DE VIE. C'est la partie spiritueuse retirée par une premiere distillation du vin , ou de toute autre liqueur qui a subi la fermentation spiritueuse : c'est à-dire , à proprement parler , l'esprit ardent ou l'esprit de vin.

Pour faire l'eau de vie qui est dans le commerce , on met le vin dans de très grands alambics de cuivre , auxquels sont adaptés des serpentins , & on mene les distillations de maniere qu'il sorte du bec de l'alambic un filer continu de liqueur ; & on soutient cette distillation jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la liqueur qui distille commence à n'être plus inflammable.

On sent bien que cette distillation étant fort prompte & très peu ménagée , ne peut fournir qu'un esprit de vin fort impur , & chargé de beaucoup des autres principes du vin : aussi l'eau-de-vie contient elle beaucoup d'eau surabondante & beaucoup d'huile de vin , substances totalement étrangères à l'esprit-de-vin proprement dit.

Ces matieres hétérogenes que contient l'eau-de-vie , empêchent qu'on ne puisse s'en servir dans les opérations de chymie : on est obligé de la soumettre à de nouvelles distillations ou rectifications pour la purifier & la changer en esprit-de-vin *Dict. de chym.*

L'esprit ardent , qu'on nomme aussi **ESPRIT-DE-VIN** , parcequ'on ne peut le retirer que des substances qui ont subi la fermentation vineuse , est une liqueur très légère , très volatile , très fluide , d'une odeur & d'une saveur fortes , pénétrantes , agréables , parfaitement blanche & limpide.

Cet esprit s'enflamme facilement , sans qu'il soit besoin de le chauffer. Sa flamme est légère , blanchâtre au centre , bleuâtre vers ses bords , & peu lumineuse ; elle n'est accompagnée d'aucune espee de fumée ni de suie ; elle est tranquille & ne fait aucun pétilllement ; elle n'a point de vapeur suffocante , ni d'autre espee particuliere.

L'esprit de vin parfaitement pur (car c'est de celui-là qu'on parle ici) brûle ainsi , avec le concours de l'air libre , sans laisser le moindre vestige de résidu charbonneux , salin , terreux , ni d'aucune espee.

Quoique l'esprit-de-vin soit inflammable dans toute sa substance , il est néanmoins miscible à l'eau , sans aucun intermede & en toutes sortes de proportions : ce qui est un caractere spécifique de cette substance ; car elle est la seule connue qui ait ces propriétés.

Si l'on expose l'esprit-de vin à la chaleur dans les vaisseaux clos , il ne s'enflamme point , mais se réduit facilement en vapeurs , qui passent dans la distillation. Ces vapeurs rassemblées ne sont autre chose que de l'esprit-de-vin , absolument semblable à ce qu'il étoit d'abord , & qui n'a pas subi la moindre décomposition ni altération : il reste ainsi inaltérable , quelque grand nombre de distillations successives qu'on lui fasse subir.

En général , l'esprit-de-vin s'unit avec tous les acides , ce qui diminue leur acidité : aussi nomme-t-on les acides ainsi combinés avec l'esprit-de-vin , *acides dulcifiés*.

L'esprit de-vin est regardé communément comme le dissolvant des huiles & des matieres huileuses ; mais il n'est en effet , & à proprement parler , le dissolvant que d'une seule espee d'huile : ce ne sont que des huiles essentielles , & leurs concrétions

tels que les baumes & les vraies résines, que l'esprit-de-vin peut dissoudre. Il n'attaque, ni les huiles grasses, ni les concrétions huileuses qui leur sont analogues, telles que la cire, le beurre, les graisses des animaux, ni même certaines matières qui paroissent participer davantage de la nature des vraies résines, telles que la gomme copal & les bitumes.

En faisant digérer dans de l'esprit-de-vin des plantes aromatiques, par exemple, le thym, la lavande, le romarin, &c. on obtient une liqueur spiritueuse chargée du principe de l'odeur & de l'huile essentielle de ces plantes. Ces espèces d'eaux aromatiques spiritueuses, faites par infusion, servent à différents usages dans la médecine. Elles sont ordinairement colorées par une partie de la matière extractive de ces végétaux, que l'esprit-de-vin dissout aussi, ou par des substances de différentes couleurs qui résident dans la substance résineuse. On leur a donné à cause de cela le nom de *teintures*.

L'esprit-de-vin contenant le principe phlogistique très développé & très libre, agit sur le genre nerveux, comme toutes les substances qui contiennent un principe inflammable très atténué & très volatil. Il est aussi un très puissant anti-putride : de là vient qu'on l'emploie avec beaucoup de succès pour préserver de la putréfaction les matières qui en sont susceptibles. On s'en sert comme topique dans la gangrene, & on en fait une liqueur dans laquelle on peut conserver des animaux, ou des parties d'animaux, si long-temps qu'on veut sans corruption.

VINAIGRE. C'est un acide végétal, spiritueux, qui est produit par le second degré de la fermentation, ou par celle qui succede à la fermentation.

spiritueuse , & qu'on nomme par cette raison *fermentation acide* ou *acéteuse*.

Il suit de cette définition qu'il n'y a que le vin , ou les liqueurs vineuses , qui puissent se transformer en vrai vinaigre. Toute liqueur qui a subi complètement la fermentation spiritueuse se porte d'elle-même , & nécessairement , à la fermentation acide : ainsi il n'y a point de vin , de quelque nature qu'il soit , qui ne tende continuellement à devenir vinaigre , & qui ne le devienne en effet au bout d'un temps plus ou moins long , suivant les circonstances , à moins qu'on ne l'en empêche par les moyens qui s'opposent à toute fermentation en général. On peut donc faire du vinaigre , & on en fait en effet , non seulement avec le vin de raisin , mais encore avec le cidre , la biere , en un mot avec tous les autres vins : mais comme le vinaigre de vin de raisin l'emporte de beaucoup sur tous les autres , ce sera celui-là que nous choisirons pour exemple.

Comme le vinaigre est le produit d'une fermentation , la maniere de le faire ou de conduire cette fermentation contribue infiniment à sa qualité. Le vin qu'on destine à être transformé en vinaigre , & que les vinaigriers achètent pour cela , est ordinairement à moitié gâté & tournant à l'aigre ; ce qui fait croire à bien des personnes que de tel vin est le meilleur pour faire le vinaigre : mais c'est une erreur , car il est constant au contraire que le vin le meilleur , le plus généreux , le plus spiritueux , est toujours celui qui produit le plus fort vinaigre , & que plus on peut retenir les esprits du vin pendant la fermentation acéteuse , & plus le vinaigre qu'on obtient a de qualité.....

Quoiqu'il soit vrai qu'il faille de bon vin pour faire de bon vinaigre , cependant , comme le vinaigre a

une moindre valeur dans le commerce que le bon vin , ce n'est que du vin tourné , & qui n'est plus vendable comme vin , qu'on emploie communément pour le vinaigre.

Les vinaigriers ont différentes pratiques pour faire leur vinaigre , & le public croit même qu'ils ont pour cela un secret particulier , qu'il nomme le secret des vinaigriers. Cependant il paroît certain qu'il ne s'agit , pour faire de très bon vinaigre , que d'employer de bon vin , & de faire procéder la fermentation acide de la maniere la plus avantageuse : de même que , pour faire le bon vin , le point essentiel est d'avoir du moût de bonne qualité , & de le faire fermenter régulièrement. C'est la nature qui fait réellement les principaux frais de ces fermentations.

La méthode pour faire le vinaigre consiste en général à mêler le vin , qu'on veut faire fermenter , avec sa lie & avec son tartre , & à le mettre dans un endroit dont la température soit assez chaude , comme de dix huit à vingt degrés. Cette fermentation paroît exiger , pour bien aller , un peu plus de chaleur que la spiritueuse ; elle est plus tumultueuse , & produit elle-même plus de chaleur. Il est bon qu'elle soit menée vivement. Cependant , comme elle croît d'elle-même rapidement , on est obligé de l'intercepter de temps en temps , pour l'empêcher de s'emporter trop fortement.

BOERHAAVE décrit dans ses *Eléments de Chymie* un travail qui paroît très bien entendu pour faire le vinaigre. Cette méthode consiste à mettre le vin , préparé comme nous avons dit , dans deux cuves placées verticalement sur un de leurs fonds , & ouvertes supérieurement. A un pied au dessus du fond de ces cuves est établie une espece de claie , sur laquelle on met un lit de branches de vignes

vertes, & par dessus des rasses de raisin jusqu'au haut de la cuve. On distribue le vin dans ces deux cuves, de maniere que l'une en est totalement remplie, & que l'autre ne l'est qu'à moitié. Vers le second ou troisieme jour, la fermentation commence dans la cuve demi-pleine; on la laisse aller pendant vingt-quatre heures, après quoi on remplit cette cuve avec de la liqueur de la cuve pleine, & on répète ce changement toutes les vingt-quatre heures, jusqu'à ce que toute la fermentation soit achevée, ce que l'on connoît à la cessation du mouvement dans la cuve demi-pleine; car c'est dans cette derniere que se fait principalement la fermentation. Comme le défaut d'air la fait cesser presque totalement dans la cuve pleine, on interrompt par cette manœuvre la fermentation, qui ne se fait, à proprement parler, que de deux jours l'un, & on l'empêche de s'emporter trop loin, quoiqu'on la mene d'ailleurs avec l'activité qui lui est favorable.

La fermentation du vinaigre, conduite de cette maniere, dure environ quinze jours en France pendant l'été; mais lorsque la chaleur est très grande, comme au vingt-cinquieme degré du thermometre de M. de RÉAUMUR, & au delà, on fait de douze en douze heures le changement d'une cuve à l'autre.

On trouve dans le *Dictionnaire portatif des Arts & Métiers* une autre méthode des vinaigriers de Paris, par laquelle ils font un assez bon vinaigre, tiré de la lie de vin. Cette méthode consiste à exprimer d'abord, par le moyen de la presse, tout le vin qui peut être contenu dans les lies. Ils mettent ensuite ce vin dans de grands tonneaux d'environ un muid & demi, dont ils laissent le bondon ouvert. Ils placent ces tonneaux dans un endroit chaud, & laissent faire la fermentation, en ayant l'attention de la ralentir de temps en temps par une

nouvelle addition de vin quand elle va trop vite. Ce procédé se rapporte assez, comme on le voit, au précédent.

L'acide du vinaigre est employé dans un assez bon nombre de préparations de chymie & de pharmacie. On ne se sert point, pour la plupart de ces préparations, du vinaigre en nature, mais de sa partie acide spiritueuse retirée par la distillation : cet acide est connu sous le nom de *vinaigre distillé*.

L'acide du vinaigre dissout toutes les substances sur lesquelles les autres acides quelconques ont de l'action, & forment avec elles des sels neutres, dont plusieurs ont des noms particuliers, mais qu'on peut nommer en général *sels acéteux*.

Le vinaigre est d'un très grand usage, non seulement dans la vie ordinaire, comme un assaisonnement piquant & agréable de beaucoup d'especes de mets & d'aliments, mais encore dans la médecine, dans la chymie & dans plusieurs arts.

Cet acide est en général anti-putride, & est regardé comme incisif & apéritif. On le fait servir d'excipient à plusieurs préparations qui ont ces vertus, telles que l'oxymel simple, qui n'est qu'une espece de syrop fait avec le vinaigre & le miel, & les oxymels scillitiques, de colchique, & plusieurs autres vinaigres composés, tant pour la médecine que pour la toilette, dont on trouve les recettes dans les dispensaires. Mais une vertu du vinaigre d'une importance beaucoup plus grande, si elle se confirme, c'est celle de guérir la rage. M. BUCHOZ, dans un ouvrage intitulé *Traité historique des plantes qui croissent dans la Lorraine & les trois Evêchés*, assure qu'on a constaté par plusieurs épreuves heureuses que le vinaigre est en effet un remede efficace contre la rage, lorsqu'on le prend à la quantité d'une livre par jour en trois doses, le matin, à midi & au

soir. C'est le hasard qui a fait faire cette découverte ; elle s'est faite par la méprise d'un habitant d'Udine en Frioul, dans la dépendance de Venise. Cet homme, attaqué de la rage, en fut guéri par un verre de vinaigre, qu'il avala au lieu du remède qui lui avoit été préparé. *Dict. de chym.*

VIGNE blanche à baies rouges. Voyez BRYONE, première espèce.

VIGNE blanche à baies noires. Voyez BRYONE, seconde espèce.

VIGNE sauvage d'Amérique. Voyez PAREIRA BRAVA.

VIGNE D'OURS, ou Boufferolle. *Uva ursi*, CLUS. & TOURN. *Vaccinia ursi*, GER. *Radix idæa putata* & *Uva ursi*, J. B. *Uva ursi*, GALENI. *Vitis idæa foliis carnosiss & veluti punctatis*, sive *Idæa radix*, Diosc. C. B. *Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis*, LINN.

C'est, dit LEMERY, *Dict.* un petit arbrisseau qui ressemble à l'airelle ou myrtille ; mais ses feuilles sont plus épaisses, oblongues, arrondies, approchantes de celles du buis, plus étroites, rayées des deux côtés, nerveuses, d'un goût astringent accompagné d'amertume. Ces feuilles sont attachées à des rameaux ligneux, longs d'un pied, couverts d'une écorce mince & facile à séparer. Ses fleurs naissent en grappes aux sommités des branches, formées en grelots, de couleur rouge. Lorsqu'elles sont passées, il leur succede des baies presque rondes, molles, rouges, renfermant chacune cinq osselets rangés ordinairement en côtes de melon, arrondis sur le dos, aplatis sur les autres côtés. Ces baies ont une saveur styptique.

Cette plante croît en Espagne, sur les collines sablonneuses de la Suede, & dans la Gottlande.

Depuis vingt ou vingt-cinq ans on recommande,
pour

Vigne d'Ours, ou Raisin d'Ours.

Uva Ursi,



pour se précautionner contre les douleurs néphrétiques, les feuilles de vigne d'ours réduites en poudre très fine. En faisant couler les urines, elles dégagent les voies urinaires des mucus visqueux qui s'y trouvent, & entraînent les graviers. Cette poudre se prescrit depuis un scrupule jusqu'à un gros; mais on la donne ordinairement à la dose de demi-gros le matin à jeun pendant six ou huit jours, en observant de mettre un jour d'intervalle. Elle se prend dans un bouillon ou dans une tasse d'infusion de thé ou de capillaire; & le jour où on la suspendra, on boira un bon verre d'une décoction de pariétaire, qui, en balayant les voies urinaires, favorisera l'excrétion des graviers & du mucus visqueux.

M. SAUVAGES, médecin de Montpellier, ayant donné la poudre seule pendant dix jours consécutifs à la dose de demi-gros, observa que des pierres avoient été brisées. Cet effet de la vigne d'ours, dit M. VOGEL, dépend sans doute de la vertu astringente de ses feuilles, laquelle est très considérable.

Un médecin célèbre, qui chaque année rend compte au public de ce qu'il a observé, M. DE HAEN, parloit des propriétés de cette plante en 1757. *Rat. med. part. ij. cap. 12. p. 218. éd. Par.* On ne sera pas fâché, sans doute, de voir ici ce qu'il en dit.

On peut hardiment assurer, disoit-il, que la vigne d'ours est un excellent remède dans les maladies des reins & de la vessie, lorsqu'on est assuré de la présence d'une pierre, & lors même qu'on en soupçonne seulement l'existence. Elle appaise chez quelques-uns les douleurs, au point que leur vie en devient moins insupportable; chez d'autres, elle dissipe tellement tous les symptômes, qu'ils se croient guéris.

Il y a long-temps que M. VAN SWIETEN m'a

vanté les vertus de cet arbrisseau, & qu'il m'a donné tout ce qu'il en avoit. M. LUC MISLEI, aussi habile en botanique qu'en médecine, qui en a ramassé une grande quantité pour moi dans les Alpes de la Stirie, au milieu des neiges, m'en a donné cette description.

Uva ursi, *Αρκτοςάφυλος*, TOURNEF. Inst. r. h.

C'est, suivant M. LINNÆUS, une espece d'arbrisseau, & même un arbrisseau dont les tiges ne se soutiennent point, & dont les feuilles sont entieres. J. BAUHIN, *Hist. plant. univ. t. j. liv. v. cap. 8. pag. 523*, en donne une excellente figure; mais la description qu'il en fait est moins exacte: celle de GALIEN, *lib. vij. κατά τόπους, cap. 4*, paroît beaucoup meilleure. Ce petit arbrisseau rampe à terre; il croît dans un petit nombre de lieux, mais les plus froids, & couverts d'une neige perpétuelle. Je dis un petit nombre de lieux, car en parcourant beaucoup de montagnes fort élevées, je n'en ai encore trouvé que dans deux endroits; en Autriche, sur la montagne nommée *Alpé-Gans*, située à cinq lieues de Villeneuve (*Neapolis*) d'Autriche; dans la Stirie, sur les Alpes couvertes de neiges, éloignées de six lieues de Celle (ou Marien-Celle) où l'on en trouve abondamment parmi les neiges perpétuelles. Ses tiges sont rampantes, son écorce roussâtre, ses feuilles ferrées, oblongues, ovales, entieres, charnues. Ses fleurs sont monopétales, ovales, dont la base est applatie, & le bord divisé en cinq parties, lesquelles sont obtuses, roulées, petites. Ses fruits (ou baies) sont arrondis, semblables à une petite cerise, rouges, remplis de cinq graines osseuses, plates. La plante garde toujours sa verdure; son fruit mûrit la seconde année. Tout cet arbrisseau, & sur-tout

l'écorce & les feuilles , ont une faveur amere & astringente , à peu près comme le quinquina. Au reste , en faisant la récolte de cette plante , il faut être attentif à ne pas prendre l'airelle ou les myrtilles rouges au lieu de la vigne d'ours ; car ces deux plantes paroissent absolument semblables. Elles ne se distinguent bien l'une de l'autre , qu'autant qu'on est instruit des systêmes botaniques. Voici néanmoins ce qui constitue leur différence : la fleur de la vigne d'ours a dix étamines , celle de l'airelle n'en a que huit ; les baies de la premiere n'ont que cinq graines , celles de la seconde en ont souvent vingt.

Après avoir bien marqué les caracteres de cette plante , voyons quels sont ses usages en médecine.

I^{re}. Un homme de soixante ans étoit fréquemment incommodé , depuis vingt ans , de difficulté d'uriner , en sorte qu'il rendoit goutte à goutte , & avec des douleurs aiguës & insupportables , une urine très fétide , purulente , muqueuse , sanguinolente. Tourmenté quelquefois d'ischurie , il auroit dû être soulagé par la sonde. L'urethre auroit-il été blessé par le cathéter , ou lésé par l'acrimonie de l'urine ? Le cathéter au moins ne sçauroit être employé , qu'on ne s'assure s'il y a une pierre dans la vessie.

Après avoir fait précéder les infusions balsamiques & relâchantes , on donna chaque matin à cet homme un demi-gros de cette plante réduite en poudre ; & l'on introduisit dans l'urethre des bougies , qu'on dit être les mêmes que celles qui ont rendu M. DARAN célèbre & l'ont enrichi. Ces bougies ont parfaitement guéri le canal ; mais le cathéter qu'on a introduit n'a pu être porté en tout

sens , sans doute à cause de l'étroitesse de la vessie , accident ordinaire chez ceux qui sont obligés de rendre leur urine à tout moment : car la vessie alors ne se trouvant plus distendue , se contracte & se rétrécit. Au reste cet homme , ayant fait usage pendant sept mois entiers de ces poudres , laisse couler actuellement depuis quelques mois des urines , abondantes & muqueuses à la vérité , mais moins fétides. Il ne ressent plus ces douleurs qui l'ont cruellement tourmenté pendant tant d'années ; il dort bien , a bon appétit , marche , a repris des forces , & urine sans remarquer aucun obstacle dans l'urethre. Ayant négligé toutes sortes de remèdes pendant six mois , il se remit à l'usage des poudres dès qu'il sentit les premières atteintes d'une légère douleur.

II°. Un autre homme de soixante ans , qui , pendant un espace de temps aussi considérable , avoit rempli sa maison & son voisinage de ses cris & de ses plaintes , fut attaqué d'une ischurie qui revenoit tous les jours ; de sorte que , durant sept semaines entières , il falloit lui introduire la sonde le matin & le soir. Ce secours néanmoins suspendoit à peine l'atrocité de ses douleurs pendant deux heures ; & si quelquefois elles étoient moins cruelles , il ne rendoit pourtant aucune urine qu'une fois le jour , & par le moyen de la sonde. Il avoit outre cela une hernie considérable , connue sous le nom d'oschéocèle. Tel étoit son état , lorsqu'il s'adressa à nous.

On adapta à sa hernie un bandage convenable. Un demi-grôs de poudre de vigne d'ours donné chaque matin , & un léger parégorique le soir , ramenerent le calme au point que , dès le sixième jour , on n'eut plus besoin du secours de la sonde.

L'urine cependant étoit toujours fétide ; & quoique rendue matin & soir , lorsque nous examinions celle qui étoit évacuée entre sept & huit heures du matin , elle fermentoit avec le vinaigre. Mais après avoir continué les mêmes remedes pendant trois mois & demi , il eut la facilité de retenir plus long-temps son urine , il fut exempt de douleurs , reprit des forces , & de cacochyme qu'il étoit , il devint parfaitement sain. Se voyant puni , par des renouvellements de souffrances , d'avoir négligé ses remedes , il revint à l'hôpital pour les reprendre. Dès qu'il fut exempt de douleurs , & qu'il eut suspendu quelque temps l'usage des remedes , pour s'assurer s'il pouvoit sans inconvénient s'en passer , il vint remercier Dieu & moi de sa guérison. Je lui conseillai de prendre de la poudre de deux jours l'un ; il n'est pas revenu.

III°. Voici une autre observation. Il survint à un enfant de cinq ans des ulceres au scrotum , de l'un desquels sortit une pierre. La tumeur du scrotum étoit considérable , la douleur étoit vive , il fluoit continuellement une matiere blanche , & l'urine couloit involontairement & goutte à goutte des ulceres ouverts. Les symptomes énoncés s'évanouirent enfin peu à peu , quoiqu'il restât dans l'urethre une douleur vague , & qu'il coulât goutte à goutte de l'urethre une matiere blanche. Mais , à sa vingtieme année , les douleurs du scrotum , surtout du côté droit , & la tumeur reparurent , & l'ulcere se rouvrit comme auparavant. Tant qu'il fut ouvert , il n'y avoit point de douleur ; dès qu'il fut fermé , elle recommença à se faire sentir. S'étant encore rouvert , il en coula , sans qu'il s'en apperçût , de l'urine & une matiere blanchâtre , principalement dans le temps que l'urine passoit par le canal de l'urethre. Les testicules n'étoient point

affectés ; seulement le droit étoit plus gros que le gauche , ce qui peut-être étoit naturel. Entre les deux testicules , dans l'endroit où le corps caverneux est uni à l'urethre , on apperçoit un corps dur fongueux , qui sembleroit être une appendice de l'urethre , adhérent en ce lieu avec le scrotum retiré & ridé , d'où l'urine paroïssoit venir. Tout le périnée étoit mol & sain. On ne peut accuser , que je sçache , aucun virus vénérien. Les premières atteintes d'une vive douleur s'étoient fait sentir dans le testicule gauche , & le corps pampiniforme du même côté étoit variqueux. Le malade avoit souvent reçu du soulagement d'un onguent fait avec deux onces d'onguent de nicotiane , mêlé avec deux gros de myrrhe , aussi-bien que d'un emplâtre composé d'une once d'emplâtre de grenouilles avec mercure , d'une égale quantité de diabotanium divin , & d'un gros d'huile de rhue distillée. Il se trouvoit en cet état lorsqu'on nous demanda du secours.

D'après ce récit , on voit clairement qu'à l'âge de cinq ans il sortit de l'urethre , par l'ulcère externe , une pierre : mais d'où venoit-elle ? Si c'eût été de la vessie , le malade auroit eu une ischurie , à la continuité de laquelle personne n'auroit pu résister ; car le calcul ne corrode pas seulement l'urethre , le corps caverneux & le scrotum , pour s'ouvrir un passage. Mais s'il s'est arrêté dans le scrotum sans ischurie , il lui a fallu un long temps avant qu'il se fît par là une route. N'est-il pas plus probable de penser qu'il y avoit eu d'abord inflammation & suppuration dans l'urethre , que l'urine âcre avoit séjourné dans le petit ulcère , l'avoit augmenté , & avoit déposé en cet endroit les principes d'une pierre existants dans le corps de tout homme sain ; qu'elle y avoit produit un calcul , qui peu à peu se sera pratiqué une issue au dehors.

Cette pierre étant sortie, il fut pendant quinze années exempt des principaux symptomes ; mais il ressentit souvent dans l'urethre de la douleur & de l'ardeur. Il paroît qu'il est resté une légère disposition à l'ulcere, toujours lavé par la trassudation de l'urine, mais aussi se renouvelant par le passage & l'application de cette même urine : de sorte que cette légère ulcération se fera entretenue jusqu'à sa vingtième année, & de cet ulcere dans le scrotum uni avec l'urethre il fera une seconde fois décollé de l'urine & du pus. L'ulcere formé a pu se fermer difficilement, parceque l'urine y causoit une irritation continuelle ; mais, quoique fermé au dehors, l'urine séjournant dans son fond, fit naître une seconde fois de cuisantes douleurs. La callosité que nous avons découverte dans le corps caverneux de l'urethre a été produite, comme elle l'est toujours, par l'ulcere.

La vigne d'ours nous ayant donc paru aussi avantageuse dans l'ulcere des reins, des ureteres, de la vessie, avec soupçon de calcul, nous la lui avons fait prendre. Après l'avoir mise en usage pendant trois mois, il voit à plaisir ses ulceres se fermer ; & est tellement délivré de douleur, d'ardeur & de tout autre symptome, qu'il se croit entièrement guéri. Cependant, parcequ'il distille de temps en temps de l'urethre dans le gland une matiere blanche, je lui ai conseillé de continuer le remede pendant quelques mois ; ce qu'il n'observe pas exactement, dans l'idée où il est que sa guérison est parfaite.

IV^v. Une femme, âgée de plus de quarante ans, commença à sentir depuis quatre ans des lassitudes de tout le corps, de vives douleurs des lombes, auxquelles il succéda huit jours après un pissement de sang qui dura un mois & demi ; mais après ce

pisserment de sang, les urines furent très limpides. Par l'application des sangsues, elle se trouva par intervalles foulagée de ses hémorrhoides aveugles. Ses règles garderent leur période; & quoique son urine ait été mêlée de sang une fois ou deux, les douleurs des lombes resterent si grandes, qu'il lui étoit impossible de plier le corps: mais elle ne rendit jamais rien de purulent, & jamais elle ne souffrit ni de l'ischurie ni la dysurie. Ce fut au mois d'Août de 1756 qu'elle vint me trouver, & se plaignit qu'après s'être occupée de ranger & de nettoyer sa maison, elle pissâ le sang durant dix jours, avec des douleurs de lombes très aiguës. Son urine, quoique récente, étoit fort fétide. Ce récit annonce bien clairement un calcul des reins.

Après avoir d'abord prescrit des adoucissans & des parégoriques, on en vint à la vigne d'ours. Huit jours après l'urine ne fut plus sanglante ni fétide; un large emplâtre de labdanum appaisa merveilleusement les douleurs insupportables des lombes. L'usage de la vigne d'ours, continué pendant deux mois, la mit en état de se dire parfaitement en santé. Je lui conseillai cependant de prendre encore ce remède pendant quelque temps. Je ne l'ai point revue.

On a des preuves différentes de l'efficacité de la vigne d'ours en différents cas, disoit le même auteur en 1759 (*Rat. med. part. iv. cap. vij. p. 189, éd. Par.*) Il sera utile d'en faire un rapport exact.

Tous ceux qui ont eu une suppuration forte & continuelle, mais rebelle à tous les remèdes dans les voies urinaires, les reins, les uretères, la vessie, l'urethre, le scrotum, le périnée, sans qu'il y ait aucune cause vérolique, & sans aucun signe qui annonçât la présence d'une pierre; tous ont été entièrement guéris par l'usage de la vigne d'ours,

& reconnoissent qu'ils lui doivent la santé constante dont ils jouissent.

La plupart de ceux qui étoient attaqués de calcul ou de graviers en ont reçu un soulagement si durable , que long-temps après l'usage du remède , ils n'ont ressenti aucune douleur ni souffert aucune incommodité , soit en rendant leur urine , soit en la gardant. Il s'est trouvé parmi eux un vieillard de quatre-vingts ans , qui , pendant quarante ans , rendoit fréquemment de petites pierres & beaucoup de graviers , & même un mucus fort épais , & qui éprouvoit par conséquent les douleurs les plus aiguës. Avant que d'employer ce secours , il avoit inutilement consulté plusieurs médecins de l'Europe (1).

La seconde classe est celle de ceux qui , ayant

(1) Baumgartnerin , âgée de cinquante-neuf ans , ayant eu il a deux ans une fièvre maligne qui avoit été mal jugée , fut long-temps languissante , & se rétablit enfin au point qu'elle commençoit à faire quelques pas , bien qu'avec beaucoup de peine. Mais durant ces deux années , elle fut cruellement tourmentée par une dysurie & par une strangurie , causées par cette fièvre maligne ; sa main droite étoit restée si foible , qu'elle ne pouvoit rien prendre ni saisir , & les extrémités des doigts étoient toujours froids. Je la soumis , dit M. DE HAEN , à l'électricité , & lui prescrivis la *vigne d'ours*. Après avoir employé à son égard ces deux moyens durant deux mois , elle fut tellement rétablie , qu'au bout d'un mois après sa parfaite guérison elle alla rendre grâces à Dieu , & à moi , de se trouver entièrement délivrée de cette double incommodité. (*Part. iv. cap. viij. n°. 2. pag. 195. édit. Paris.*)

George Huber , âgé de cinquante-six ans , étant venu me trouver pour la première fois le 3 Mars 1759 , me dit que depuis dix-neuf ans il souffroit de violentes douleurs dans les lombes & au périnée , & avoit rendu plusieurs petites pierres. Il m'observa que ses douleurs commençoient à se faire sentir constamment vers les lombes , d'où elles descendoient jusqu'à l'aine. Il y avoit dix jours qu'il avoit senti une pierre être

paru foulagés par ce remede , font ensuite retombés ; puis l'ayant repris , ont été presque guéris , & cela par deux , par cinq ou six fois. Je conseille à ceux-ci d'en continuer l'usage sans interruption ; ce que l'on obtient à peine de la plupart , dès qu'ils se trouvent bien.

La troisieme classe regarde ceux , ou qui n'ont ressenti aucun soulagement , ou seulement pour un temps , en sorte que pendant l'usage du remede ils avoient à essuyer des symptomes aussi graves que ceux qui ne l'avoient point pris ; ou ceux qui ont dû avoir recours à l'opération , ou qui , exté-

chassée du rein , puis être poussée par l'uretere , & qu'ayant commencé à s'échapper par l'urethre , elle s'y étoit arrêtée & y étoit demeurée quatre jours ; que pendant ce temps-là l'urine couloit goutte à goutte. Il fut obligé alors de se rendre à la campagne , porté dans une voiture. Le calcul sortit avec effort , & avec lui une grande quantité d'urine ; mais bientôt les anciens symptomes reparurent. Vers le même temps , c'est-à-dire neuf jours après , en s'éveillant la nuit , il s'aperçut que le bras gauche étoit paralysé , & le lendemain tout le côté & la langue ; mais celle-ci étoit moins affectée. Mon premier soin fut de donner du secours aux voies urinaires lésées , en lui faisant prendre de la vigne d'ours : il en fut soulagé comme par miracle. Cependant on soumit les parties paralytiques , & toute l'épine du dos , à une vapeur aromatique , & on y fit de fortes frictions. Dans l'espace d'un mois les symptomes du calcul s'étant absolument dissipés , je commençai à l'exposer à l'action de l'électricité. Le quatrieme jour , lorsqu'il subissoit l'effort électrique , il sentit descendre du rein un calcul , qui , poussé ensuite dans l'urethre , fut jetté dehors dans l'espace d'une heure , tandis qu'auparavant l'urethre avoit coutume d'être douloureusement vexé par ce cruel hôte durant trois & quatre jours. Comme par la suite il ne sentit plus de douleurs , & qu'il ne rendit plus de calcul , bien qu'il eût fait usage de la vigne d'ours , l'espace de deux mois il négligea de travailler à la guérison de sa paralysie , quoiqu'il ne pût pas moins se flatter de s'en voir guéri , que de sa pierre.

nués & affoiblis , & par conséquent hors d'état de supporter la cystitomie , ont péri malheureusement.

Parmi ces derniers , fut un enfant dont il est parlé *Rat. med. part. iij. cap. iv. §. iij. pag. 343. édit. Paris. (1)* : il n'en reçut qu'un soulagement passager. Il avoit une fièvre hectique , & fut destiné à l'opération ; mais étant survenu une dyssen-

(1) Un enfant , qui n'avoit pas encore atteint sa septième année , après avoir eu deux ans auparavant la petite vérole & la rougeole , commença à se plaindre de difficulté & de douleur en urinant. Son urine se chargeoit de plus en plus d'un gluten très épais ; il rendit même une fois du sang avec son urine. Les douleurs augmentèrent peu à peu de telle sorte , que la vie étoit insupportable à l'enfant. On s'assura par la sonde de la présence d'une pierre. Ayant mangé des prunes qui n'étoient pas assez mûres , & bu par dessus beaucoup d'eau , il fut attaqué pendant treize jours , d'abord par une violente fièvre quotidienne , & d'une fièvre continue rémittente , & le onzième jour de cette fièvre il lui survint une chute du fondement ; il lui arriva aussi une excoriation au prépuce. Je retins ce malade dans l'hôpital. Comme deux choses demandoient spécialement tous mes soins , sçavoir la douleur insupportable d'uriner , & la fièvre continue rémittente , je pourvus à l'une par une décoction d'orge miellée , & à l'autre , par une décoction de vigne d'ours donnée trois fois le jour avec un parégorique , faisant faire d'ailleurs deux fois par jour une injection avec de l'huile de lin ; déterminé à attaquer par d'autres remèdes cette fièvre , si elle continuoît à être continue rémittente. Mais étant diminuée peu à peu , puis rendue quotidienne , elle disparut absolument enfin le quatorzième jour. Les symptômes du calcul furent apaisés avec la guérison de la fièvre , au point qu'il ne souffrit plus que de temps en temps , qu'il retint plus aisément son urine , & que la nuit il n'en laissoit écouler qu'une fort petite quantité. Son urine , moins alkaline que celle d'un autre enfant dont j'ai parlé , & moins pâle , contenoit plus rarement du mucus , mais plus fréquemment des écailles. *Dr HAEN , Rat. med. &c.*

terie , accompagnée de ténefme & d'une chute considérable de l'intestin , on différoit l'opération. Il fut enfin enlevé par cette dyssenterie.

On fut assuré par l'inspection du cadavre de l'enfant , que l'opération auroit été inutile. La vessie s'étoit rétrécie autour du calcul en une substance épaisse & compacte , en sorte qu'il restoit à peine une cavité pour contenir de l'urine. En saisissant la pierre avec les tenettes , elle se rompit en mille pieces. Chaque uretere étoit dans toute sa longueur , gros comme le doigt , mais inégalement , calleux , & par conséquent absolument incapable de contraction. On remarqua dans l'uretere droit un volvulus considérable ; toute la surface interne étoit purulente , & répandoit du pus. Les reins étoient entièrement calleux. En un mot , toutes les parties qui servent à la sécrétion & à l'excrétion de l'urine étoient tellement affectées , que le malade n'auroit retiré aucun avantage de l'opération.

Il s'est trouvé un plus grand délabrement encore de toutes ces parties dans le cadavre d'un homme âgé de trente-sept ans. Une dépravation de cette nature ne sçauroit être guérie par les remedes , ni par l'opération. Da quelle utilité pourroit elle être en effet , lorsque le bassin des reins & les ureteres sont très dilatés , tortueux , calleux , purulents ? Comme il est impossible de les connoître par aucun signe antérieur , il est clair que la lithotomie est d'un événement incertain , & qu'il faut prévenir sérieusement sur son danger les malades qui demandent à s'y soumettre , ou auxquels on la conseille.

N'auroit-on pas droit de soupçonner de temps en temps que ceux qui n'ont retiré aucun avantage de la vigne d'ours sont affligés de semblables dégénérationes ? Seroit il vrai de dire que l'opération sera malheureuse pour ceux qui ne se seront pas trouvés

soulagés par l'usage de cette plante ? Il n'y a rien au moins qui prouve le contraire. Le bassinnet calleux , l'uretere calleux , contourné , dérangé de sa situation naturelle , & plus semblable à un intestin qu'à un uretere , ouvrent un passage à l'urine , en ramassent une grande quantité , mais ne la déposent qu'avec beaucoup de difficulté dans une vessie calleuse & resserrée. Il y a plus , c'est qu'une vessie épaisse d'un doigt & même davantage , calleuse dans sa totalité , incapable de se cicatrifer si l'on y fait une incision , excite une strangurie , si le malade survit.

Puisqu'on remarque dans la vigne d'ours des propriétés si grandes contre les abscesses des voies urinaires , je m'appliquerai à en essayer les vertus contre les abscesses des autres visceres.

Le même M. DE HAEN , en 1760 , rend compte des succès qu'il a eus en faisant usage de cette plante. (*Part. v. cap. v. §. 1. pag. 306. édit. Paris.*) Il parle ainsi :

Un homme de moyen âge , qui , depuis quatorze ans , ressentait des douleurs en urinant , de l'avis de quelqu'un , prit tous les jours pendant neuf mois sept avelines & neuf baies de genievre. Ce remede lui ayant fait rendre pendant trois mois une urine semblable à de la lie de vin , il mena long-temps une vie moins insupportable ; mais enfin les douleurs revinrent. Depuis un an ses urines sont remplies d'un gluten très abondant ; des épreintes violentes le tourmentent , au point que l'intestin rectum sort au dehors de la grosseur du poing. Quelquefois il a quelque relâche. Les remedes , qui autrefois lui avoient procuré quelque soulagement , ne lui sont actuellement d'aucun secours. Il se fait sonder , & on sent distinctement une pierre dans la vessie.

Après avoir fait usage pendant six mois de vigne d'ours, & d'un opiat sur le soir, il parut presque guéri. Il ne tient aucun compte des légers accidents qui renaissent de temps en temps, & néglige absolument un remède qu'on lui donne gratuitement, & qui se prend sans répugnance. J'ai ajouté à dessein la formule du remède avec lequel il avoit autrefois apaisé son mal, afin qu'on sçache qu'il y a dans la nature plus de remèdes qu'on ne croyoit, capables de soulager dans cette maladie.

Un homme de trente-deux ans étoit sujet, depuis sa quatrième année, à une difficulté d'uriner, & avoit rendu plusieurs pierres. Vers l'âge de vingt-quatre ans il prit, par l'avis d'une femme, une liqueur qui avoit l'odeur & la saveur de la térébenthine, & s'en trouva fort bien durant l'espace de sept ans. Comme sa pauvreté ne lui permit point de continuer à faire les frais de ce breuvage, il lui substitua les baies de genievre; mais enfin, vaincu par l'atrocité des douleurs qui revinrent, il se remit à l'usage de son ancienne boisson, sans pourtant en ressentir aucun soulagement. M. GLEISNER, qui exerce avec distinction la médecine à Gratz, ville capitale de la Stirie, s'étant chargé du soin de cet homme, en conféra avec moi. En lui prescrivant des décoctions vulnéraires, à cause du pus qu'il rendoit, & la vigne d'ours avec un opiat, il lui procura un grand soulagement, & le délivra de toute souffrance l'espace de sept semaines : le malade cependant perdit insensiblement toutes ses forces, tomba dans le marasme, & périt.

En ouvrant son cadavre, on vit dans les reins, qui étoient fort gros, & sur-tout le gauche, des sacs remplis de pus. Les ureteres étoient si élargis, que le gauche excédoit la grosseur de l'intestin

colon. La vessie étoit resserrée autour de la pierre , & entièrement ulcérée : celle-ci pesoit quatre onces moins un gros , un de ses côtés étoit jaune , & l'autre cendré.

Ceci confirme évidemment ce qui a été établi (*part. iv.*) sur différentes observations anatomiques ; sçavoir , qu'on ne pouvoit guérir par l'opération ceux qui ne l'avoient pas été par la vigne d'ours ; car l'extraction du calcul par la cystitomie ne corrige point , n'emporte point la dégénération des uréteres , de la vessie & des reins. Il paroît encore , par ce qui a été dit , qu'on peut employer différents moyens avec lesquels on vient à bout de calmer ces maux pour une longue suite d'années. En parlant de la liqueur qui ressemble à la térébenthine , je me suis souvenu de l'huile de Harlem , très fameuse en Hollande , qui approche aussi beaucoup de la térébenthine par son odeur. Elle est nuisible à plusieurs. J'en ai cependant connus qui se sont délivrés de leurs douleurs , pendant plusieurs années , par son usage. LAURENBERG , *in dissert. de lithontr. ad Hoyer.* a pensé avoir trouvé dans les cloportes avec de l'huile de vitriol de Rostoch , un remede efficace contre le calcul ; SCHULZE (*vid. disput. chir. in collect.*) & HALLER , *t. iv.* dans l'usage abondant de l'huile de vitriol très rectifié. Cependant la vigne d'ours paroît l'emporter sur tous les autres remedes , puisqu'elle est utile à plusieurs , & qu'elle rend les guérisons constantes , lors même que le calcul subsiste encore (1).

(1) Des succès journaliers & très heureux ont suivi l'usage de la vigne d'ours ; ils ont pour garants & pour témoins M. DE HAEN & des médecins de Paris. Comme les propriétés & les vertus des médicaments ne sçauroient être trop tôt publiés , on joindra les propres paroles de M. DE HAEN , tirées

§. iij. Quoique son effet soit prompt dans plusieurs, on observe qu'il est très long dans d'autres; ce que j'ai sur-tout remarqué il y a presque trois ans dans un enfant de deux. En effet, il se trouva à peine soulagé du remede, continué pendant quatre mois; il le fut ensuite, d'une maniere inconstante; & au bout de l'année, d'une maniere très assurée. Son état cependant est tel, que si les pere & mere veulent conserver leur enfant dans une santé stable, ils ne doivent jamais interrompre l'usage de cette poudre. Il y a plus de trois ans qu'on s'est convaincu,

d'un ouvrage nouvellement imprimé, afin que les médecins prescrivent cette plante plus promptement & plus sûrement, & que ceux qui seroient tourmentés de la pierre s'en servent avec plus de confiance.

Les douleurs insupportables causées par la présence d'une pierre dans le rein, & sur-tout dans la vessie, se dissipent parfaitement & sans retour par l'usage de la vigne d'ours; en sorte que durant quatre ans (car les expériences faites ne datent pas de plus loin [A],) on ne remarqua point le plus léger symptôme de calcul logé dans la vessie, & que les malades vivent en effet comme s'ils n'eussent jamais eu de pierre. Cependant ce corps étranger n'est pas dissout par la vertu lithontriptique; car l'examen réitéré fait avec la sonde démontre amplement, & qu'il demeure le même, & qu'il est quelquefois assez couvert d'aspérités. Ce qui reste uniquement de l'un & l'autre de ces calculs, est une matiere blanche dans l'urine, ou seulement visqueuse, ou comme purulente. En se séchant, l'une & l'autre matiere forme des fragments calcaires; mais comme ils la rendent sans accident, sans douleur, sans ténésie, sans strangurie, & qu'en cela ils sont semblables aux personnes saines, ils se regardent comme absolument exempts de pierre.

[A] M. DE HAEN, qui parle ainsi en 1761, se trompe certainement pour le temps; car avant 1750, on avoit donné la vigne d'ours à Montpellier, comme un remede excellent dans les maladies dont il est ici question.

par la sonde, que la pierre étoit raboteuse ; on s'en est encore assuré cette année.

Cet enfant n'éprouve point, comme les autres, le même effet du remede ; car ceux-ci, après en avoir fait un long usage, ignorent s'ils ont encore la pierre, quoiqu'ils aient quitté le remede depuis long-temps. Cet enfant au contraire, dès qu'il l'interrompt pendant un certain intervalle, est forcé d'y revenir pour faire cesser les douleurs qui se renouvellent. C'est pourquoi, si cette année il ne reçoit point de soulagement plus considérable, nous proposerons l'opération de la taille, puisque d'un côté la vigne d'ours, bien qu'elle lui ait été très profitable, annonce pourtant clairement une dégénérescence dans le système urinaire, sans être encore bien décidée néanmoins ; ce qui est prouvé par les observations précédentes : que, de l'autre côté, il est à craindre, ou que l'enfant ne commence à se dégoûter d'un remede si long-temps continué, ou que les pere & mere ne l'interrompent ; car le remede étant suspendu pendant un temps, le mal paroît sensiblement renaître. En ce cas, l'enfant tomberoit dans l'état le plus déplorable ; & le remede n'étant plus porté dans la vessie, dans les ureteres ou dans les reins, il tomberoit bientôt dans un dépérissement incurable.

§. iv. Au mois de Février 1759 un pere & une mere m'amenerent leur fils, âgé de neuf ans, qui, depuis sa naissance, avoit toujours paru souffrir & se plaindre en lâchant son urine, & ne jamais la rendre naturellement, mais continuellement & goutte à goutte. Ces pauvres gens, accoutumés par degrés à ces souffrances de leur enfant, n'y apportèrent aucun secours. Mais comme ils ne pouvoient plus le voir, sans la plus vive compassion, cruellement tourmenté depuis quatorze jours, ils

me le présenterent. La sonde ne nous laissa aucun doute sur l'existence d'une pierre.

Il est incroyable combien la vigne d'ours le soulagea , après deux mois de son usage. La douleur néanmoins étant ensuite revenue , les pere & mere perdirent toute espérance de guérison , & laisserent leur enfant sans secours. Cependant les souffrances cruelles augmentèrent au point , qu'ils s'adresserent tantôt à celui-ci , tantôt à celui-là. Il s'écoula une année depuis que l'enfant nous fut présenté : le pere nous le ramena au mois de Mai , nous demandant avec instance que nous lui fissions l'opération. Voulant nous assurer de la présence de la pierre , ce ne fut qu'avec peine , avec douleur , avec hémorrhagie , que nous pûmes introduire la sonde & la faire mouvoir , en sorte que cette fois il nous fût impossible de sentir la pierre : mais ayant insinué le doigt dans l'anus , nous crûmes la sentir vers le col de la vessie.

On se déterminà à l'opération , elle fut faite. Il survint des accidents effrayants , qu'on calma. On mit encore en usage la vigne d'ours , & le petit malade périt.

VIGNETTE ou VIGNOBLE. Voyez MERCURIALE.

VINETTE. Voyez OSEILLE ordinaire.

VIOLETTE de Février. Voyez PERCE-NEIGE.

VIOLETTE de Mars ou de carême : Violette ordinaire : Violier commun. *Viola* , off. *Viola martia purpurea* , flore simplici odoro , C. B. Pin. *Viola martia purpurea* , J. B. *Viola nigra sive purpurea* , DODON. Pempt. *Viola simplex martia* , PARK. Parad. *Viola sativa* , BRUNF. *Viola martia dracox purpurea* , LÖBEL. Icon. *Viola simpliciter picta* , vel *nigra cognominata* , GESN. Horr. *Viola purpurea* , MATTHIOLI , Lugd. Bat. *Viola acaulis*

Violette de Mars.
Viola martia.



Stolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicalibus, LINN.

De sa racine, qui est fibrée, épaisse, vivace, sortent des feuilles arrondies, dentelées sur leurs bords, vertes, attachées à de longs pédicules. Sa fleur, que soutient un pédicule grêle, est pourprée, ou d'un bleu tirant sur le noir, d'une odeur douce & agréable, d'une saveur visqueuse légèrement âcre. Cette fleur est composée de cinq pétales & de cinq étamines. A cette fleur succede une capsule ovale, dans laquelle sont renfermées plusieurs graines arrondies, menues, blanchâtres.

On trouve la violette dans les bois, dans les buissons, dans les fossés, dans les lieux ombrageux. Elle fleurit au printemps, vers le mois de Mars, & conserve sa verdure durant l'hiver.

La racine est purgative & émétique.

Les feuilles sont du nombre des émollientes, & purgent doucement le ventre. Elles remédient à la difficulté d'uriner. Elles appaisent, suivant FERNEL, les douleurs de tête excitées par la bile. Elles entrent dans les clysters & dans les décoctions.

On place parmi les fleurs cordiales celles de violettes, dont l'odeur est si gracieuse. Elles ont une vertu analeptique; elles calment la toux, dissipent l'enrouement, & amollissent le ventre. BAGLIVI leur attribue une vertu spécifique dans les maladies convulsives. BRASSAVOLE en recommande les étamines contre l'épilepsie.

La semence de violette est diurétique, & est bonne contre la difficulté d'uriner, prescrite en émulsion ou sous toute autre forme. Elle est regardée par CRATON comme lithontriptique.

On prépare avec les fleurs un syrop excellent contre les maladies de la poitrine. On le prescrit comme incrassant & rafraîchissant.

VIOLETTE des forciers. *Voyez* PERVENCHE commune.

VIOLETTE, giroflée des dames. *Voyez* JULIENNE.

VIOLETTE de trois couleurs : Herbe de la Trinité : Pensée. *Herba Trinitatis*, BRUNF. *Viola tricolor*, DODON. *Viola Trinitatis*, TABERN. *Viola tricolor hortensis repens*, C. B. *Jacea major*, sive *Viola tricolor*, CAST. *Viola tricolor major & vulgaris*, PARK. *Viola flamma*, *coloria*, *calida*, Adv. LOBEL. *Jacea*, sive *Flos Trinitatis*, vel *Hep-tachrum*, GESN. Hort. *Jacea tricolor*, sive *Trinitatis Flos*, J. B. RAI Hist.

Sa racine est fibreuse ; il en pousse des feuilles dont les unes sont arrondies , & les autres oblongues , dentelées sur leurs bords. Ses fleurs sont composées de cinq étamines peintes de trois couleurs , sçavoir , de bleu , de pourpre ou de blanc , & de jaune , inodores. Il leur succede des coques , où sont renfermées de menues graines.

Cette plante , qui se cultive dans les jardins , est incisive , vulnérable , détersive , sudorifique. Elle est bonne dans les affections de la poitrine , contre les maladies cutanées , & pour lever les obstructions de la matrice.

VIOLIER bulbeux. *Voyez* PERCE-NEIGE.

VIOLIER commun. *Voyez* VIOLETTE de Mars.

VIOLIER jaune. *Voyez* GIROFLIER jaune.

VIORNE ; Hardeau ; Bourdene ou Bourdaine. *Viburnum*, off. *Viburnum vulgò*, C. B. Pin. *Lantana vulgò*, aliis *Viburnum*, J. B. *Viburnum*, MATTHIOL. & Tourn. Inst. r. h. & PARK. & RAI Hist. *Lantana*, sive *Viburnum*, GERARD. *Viurna vulgi* Gallorum & Ruelli, LOBEL. CAST. *Spiræa Theophrasti fortè*, Dalecampii, Lugd. hist. *Viburnum foliis cordatis acutè crenatis venosis subtùs tomentosis*, LINN.

Viburnum Viorne.



De sa racine , qui rampe à la superficie de la terre , sort un arbrisseau qui s'éleve quelquefois à la hauteur d'un arbre ; mais le plus ordinairement il ne fait que s'étendre en largeur. Son bois est fongueux & moëlleux. Il pousse des branches de trois à quatre pieds de longueur , grosses comme le doigt & très flexibles , revêtues d'une écorce blanchâtre. Ses feuilles , qui ressemblent assez bien à celles de l'orme , naissent opposées ; elles sont amples , épaisses , crénelées sur leurs bords , velues , blanchâtres , principalement en dessous , d'une saveur astringente. Des sommités des branches sortent des fleurs en ombelles , découpées en cinq crénelures , garnies de cinq étamines blanchâtres dont les sommets sont arrondis : elles sont blanches & odorantes. Elles se changent en des baies molles , ovales , d'abord vertes , puis rouges , enfin noires dans leur maturité , d'une saveur douceâtre & peu agréable. Elles renferment une graine assez dure , large , aplatie , crénelée.

Cet arbrisseau , qui fleurit en été , & même plus tard , & dont les baies n'ont acquis leur maturité que sur la fin du mois d'Août , & même en Septembre , se trouve dans les bois , dans les haies , sur les montagnes , dans les lieux incultes & pierreux.

La viorne n'est pas d'un grand usage en médecine , quoiqu'elle ait quelques propriétés. Ses baies & ses feuilles sont rafraîchissantes & astringentes. Les unes & les autres sont bonnes en gargarisme , suivant MATTHIOLI , contre les inflammations de la bouche & du gosier , & pour raffermir les gencives. En décoction , elles arrêtent le flux du ventre & celui des hémorrhoides. L'écorce moyenne est regardée par MAYERNE comme vesicatoire.


L'eau distillée des feuilles passe pour un fort bon collyre dans les maladies des yeux.

VIORNE des gens de la campagne. Voyez CLÉMATITE.

VIPERE. *Vipera*, off. & omnium ferè auctorum. *Vipera nostras*, Ind. med. *Vipera anglica fusca*, dorso linea undulata nigricante conspicua, PETIV. Mus. *Anguis cinerea*, macula dorfi fusca longitudinali dentata, Act. upsal. *Anguis scutis abdominalibus* 144, *squamis caudæ* 39, Amph. Gyllenb. LINN.

Les viperes mâles & femelles que nous avons en France ayant pris leur croissance, dit M. CHARAS, sont par le milieu du corps de la grosseur d'un bon pouce ; mais celui des femelles est plus gros, lorsque leurs vipereaux sont prêts à voir le jour. Elles ont d'ordinaire deux bons pieds de long ; il s'en trouve même qui ont quelque chose de plus. Leur tête, qui est plate, a comme un rebord autour des extrémités de sa partie supérieure, & elle differe en cela des couleuvres, qui ont tout ce tour émoussé & rabattu, & la tête plus pointue & plus étroite à proportion de leur corps. La tête de la vipere a en tout un pouce de long, & vers son sommet elle est de sept à huit lignes de large, puis diminuant peu à peu, sa largeur n'est plus que de quatre ou cinq lignes à l'endroit des yeux, & de deux lignes seulement vers le bout du museau. Elle a deux lignes & demie de hauteur, ou d'épaisseur. Son col, considéré dans son commencement, est d'environ la grosseur du petit doigt : celui des mâles est tant soit peu plus gros que celui des femelles. Il s'en trouve néanmoins quelques-unes qui, étant pleines, paroissent avoir le col plus gros même que celui des mâles. La queue de ceux-ci est toujours

Tête .




Tête .

Dents
Venimeuses .



Vipera, Vipere .



Dessiné par M^r de Carssault

Gravé par Martinet

plus longue & plus grosse que celle des femelles, à cause qu'elle contient les deux membres qui servent à la génération, outre les deux vésicules féminales. Elle a environ quatre travers de doigt de longueur, mais celle des femelles n'en a guere que trois. Le haut de la queue des mâles est, dans son commencement, assez conforme en grosseur à leur col, & finit en pointe de même que la queue des femelles; mais elles ne piquent ni l'une ni l'autre & n'ont aucun venin.

La vipere a la peau marquetée; mais le fond de la couleur varie, car il est tantôt blanchâtre, tantôt rougeâtre, tantôt gris, tantôt jaune & tantôt tanné. Ce fond est toujours semé de taches noires, qui paroissent comme des caracteres arrangés par des espaces assez égaux & relatifs les uns aux autres, sur-tout au dessus & aux côtés du corps. Il y en a aussi sur la tête, & entre autres deux en forme de cornes, qui prennent naissance entre les deux yeux, qui s'ouvrent & s'étendent vers les deux côtés du sommet de la tête, & qui quelquefois ont quatre ou cinq lignes de long & une demi-ligne de large. Vis-à-vis le milieu de ces deux cornes se présente une tache, de la grandeur d'une petite lentille, en forme de fer de pique, qui, étant comme la première de toutes ces taches, semble les guider tout le long de l'épine du dos. La peau est entièrement couverte d'écailles, dont les plus fortes sont celles qui sont au dessous de tout le corps. Leur grandeur & leur force sont nécessaires, parcequ'elles fortifient la vipere dans l'endroit le plus foible: d'ailleurs elles la soutiennent, & lui servent comme de pieds pour ramper & pour porter son corps çà & là. Ces grandes écailles sont toujours de couleur d'acier d'un bout à l'autre, & different de celles des couleuvres, qui sont d'ordinaire marquetées de couleur

jaune. Elles s'ouvrent & s'accrochent , lorsqu'elle veut reculer ou s'arrêter. L'extrémité de ces grandes écailles est comme cousue au bas d'autres petites écailles qui couvrent tout le corps. Ces petites écailles sont merveilleusement bien arrangées , & couchées les unes sur les autres , à peu près comme ces rangs de petites ardoises taillées en demi-rond qu'on voit sur les toits en quelques endroits. On ne remarque que six ouvertures à la peau de la vipere : la plus grande est celle de la gueule , les autres sont celles des deux narines & celle qui est au bas du ventre , joignant le commencement de la queue , laquelle renferme non seulement le trou de l'intestin destiné pour vuider les excréments , mais aussi ceux des parties de la génération , tant des mâles que des femelles. Cette ouverture est bouchée par la dernière des grandes écailles , qui est avancée en forme de demi-rond , & qui s'ouvre en s'abaissant au temps du coït , de même que quand les vipéreux naissent ou que les viperes vuident leurs excréments.

La gueule s'ouvre & se ferme au gré de l'animal , les narines demeurent toujours ouvertes , & les yeux ont des paupieres pour les couvrir au besoin. Il n'y a point d'ouverture à la peau pour donner passage à l'ouïe , la nature y employant les ouvertures des narines. Les viperes quittent pour l'ordinaire deux fois l'année cette peau écailleuse , sous laquelle elles se trouvent revêtues d'une qui est toute formée , & qui paroît d'abord bien plus belle & d'une couleur beaucoup plus éclatante que celle qu'elles ont quittée. Il s'en forme encore insensiblement une nouvelle , qui se prépare aussi pour servir à son tour lorsque celle qui la couvre se séparera ; en sorte que la vipere a en tout temps une double peau : & toutes ces peaux , quoique garnies

d'écailles , sont néanmoins transparentes quand on les regarde à travers le jour.

Le museau de la vipere est composé d'un os en partie catilagineux , & recouvert de la peau écailleuse. Il y a de chaque côté deux conduits qui forment les narines , lesquelles ont chacune une petite ouverture ronde , & leur nerf propre qui leur communique l'odorat. Les mêmes conduits servent aussi à recevoir deux petits nerfs , qui sortent chacun de la partie latérale du crâne , pour porter aux narines la faculté de l'ouïe.

Les yeux de la vipere sont fort vifs , & leur regard est fort vif & fort hardi : les autres parties de l'œil sont assez conformes à celles des yeux des autres animaux. La mâchoire supérieure est divisée en deux sur le devant , & séparée par l'os cartilagineux du museau , où ses deux bouts sont articulés de chaque côté ; & les grosses dents , situées de chaque côté hors de leur rang , leur servent de défenses. La mâchoire inférieure est aussi divisée en deux : les deux mâchoires sont attachées par devant l'une à l'autre , au moyen d'un muscle qui les ouvre & resserre au gré de l'animal.

La vipere , suivant MM. MEAD & JAMES , a deux sortes de dents ; de grandes , dans lesquelles le venin réside , & de petites. Les premières sont attachées à l'os de la mâchoire supérieure ; elles sont crochues & courbées comme les dents canines de la plupart des animaux carnassiers. Elles sont visiblement creuses jusques près de leur pointe , qui est très dure & très perçante , pour qu'elles pénètrent mieux dans la peau , ainsi qu'il est aisé de s'en appercevoir en cassant les dents par le milieu. Cette cavité se termine à la partie convexe de la dent , par une petite fente visible , exactement semblable à celle d'une plume à écrire , & qui donne passage

au venin. Les petites dents sont crochues & recourbées comme les premières, à la réserve qu'elles n'ont ni fente ni ouverture : elles forment quatre rangs, deux à chaque côté de la gueule. Elles tiennent au troisième os de la mâchoire supérieure, & au second de l'inférieure; elles servent à la vipère à s'assurer de sa proie dans le temps qu'elle mord.

La liqueur venimeuse de la vipère est séparée du sang par deux glandes situées de chaque côté de la tête, dans la partie antérieure & latérale du sin-ciput, directement derrière l'orbite de l'œil. Elle est immédiatement placée sous le muscle qui sert à abaisser la mâchoire supérieure, de façon que celui-ci ne peut agir qu'il ne la presse; ce qui facilite la sécrétion de la liqueur qu'elle contient. Cette glande est conglomérée, ou composée de plusieurs autres glandes plus petites, enfermées dans une membrane commune, dont chacune envoie un vaisseau excrétoire qui se dégorge dans un vaisseau plus grand, qui va se vider dans la vésicule des gencives. Cette vésicule tient à la base du premier os de la mâchoire supérieure, aussi bien qu'à l'extrémité du second, & couvre la racine des grosses dents. Elle en a une autre à son sommet, dont la partie antérieure donne passage aux dents qui versent le venin.

La vipère femelle a sa matrice divisée en deux corps semblables, situés de chaque côté, le long des intestins, qui les séparent. Elle met au monde ses petits vivants, dont le nombre va quelquefois jusqu'à vingt-cinq.

La vipère rampe lentement; elle ne bondit ni ne saute jamais. Quand on lui fait du mal & qu'on l'irrite, elle devient furieuse, & fait des morsures très perçantes; mais elle n'attaque jamais ni les hommes ni les bêtes, si l'on ne lui en donne sujet. Elle attaque & tue néanmoins les animaux qu'elle
veut

veut dévorer pour sa nourriture , comme les cantharides , les scorpions , les grenouilles , les souris , les taupes , les lézards & d'autres semblables , qu'elle avale tout entiers , après les avoir tués avec ses grosses dents. On sent bien qu'il lui faut plusieurs jours pour faire la digestion d'animaux si gros , relativement à la capacité de son estomac , & qu'elle doit rester alors dans un état de stupeur & d'engourdissement. La vipere peut demeurer plusieurs mois sans manger , & elle ne mange plus dès qu'elle est prise. Elle ne fait point de trou dans la terre pour s'y cacher ; mais elle se met sous des pierres , dans de vieilles masures , où elles se trouvent souvent entassées & entortillées en grand nombre. Elle se cache aussi , quand il fait beau , sous des buissons & sous des herbes touffues. La saison de l'accouplement commence vers le mois de Mars : elle porte ses vipéreaux quatre ou cinq mois , & devient pleine une seconde fois.

Il se trouve des viperes dans plusieurs provinces de France , en Dauphiné , dans le Lyonnais , dans le Poitou ; en Italie , en Suede & ailleurs.

La morsure de la vipere , comme on sçait , est très dangereuse : si l'on n'y apporte pas de prompts secours , elle est suivie de la mort. Les symptomes qui surviennent sont une douleur aiguë dans la partie blessée , avec une enflure rouge & ensuite livide , qui gagne peu à peu les parties voisines. Ces accidents sont suivis de syncopes considérables , d'un pouls fréquent , profond , intercadent , de soulèvements d'estomac , de vomissements bilieux & convulsifs , de sueurs froides , & quelquefois de douleurs dans la partie ombilicale. La plaie rend souvent une liqueur sanieuse ; il s'élève autour de la plaie quelques petites pustules , toute la peau devient jaune.

On a indiqué bien des remèdes contre la morsure de ce reptile. Nous allons en rapporter plusieurs. La racine d'anthora a été vantée, aussi-bien que les racines, les feuilles & les graines de dompte-venin.

On a mis en usage les feuilles fraîches de groseillier. On les pile dans du vin, on en exprime le suc, & on en donne un verre, ou huit onces, deux fois le jour pendant huit jours, à ceux qui ont été mordus. Le premier verre se prend le matin à jeun, & l'autre trois ou quatre heures après le dîner; & l'on applique sur les plaies les feuilles pilées dont on a exprimé le suc.

ANGUILLARA dit que le suc de turquette pris en boisson, ou la plante étant mâchée, ou même appliquée en cataplasme sur la plaie, est utile contre la morsure de la vipère. La même vertu est attribuée à la scorfonere.

L'historien SUÉTONE rapporte que le suc des fruits de l'if est l'antidote contre la morsure de la vipère. Faut-il l'en croire?

La vipérine est mise au nombre des remèdes contre le poison de ce reptile. DIOSCORIDE & les anciens l'ont dit; CÉSALPIN l'a assuré après eux. On prendra, selon lui, une poignée des feuilles, & environ une demi-once de la racine, on les pilera, & on les mettra infuser dans trois verres de vin; on le fait boire au malade, & l'on applique le marc sur la blessure.

On placera ici quelques observations, dont on pourra profiter.

Il y a quelques années, dit SAVIARD, *Observation* 38, pag. 175, que M. Champagneux, marchand apothicaire demeurant dans l'isle Notre-Dame, fut mordu d'une vipère, ainsi qu'il me l'a raconté; & voici comment ce malheur lui arriva. Son garçon ayant préparé trois vipères, que l'on

étoit venu demander avec empressement pendant qu'ils étoit sorti pour ses affaires , laissa malheureusement les trois têtes de ces insectes sur la table sans les avoir écrasées. M. Champagneux revenant de la ville , les voulut enfiler pour les faire sécher , ne pensant pas qu'elles fussent encore en état de le blesser. Il en enfila deux ; mais la troisième le mordit au milieu du pouce , dans le temps qu'il étoit prêt de l'enfiler avec les deux autres. Dès qu'il se sentit blessé , il arracha cette tête , qui renoit à son doigt par sa défense crochue , & il pensa aussi-tôt à se précautionner contre les suites de cet accident par des remèdes , tant extérieurement appliqués sur la piquure , que pris intérieurement , pour s'opposer aux progrès du venin de cet animal. Pour cela , il fit beaucoup saigner sa plaie , & fit une ligature au dessus ; après quoi , il la couvrit d'un emplâtre de sa meilleure thériaque , dont il avala en même temps une bonne dose , & par dessus un verre de vin vieux. Il s'assit ensuite auprès du feu pour y présenter son doigt , suivant cette maxime : *Venum attrahitur ab igne*. Il n'y resta pas long-temps sans se sentir surpris d'un grand mal de cœur , qui l'obligea à passer dans sa cour pour prendre l'air ; & s'y étant assis , il se sentit pressé comme d'une barre devant & derrière : puis voulant se relever , les jambes lui manquèrent , & l'on fut obligé de le porter dans son lit , où il avoit beaucoup de peine à respirer. Il vomit ensuite , à deux reprises , des matières jaunâtres ; après cela il perdit connoissance , laquelle lui étant revenue bientôt après , il fut saisi d'un grand froid par tout le corps , & il resta dans cet état depuis dix heures du matin jusqu'à onze heures du soir. Deux médecins de ses amis lui firent prendre à diverses fois , pendant cet intervalle , des doses compétentes de sels volatiles & de poudre

de vipere, dans du vin vieux, ou dans d'autres véhicules appropriés, jusqu'à ce que son pouls étant un peu revenu, & la chaleur commençant à se faire sentir aux extrémités, ces messieurs lui conseillèrent de diminuer un peu l'usage de ces remèdes, qui avoient trop d'activité. Il eut ensuite une sueur universelle, qui fut suivie d'une enflure énorme de tout le bras, de la main, & de tout le côté de la morsure, jusqu'au dessous de l'ombilic, accompagnée d'une ecchymose fort noire à toute la peau de ces parties. On remédia à tous ces inconvénients par des embrocations faites avec l'esprit volatil de vipere, d'urine, la meilleure thériaque, & l'esprit de vin rectifié, qui furent continués pendant trois semaines, aussi bien que les remèdes intérieurs; après quoi, le malade se trouva en parfaite santé. L'exposition de ce fait nous doit insinuer deux choses : 1°. que c'est dans les remèdes tirés de la vipere même qu'il faut chercher les spécifiques les plus efficaces contre le venin de cet animal; 2°. qu'il ne faut pas perdre un seul instant à les mettre en usage, de peur que le désordre que ce venin subtil peut causer en très peu de temps dans le sang du blessé, ne puisse plus être réparé par les meilleurs remèdes.

MM. GEOFFROY & HUNAUD ont lu à l'Académie, en 1737, un Mémoire, dans lequel ils examinent si l'huile d'olives est spécifique contre la morsure des viperes. On a cru devoir l'insérer ici.

L'Académie & le public ont été informés qu'un paysan anglois assuroit avoir trouvé un spécifique contre la morsure des viperes, dans l'application de l'huile d'olives : on disoit même que des expériences que ce paysan avoit faites sur quelques animaux, en présence de personnes éclairées, confirmoient cette propriété de l'huile.

La matiere étoit trop importante , pour que l'Académie n'en prît pas connoissance. Elle nous chargea donc de vérifier si on pouvoit réellement regarder l'huile d'olives comme un remede propre à empêcher les terribles effets du venin de la vipere.

Nous allons rapporter les expériences que nous fîmes dès le mois de Juillet de l'année précédente , pour nous assurer de l'effet de ce remede. Nous exposerons ensuite ce que l'ouverture des animaux qui ont péri par la morsure des viperes ; nous a fait appercevoir ; enfin nous exposerons quelques réflexions que nos expériences nous ont donné occasion de faire.

Nous avons fait mordre par des viperes un nombre assez considerable de pigeons & de poulets , deux coqs , une oie , un dindon , deux chats & huit chiens.

A l'endroit mordu par la vipere , on apperçoit d'abord , pour l'ordinaire , deux petits point rouges , quelquefois il paroît un peu de sang ; il se forme en peu de temps une tumeur , qui augmente & qui s'étend : c'est à la jambe que nous avons fait piquer la plupart des animaux. La jambe , dans les volatiles , est cette portion de l'extrémité qu'on comprend ordinairement avec la partie qui est au-dessus sous le nom de *cuisse* ; c'est ce qu'on appelle vulgairement dans les poulets rôtis *le pilon*. La tumeur gagne la cuisse , qui devient livide ainsi que la jambe ; la tumeur & la lividité augmentent , & s'étendent jusques sous le ventre. Il survient ordinairement des vomissemens & des mouvemens convulsifs ; quelquefois les volatiles remuent leur col comme pour vomir , il leur sort du bec quelque humeur : la mort ne tarde pas pour l'ordinaire.

Nous ne nous sommes servis dans toutes nos expériences que des viperes qui nous ont paru

les plus vives & les plus fortes. On coupoit les plumes qui couvroient les parties des volatiles que nous faisons mordre , & nous avions soin de présenter ces parties de façon que les dents des viperes pénétraissent dans les chairs , pour que la morsure ne se bornât pas à une simple égratignure de la peau.

Lorsque nous disons simplement qu'un pigeon , ou tel autre animal , a été mordu par une vipere , nous entendons que la vipere n'avoit pas encore mordu d'autres animaux. Dans le cas où elle aura déjà servi à faire une ou plusieurs morsures , nous aurons soin d'en avertir.

Pour reconnoître les effets de la morsure de la vipere sur les pigeons , nous en avons fait mordre quatre , sans rien tenter pour leur guérison. Un est mort au bout d'un quart d'heure & demi ; les trois autres ont été mordus successivement par la même vipere qui avoit déjà mordu quatre autres animaux. Le premier mordu de ces trois pigeons est mort en dix minutes , le second en cinquante minutes , & le troisieme au bout d'une heure & cinq minutes.

Deux pigeons ayant été mordus , nous avons trois minutes après chauffé la partie , nous l'avons ensuite frottée avec l'huile d'olives chaude , & ils sont morts , l'un en vingt-cinq minutes , & l'autre en une heure & demie.

Deux autres pigeons ont été mordus , on les a frottés dans le moment avec l'huile bien chaude , sans chauffer auparavant la partie. L'un est mort en quinze minutes , & l'autre en une heure & demie.

Tous ces pigeons , comme nous l'avons dit , ainsi que presque tous les poulets dont nous allons parler , ont été mordus au pilon.

Nous avons fait mordre un pigeon à l'aile , & nous y avons appliqué tout de suite l'huile , il est mort en cinq minutes. Huit poulets ont été mordus

au pilon, on ne les a point frottés avec l'huile, ils ont tous eu les accidents qui se manifestent après la piquure; mais il y en a deux qui ont réchappé. Un est mort dans l'espace d'une heure; deux, qui avoient été mordus par une même vipere, sont morts: le premier a péri au bout d'une heure, le second au bout d'une heure & un quart. Enfin les trois derniers ont été mordus par une même vipere, qui avoit déjà mordu auparavant un animal. Le premier mordu de ces trois poulets a péri dans l'espace d'une heure, le second au bout de sept heures, & le troisieme au bout d'une heure & demie.

A huit autres poulets qui ont été mordus, on a commencé à appliquer l'huile chaude en temps différents; mais on n'a pas laissé passer dix minutes avant que de se servir de l'huile. Trois de ces poulets ont été guéris les autres sont morts en assez peu de temps, un seul a vécu jusqu'au lendemain de l'expérience.

Six poulets ont été frottés d'huile chaude immédiatement après la morsure; on a répété plusieurs fois, ainsi qu'aux précédents, l'application de l'huile. Ils sont tous morts dans des temps assez courts; un seul a survécu six heures à la morsure.

Deux grands coqs ont été mordus; à l'un on a appliqué l'huile fort peu de temps après, il est mort au bout de trois heures. Le second coq ne fut point frotté; on approcha de très près de la morsure le cautere actuel pendant trois minutes, il périt au bout de deux heures: sur la tumeur livide, on remarquoit une impression assez forte qu'avoit fait la chaleur.

Nous voulûmes faire mordre par une vipere la jambe d'une oie, la morsure nous parut douteuse; nous la fîmes remordre aussi-tôt par une autre vipere. On appliqua l'huile peu de temps après,

ce qu'on continua de faire à plusieurs reprises , & pendant assez long-temps ; les accidents ordinaire-parurent bientôt. Cette oie but beaucoup , & plusieurs fois , quoiqu'elle n'eût point manqué d'eau auparavant. Nous remarquons cette circonstance , que nous avons encore apperçue dans quelque autre cas : elle mourut au bout de deux heures & un quart.

N'étant point certains de deux morsures que nous voulûmes faire faire à un grand dindon , il le fut sûrement à la troisième fois. Cinq minutes après il fut frotté d'huile , ce qu'on répéta plusieurs fois un assez long temps. Les accidents qui ont coutume de suivre la morsure parurent ; mais ils cessèrent d'augmenter au bout de trois heures & demie : le dindon fut malade pendant quelques jours , & maigrir beaucoup ; enfin il se rétablit.

Onze jours après le même dindon fut piqué deux fois par une même vipère ; on ne lui fit aucune application. Il fut très malade pendant plusieurs jours , & enfin il guérit.

Un jeune chat , mais vigoureux , fut piqué près du nez par une vipère ; on appliqua l'huile presque aussi-tôt. Il survint de l'enflure & de la lividité , qui subsisterent ; le lendemain il guérit.

Un gros chat , qui avoit été piqué par quatre vipères , fut frotté avec l'huile d'olives , & on lui en fit avaler. Il nous échappa , mais on l'a vu depuis.

Nous avons fait mordre huit chiens , les uns à la cuisse , les autres au museau , & les autres sous le ventre. Trois ne furent point frottés avec l'huile , on ne leur fit rien ; il leur survint tumeur & lividité. Ils guérissent , de même que quatre autres chiens à qui on appliqua l'huile : un d'entre eux étoit fort jeune. Le huitième chien étoit un danois ,

qui , quoique fort grand , n'étoit âgé que de deux mois ; il fut mordu dans plusieurs endroits , & par plusieurs viperes. On ne commença à le frotter avec l'huile que plus d'une heure & demie après les piquures , & il avoit dès-lors l'air fort abattu & la respiration gênée. Ayant apperçu que les tumeurs augmentoient , nous y fîmes des scarifications , dans lesquelles on introduisoit l'huile chaude ; on lui en fit avaler plusieurs fois. Deux heures après les morsures , nous découvrîmes des tumeurs que nous n'avions point encore apperçues ; nous les traitâmes comme les précédentes. Le chien parut plus malade & plus abattu ; il lui vint un peu d'écume aux coins de la gueule. Il se coucha & se releva plusieurs fois ; on apperçut quelques convulsions. Il but , & ne mangea point ; il vomit deux fois , & alla du ventre. Enfin il mourut , quarante-huit heures après les morsures.

On voit , par le détail des expériences précédentes , que l'huile n'a eu aucun bon effet sur les pigeons , puisque , malgré son application , tous ceux qui ont été mordus par les viperes sont morts. L'article des poulets n'est guere plus favorable au remede. Sur huit qui ont été frottés avec l'huile peu après la morsure , il y en a trois à la vérité qui ont réchappé ; mais on sçait assez que la morsure des viperes ne cause pas toujours la mort. *Possum affirmare* , dit M. Redy , *usu me didicisse oves , canes , pullos gallinaceos , me curante , rabiosè demorsos à viperis paucos ante dies in campis sole ardentissimo captis , non esse mortuos*. Nous avons en même temps l'exemple de huit poulets à qui on n'a rien appliqué , & dont deux ne sont pas morts , quoiqu'ils aient eu tous les mêmes accidents. Ce quifert encore à faire voir que nous ne sommes pas en droit d'attribuer à l'huile la guérison de ces trois

poulets, c'est que, des six poulets à qui l'on a appliqué l'huile immédiatement après la morsure, aucun n'est réchappé : or la promptitude avec laquelle cette application a été faite dans ce dernier exemple, ne peut pas avoir été un obstacle à l'efficacité de l'huile.

Le dindon auquel on a appliqué l'huile, & qui n'est pas mort de ses morsures, ne forme pas un préjugé bien considérable en faveur de ce remède, puisqu'ayant été mordu une seconde fois, onze jours après la première, il guérit sans le secours de l'huile.

Quand même l'huile seroit un remède efficace pour la morsure des vipères, elle auroit bien pu ne pas guérir le chien danois : son application fut retardée fort long temps, le chien avoit été piqué par plusieurs vipères ; ainsi on ne peut rien conclure de cette expérience. On ne peut pas mettre sur le compte de l'huile la guérison des quatre chiens à qui on l'a appliquée, puisque sans son secours trois autres chiens ont été guéris.

Si cependant on veut mettre quelque guérison sur le compte de l'huile, on sera au moins obligé de la regarder comme un remède fort douteux. L'exemple d'un homme guéri après l'application de l'huile ne seroit pas une preuve bien forte de son efficacité, sur tout si on s'étoit servi en même temps de quelque autre secours, puisque nous savons qu'avec ces autres secours il y a des hommes qui ont été guéris de la morsure des vipères. Aux histoires qu'on en trouve dans quelques livres, nous en joindrons deux qui nous ont été communiquées par deux Apothicaires connus. Ils furent eux-mêmes mordus, & ils guérissent après avoir employé les remèdes dont on a coutume de se servir en pareils cas ; d'ailleurs il n'est pas certain que tout homme

mordu par une vipere doive périr , quoiqu'il essuie des accidents considérables , & qu'on ne tente rien pour sa guérison. Nous sçavons par nos expériences sur les animaux d'une même espece que les uns sont morts , & que les autres ont réchappé , quoiqu'on n'ait employé aucun de ces remedes. Ne pourroit-il pas être de même à l'égard des hommes ?

*Rapport de ce qu'il est arrivé à des Hommes
mordus par des Viperes.*

Le sieur Piron , actuellement premier Apothicaire de l'Hôtel-Dieu de Paris , fut mordu en 1723 d'une vipere irritée ; elle lui prit le doigt index à la derniere phalange , il en sortit une goutte de sang ; il étoit alors deux heures après midi : il appliqua dessus pendant un bon quart d'heure de la thériaque , dont il enveloppa tout le doigt.

On lui fit douze à quinze scarifications , premièrement sur la morsure jusqu'à la premiere phalange , & les autres furent placées sur toute la surface du doigt , qui par son enflure donnoit des places suffisantes.

On écorcha la vipere , on la mit sur le gril pour la faire manger au malade , & il but par-dessus un grand verre de vin , dans lequel on avoit dissout de la thériaque en bonne dose , le tout animé de quelques gouttes d'esprit volatil de vipere ; on pansa le doigt avec des compresses mouillées d'eau-de-vie.

Le malade se mit au bout de quelque temps sur son lit ; il commença à avoir des grandes envies de vomir à mesure que l'enflure gaignoit ; il survint un vomissement considérable qui dura une heure & plus : on fut obligé de le déshabiller , & de déchirer la chemise qui l'étrangloit. Comme l'enflure gaignoit jusqu'à l'avant-bras , on y fit à quatre heures

une vingtaine de scarifications , que l'on couvrit de compresses mouillées d'eau-de-vie ; la tête du malade fut prise ; il fut cependant confessé , mais à sept heures le malade ne s'en souvenoit plus. On lui faisoit prendre des bouillons animés de sel volatil de vipere ; on refit de nouvelles scarifications jusqu'aux os du carpe. Les personnes qui étoient auprès de lui , lui firent boire depuis onze heures & demie jusqu'à une heure après minuit la valeur d'une bouteille du meilleur vin de Bourgogne : le malade s'endormit jusqu'à six heures du matin sans se réveiller , & les accidents cessèrent contre l'attente des spectateurs.

Le Chirurgien vouloit scarifier de nouveau , mais le malade n'en voulut plus entendre parler. Il fut deux mois entiers à guérir ses plaies par les pansements ordinaires d'eau-de-vie & de vin ; il jouit actuellement d'une parfaite santé.

Le nommé Lamotte , garçon Apothicaire , d'un tempérament fort & vigoureux , alloit le 27 Septembre 1735 , à trois heures après midi , chez un gentilhomme Anglois apprêter une vipere pour faire un bouillon : à l'ouverture de la boîte elles s'échapperent toutes ; il en rassembla cinq , mais la sixieme étoit cachée sur un potager auprès d'une terrine qui étoit sur le feu. Cette derniere vipere irritée par une chaleur plus vive se jeta sur le doigt index de la main gauche du garçon , & le mordit jusqu'au sang.

Le malade sentit alors une douleur qu'il compare à l'impression qu'auroit fait l'esprit de vitriol , dont on auroit laissé tomber une goutte sur une plaie. Sans s'alarmer il coupa la tête de la vipere , l'écrasa & l'appliqua sur la morsure. Comme il sentit une plus vive douleur , il fit lier son doigt d'une ficelle , qu'il fit serrer le plus fort qu'il fût possible.

Il essaya inutilement avec des méchants ciseaux de scarifier son doigt qui s'enfloit considérablement. Il eut recours au Gentilhomme pour qu'il lui fit la scarification, étant dans le dessein d'y appliquer ensuite un fer rouge ; mais le Gentilhomme, qui avoit quelque pratique de médecine, l'en dissuada, en lui disant qu'il se feroit plus de mal qu'il n'en avoit, qu'il suffisoit de prendre la graisse de vipere, & de s'en frotter chaudement, que cela empêcheroit le progrès du venin ; qu'il avoit même vu plusieurs charlatans à Londres & dans d'autres villes d'Angleterre, qui pour faire voir l'effet de leur antidote animoient une vipere dont ils faisoient mordre quelqu'un de leur troupe ; que comme la partie mordue enfloit sur le champ, ils ne faisoient autre chose que de lui faire avaler de la thériaque & frotter ensuite la partie mordue avec la graisse de viperes chauffée, & qu'à mesure que l'enflure augmentoit ils frottoient dessus, de sorte qu'en moins de vingt-quatre heures le malade étoit guéri. Le garçon suivit aussi-tôt ce conseil ; il tua trois ou quatre viperes, il en fit fondre la graisse, dont il frotta sa main qui enfloit considérablement, puis la couvrit d'une serviette. Il avala environ trois gros de thériaque & un peu de vin par-dessus. Il se mit alors sans inquiétude en chemin pour revenir à la maison ; mais au milieu de la route, comme il s'apperçut que sa main enfloit considérablement, il fut dans l'obligation de détacher les boutons de sa chemise, & d'ouvrir la manche de sa veste. Il sentit une douleur sous l'aisselle du même côté, & s'apperçut que les glandes en étoient considérablement gonflées, ce qui lui donna un peu d'inquiétude & de défiance sur les remedes proposés par le gentilhomme Anglois. A son arrivée il sentit un feu par tout le corps, & même la main du côté opposé

posé s'enflait à ne pouvoir la fermer qu'à peine. On eut recours à une potion composée d'eau thériacale d'environ trois onces, autant d'eau générale, un peu d'eau de mélisse composée, environ demi-once de thériaque, un gros de camphre, les sels volatils de vipères, de succin & ammoniac, environ vingt-quatre à trente grains en tout, esprit volatil de sel ammoniac & huileux de Sylvius, un gros en total.

Après avoir pris cette potion on le coucha, il fut confessé, puis on lui fit prendre une potion à peu près pareille à la précédente. Il sentoit un feu dans la gorge, dans la poitrine, & même il ne pouvoit presque plus parler à cause des grandes douleurs qu'il souffroit. Cet état détermina à avoir recours à une saignée; on fit donc une saignée du bras opposé, & l'on tira environ six palettes de sang. Le Chirurgien n'eut pas plutôt mis la ligature que le malade perdit connoissance & vomit pendant trois quarts d'heure, après quoi on fit une incision le long du doigt sans qu'il sortit de sang: la chair boursouffloit par-dessus la plaie. On fit ensuite une embrocation depuis le bout du doigt jusqu'à l'épaule & sur la région du cœur; cette embrocation étoit composée d'esprit de lavande, de camphre, quantité de thériaque & de graisse de vipères. Après le vomissement le malade ranimé par cette friction se sentit très soulagé & sans aucune douleur. Sur les huit heures du soir on lui fit faire une autre potion à peu près composée comme les autres, après quoi il s'assoupit jusqu'au lendemain matin quatre heures: au bout de ce temps il se réveilla extrêmement altéré, & la tête fort embarrassée; on lui fit boire un grand verre de vin, & il resta jusqu'à six heures & demie sans rien prendre & fort tranquille; vers les sept heures il mangea d'un grand appétit une cuisse & un blanc de poulet.

Les Chirurgiens lui proposerent dans la matinée de faire des scarifications le long du bras ; il les pria de différer deux ou trois jours , pour voir s'il n'y auroit pas moyen de s'en dispenser. Au bout de ce temps il lui survint une espece d'érépele , sur lequel le malade appliqua le cinquieme jour un liniment composé d'environ demi setier d'eau de vie , deux onces d'onguent d'althæa , demi once de thériaque mêlés ensemble.

Ce remede fit diminuer l'enflure depuis l'épaule jusqu'au coude : il continua la même chose pendant trois jours toutes les vingt quatre heures , ce qui acheva de diminuer l'enflure , excepté celle de la main ; le reste du bras étoit cependant demeuré noir en plusieurs endroits & violers en d'autres. On lui conseilla de faire un cataplasme résolutif avec la décoction des herbes émollientes , huit onces de miel commun , une livre des quatre farines , un peu de populeum pour envelopper la main deux fois le jour après l'avoir frottée d'huile rosat : ce qu'ayant pratiqué pendant l'espace de cinq jours , l'enflure de la main diminua totalement : ce garçon est actuellement plein de vie , fort & vigoureux.

La relation suivante a été envoyée à l'Académie par M. Mortinier , Secrétaire de la Société Royale de Londres , & Correspondant de l'Académie ; & c'est cette relation qui nous a déterminés à faire toutes les expériences qu'on a rapportées.

Guillaume Olivier & sa femme , de la ville de Bath , dont le métier est de prendre des viperes , s'offrirent à souffrir la morsure de quelque vipere que ce fût , se fiant à la vertu d'un remede dont le hasard leur avoit fait faire la découverte. Un jour que la femme avoit été mordue , ils essayerent inutilement tous les remedes connus , & l'appli-

cation de l'huile même de viperes ne diminua nullement ses douleurs , sur-tout celle qu'elle ressentoit à la mamelle du côté de la main où elle avoit été blessée.

Au mois de Mai 1734 ces gens se présentèrent à quelques personnes curieuses à Windsor , offrant de se faire mordre de quelque vipere que ce fût , se fiant à la vertu de leur remede ; ce qui fut fait , & avec le succès qu'ils avoient promis sans aucun symptome violent. Ils me furent adressés de là par M. Guillaume Burton , médecin de Windsor , qui avoit été témoin de cette expérience surprenante , & de qui ils m'apportèrent une lettre.

Le premier Juin 1734 , en présence de plusieurs Membres de la Société Royale & d'autres personnes , l'homme fut mordu au poignet & au pouce de la main droite par une vipere vieille & noire fort irritée , de sorte que des gouttes de sang sortoient de la plaie. Il dit qu'il sentoît aussi-tôt une douleur violente & piquante qui pénétoit jusqu'à l'extrémité du pouce , & se répandoit par-tout son bras , même avant que la vipere fut détachée de sa main , & que peu après il sentit une douleur semblable à l'action du feu qui se glissoit le long de son bras ; en peu de minutes ses yeux commencerent à paroître rouges & quasi en feu , & à verser beaucoup de larmes ; en moins d'une demi-heure il apperçut que le venin se faisoit de son cœur par des douleurs aiguës , ce qui fut accompagné d'une grande foiblesse & d'une difficulté de respirer , & suivis de sueurs froides & abondantes ; peu après son ventre commença à s'enfler avec des tranchées fort aiguës & des douleurs aux reins accompagnées de vomissements & de déjections très violentes.

Il déclara que pendant la violence de ces symptomes il perdit la vue deux fois pendant plusieurs minutes

minutes de suite, mais qu'il entendit la voix qui lui étoit familière : il dit que dans les expériences qu'il avoit faites auparavant il n'avoit jamais différé l'application de son remede plus long-temps que jusqu'à ce qu'il sentît les effets du venin approcher de son cœur; mais cette fois-ci, pour satisfaire pleinement à la curiosité de la compagnie, il n'appliqua rien avant qu'il se sentît très mal & que la tête lui tournât.

Une heure & un quart après qu'il eût été mordu, on apporta un réchaut de charbon de bois bien allumé & son bras nud fut tenu dessus aussi près qu'il pouvoit le souffrir, pendant que sa femme le frottoit d'huile avec la main en tournant le bras continuellement au-dessus des charbons comme si elle vouloit le rôtir. Il dit que la douleur s'étoit bientôt apaisée; mais la tumeur n'étoit pas beaucoup diminuée : les vomissements & les purgations par bas commencerent bientôt avec violence, & son poulx devint si petit & si intermittent, qu'on jugea nécessaire de lui donner les cordiaux suivans à un quart d'heure l'un de l'autre.

» Prenez eau de lait alexitere trois onces, eau
» de pivoine composée trois onces, esprit de lavande composé un gros, mêlés, pour deux doses.

» Prenez confection Raleigh (c'est une composition cordiale décrite dans la pharmacopée de Londres) demi-gros, eau thériacale une once & demie, esprit volatil de corne de cerf dix gouttes, mêlés, pour une dose.

» Prenez confection Raleigh deux gros & demi, thériaque demi-gros, esprit volatil de corne de cerf dix gouttes, eau thériacale deux onces, mêlés, pour deux doses ».

Il disoit qu'il ne se sentoît pas beaucoup soulagé par ces cordiaux; mais qu'un ou deux verres d'huile

d'olives qu'il buvoit le soulageoit extrêmement. Etant dans cet état dangereux, il fut mis au lit aussi tôt qu'il fut possible, où l'on frottoit son bras d'huile comme auparavant; il se plaignoit beaucoup du dos & du bas-ventre, là-dessus je conseillai à sa femme de le frotter du même remède chauffé dans une cuiller, ce qui fut fait, & il déclara d'abord qu'il se sentoît tout aussi-tôt soulagé comme par enchantement, & il n'eut pas après plus de deux ou trois vomissements ou selles; mais son urine qui étoit assez abondante n'étoit pas assez décolorée: bientôt après il tomba dans un sommeil profond qui fut interrompu jusqu'à minuit par ceux qui le venoient voir: depuis minuit il dormit de suite jusqu'à cinq ou six heures du matin, & en s'éveillant il se trouva bien; mais l'après-dîné ayant bu des liqueurs fortes jusqu'à être ivre, la tumeur revint avec beaucoup de douleur & avec des sueurs froides qui diminuèrent bientôt quand le bras fut frotté comme auparavant, & enveloppé dans du papier gris trempé dans l'huile.

Deux pigeons furent mordus par la même vipere immédiatement après l'homme; ils devinrent bientôt malades & étourdis. On n'appliqua rien à ces deux oiseaux; l'un mourut dans une heure, l'autre une demi-heure après. Leur chair paroissoit noire comme si elle étoit gangrenée, & leur sang étoit coagulé & noir.

Le 3 Juin l'homme avoit encore son bras enflé, rouge, marbré de taches jaunes, mais mol au toucher. Il pouvoit mouvoir le bras & même les doigts sans aucune douleur & avec facilité.

On fit mordre le nez d'un petit chien par une vipere nouvellement prise; le remède y fut d'abord appliqué chaud, & on en frota bien la partie jusqu'à ce que tout le poil en fût entièrement mouillé;

le chien ne sembloit pas se porter fort mal , son nez s'enfla un peu , il mangea peu après ; le nez fut frotté encore au soir. On le trouva fort bien le lendemain ; mais on lui frotta le nez encore une fois pour assurer la guérison ; il ne fut attaqué d'aucuns symptomes dans la suite ; il s'est bien porté depuis , & vit encore.

Un autre pigeon fut mordu aussi dessous l'aîle en même temps que le chien , mais par une autre vipere ; le remede y fut immédiatement appliqué chaud , & la partie en fut bien frottée jusqu'à mouiller toutes les plumes. Cet oiseau ne sembloit point du tout affecté par le venin ; il mangea d'abord , & on le trouva bien le lendemain , sans aucune inflammation ou tumeur remarquable dans la partie blessée : on appliqua le remede deux fois par jour pendant deux ou trois jours de suite ; l'oiseau se portant bien, nos preneurs de viperes l'emmenèrent avec eux comme en triomphe, car ils n'avoient jamais éprouvé l'effet de leur remede sur un animal si petit ; car comme il reçoit par la morsure une aussi grande quantité de venin qu'un animal plus grand , il court plus de risque d'en mourir.

Nos marchands de viperes disoient qu'ils avoient éprouvé leur remede sur les vaches , les chevaux & les chiens dix heures après la morsure ; mais qu'à l'égard d'eux-mêmes comme ils étoient souvent mordus à la campagne en prenant les viperes , ils portoient de leur remede, qui est de l'huile à salade ou huile d'olives, dans leur poche, & que tout aussitôt qu'ils étoient blessés , sans perdre de temps , ils se frottoient du remede la partie blessée ; & si la plaie étoit au talon , ils en mouilloient bien le bas ; si elle arrivoit au doigt , ce qui est le plus ordinaire , ils versoit du remede dans le doigt du gant correspondant , dans lequel ils enfonçoient d'abord le

doigt, & ils n'en sentoient plus aucuns inconveniens, pas même autant que de la piquure d'une abeille.

Tout le détail qu'on vient de lire a été depuis imprimé dans les Transactions Philosophiques, page 313 du n^o. 443.

Voilà donc trois hommes mordus; l'Anglois, preneur de viperes, qui a usé d'huile d'olives & de cordiaux; un François qui a employé d'abord la graisse de viperes ou l'huile avec l'usage des remedes cordiaux, & un troisieme sur qui on n'a rien appliqué d'onctueux, & qui a usé à peu près des mêmes remedes intérieurement : tous les trois ont eu des accidents qui ont beaucoup de rapport entre eux, & avec ceux qui sont survenus aux animaux cités dans nos expériences.

Ces trois hommes ont usé de cordiaux, qui sont à peu près les mêmes; les accidents ont cessé à peu près de la même façon; le sommeil leur est survenu dans les mêmes circonstances. En vérité, ou leur morsure n'étoit pas mortelle, ou si l'on veut attribuer leur guérison à quelques uns des secours qu'ils ont employés, ce sera aux cordiaux. Mais par quelle vertu ces cordiaux pourroient-ils agir en pareil cas? En auroient ils une spécifique contre le venin de la vipere, ou plutôt ne préservent-ils point nos humeurs contre la putréfaction gangreneuse que le venin de la vipere leur communique? car (comme nous le ferons voir, l'effet de ce venin est la gangrene) cette derniere idée paroîtra assez plausible si l'on fait attention que dans plusieurs cas de gangrene provenant de toute autre cause, les cordiaux s'opposent à ses progrès, & empêchent qu'elle n'infecte la masse du sang.

Si l'on veut regarder l'huile d'olives comme une matiere grasse & onctueuse qui enveloppe les par-

ties du venin de la vipere, il faut faire attention que ce venin ne laisse pas de pénétrer assez profondément à la faveur des dents de cet animal. Il n'est pas aisé à l'huile de faire autant de chemin; on ne conçoit pas trop non plus comment l'huile peut aller chercher les parties du venin qui ne tardent pas à se répandre dans les environs & à altérer le corps; d'ailleurs c'est dans la membrane cellulaire qui est sous la peau où le venin de la vipere agit plus puissamment sur le sang, comme nous le ferons voir par la suite: or cette membrane est toute pleine de la graisse des animaux mordus, c'est le réservoir de leur huile; ainsi si la seule onctuosité suffisoit pour embarrasser les parties du venin, ce ne seroit pas au milieu de cette huile naturelle que ce venin produiroit une gangrene si subite & si considérable; l'oie, qui étoit fort grasse, avoit été un des animaux des moins épargné par le venin.

Enfin pour voir si l'huile peut agir immédiatement sur les parties du venin de la vipere, soit en altérant leur qualité, soit en les enveloppant de façon qu'elles soient hors d'état d'opérer, nous avons pensé qu'il étoit à propos de faire entrer dans le corps des animaux le venin de la vipere après l'avoir exactement mêlé avec l'huile d'olives. Il est certain que l'huile dont on frotte une partie mordue par la vipere ne peut pénétrer que lentement jusqu'où le venin a été introduit, & que ce venin a eu le temps de s'étendre & de faire du chemin, quelque prompt que soit l'application extérieure de l'huile, puisque dans le moment de la morsure on apperçoit du gonflement; il est certain encore qu'il ne peut arriver qu'une très petite quantité d'huile pour se joindre aux parties du venin qui est dans le corps de l'animal. Si donc l'huile est le spécifique contre le venin de la vipere, elle

doit donner des marques de son efficacité étant mêlée avec le venin de la vipere avant son introduction dans le corps de l'animal.

Nous avons exprimé le venin du sac d'une seule dent d'une vipere ; nous l'avons mêlé exactement avec quatre fois autant ou environ d'huile d'olives chaude pour introduire le tout dans le pilon d'un poulet.

Nous n'avons pu tirer d'une autre vipere que très peu de liqueur jaune mêlée avec la liqueur qui se trouve dans la gueule de ces animaux , on y a ajouté de l'huile ; nous avons destiné ce dernier mélange pour un pigeon.

Nous avons fait une plaie au pilon du poulet & du pigeon pour y introduire nos mélanges à la faveur d'un petit pinceau ; le sang qui venoit continuellement s'opposoit à son entrée ; mais par le secours du pinceau nous faisons rentrer le sang & le mélange qui s'y joignoit avec le plus de soin qu'il nous étoit possible ; cependant c'est ce que nous ne pouvions faire qu'imparfaitement.

Cela nous détermina à n'introduire un nouveau mélange d'huile ou de venin dans la plaie que nous avions faite à un second pigeon, que lorsqu'elle eut cessé de donner du sang. Nous rencontrâmes une nouvelle difficulté ; la plaie des muscles étoit resserrée de façon qu'elle ne permettoit pas l'introduction du pinceau , encore moins celle du mélange. Nous nous bornâmes donc à promener le pinceau entre la peau & les muscles, & à y faire entrer le mélange.

L'effet des deux premières expériences fut à peu près le même ; très peu de temps après il survint de la tumeur & de la lividité au pilon du poulet & du pigeon qui s'étendirent d'abord ; mais leur progrès fut moins considérable & plus lent que dans les

cas où le venin est introduit par les dents mêmes de la vipere. Cette tumeur & cette lividité subsisterent long-temps aux environs de la plaie , & il y survint une escarre comme dans les poulets qui ont échappé à la morsure des viperes. Nos deux animaux , après avoir paru malades , se rétablirent , & l'escarre tomba.

A toute la jambe du second pigeon il parut bientôt de la tumeur & de la lividité , qui s'étendirent sur la cuisse ; il fut assez malade , il ne voulut point manger , il s'endormit au bout de quelque temps ; ensuite il but & mangea , & parut être mieux ; mais toute la jambe resta enflée , noire & dure. Après plusieurs jours il mourut ; il étoit extrêmement maigre , toute la peau qui environnoit le pilon formoit une escarre qui étoit noire , épaisse & solide ; il y avoit dans quelques endroits des parties qu'elle couvroit un peu de suppuration

Nous ne pouvons pas attribuer la mort du second pigeon au venin , tel qu'il a coutume de la procurer aux autres animaux ; ici il n'en est que la cause éloignée , & c'est le mauvais état de sa jambe qui en est la cause prochaine : notre premier pigeon & le poulet ne sont pas morts. Cependant ces trois expériences font voir que l'huile n'a pas détruit le venin de la vipere , & qu'elle ne lui a pas ôté son action. A la tumeur & à la lividité qui survinrent & qui augmentèrent après l'introduction du mélange , on ne peut s'empêcher de reconnoître que le venin , malgré l'huile , gardoit son caractère. Si la mort & les grands accidents qui seroient vraisemblablement arrivés si ces animaux avoient été mordus par des viperes ne sont point survenus , on en sent bien les raisons. Dans le second pigeon le mélange n'a été introduit que sous la peau ; dans les deux autres expériences le sang pouffoit continuel-

lement le venin hors de la plaie ; il n'en entroit que peu , au lieu que lorsqu'il est porté par la dent , il ne vient point ou presque point de sang. Les ouvertures que font les dents de l'animal sont extrêmement petites ; il n'en sort aucune partie de venin : si quelquefois on apperçoit dans l'endroit mordu une goutte de liqueur jaune , elle a été exprimée du suc qui environne la dent lorsque la mâchoire de la vipere appuie contre la chair de l'animal ; de plus , le venin , à la faveur de la dent qui est assez longue , & qui est recourbée , est porté bien avant dans les chairs ; il se peut faire encore que l'huile , en écartant les parties du venin les unes des autres , contribue à rendre leur action plus foible , & peut-être que tout autre mélange avec le venin produiroit le même effet. On voit donc par ces dernières expériences que l'huile n'a pas ôté au venin son action , car il a procuré de la tumeur & de la lividité , il a gangrené les parties qui l'ont reçue ; toute la peau qui environnoit le pilon de notre second pigeon a été privée de la vie : il est vrai que le venin introduit par les dents de la vipere produit des effets plus considérables ; mais on peut croire qu'ici ce sont des circonstances étrangères à la nature de l'huile qui sont cause qu'il n'a pas agit aussi puissamment qu'il a coutume de faire.

L'ouverture des animaux qui ont péri par la morsure de la vipere , soit qu'ils eussent été frottés avec l'huile , soit qu'ils ne l'eussent pas été , nous a fourni les mêmes choses à observer.

La jambe piquée étoit extrêmement grosse & livide , la tumeur & la lividité s'étendoient le long de la cuisse jusques sous le ventre , où elles paroissent plus considérables , quelquefois même elles gaignoient jusqu'à la poitrine. Une incision faite dans la peau le long de ces parties nous faisoit voir toutes

les cellules graisseuses qui sont entre les muscles & la peau remplies d'une sérosité sanguinolente ; elles étoient gonflées , noirâtres & gangrenées. L'amas de cette sérosité & la distension des cellules se trouvoient fort considérables du côté du bas-ventre. La peau est attachée aux muscles de l'abdomen par une substance cellulaire , qui cede beaucoup ; & comme c'est la partie la plus déclive du tronc de l'animal , il n'est pas étonnant qu'il s'y fasse un plus grand amas qu'ailleurs. La gangrene s'étendoit en s'affoiblissant du côté de la poitrine & du croupion ; dans les autres parties la graisse & les cellules qui la contiennent étoient blanches à l'ordinaire ; il sortoit souvent des endroits gangrenés une odeur puante & quelquefois cadavéreuse. Comme les dents des vipères pénétoient dans les muscles , nous trouvions aussi les muscles de la jambe d'un rouge brun : leurs fibres avoient perdu de leur consistance , & se déchiroient facilement ; par conséquent la gangrene les occupoit aussi ; elle pénétoit jusqu'alors toute l'épaisseur des muscles où étoit la morsure & ceux qui en étoient voisins ; elle étoit moins profonde dans les muscles de la jambe opposée à la morsure. Cette gangrene occupoit les muscles qui environnent le fémur , mais elle y étoit plus superficielle ; elle s'étendoit aussi le long des muscles du bas-ventre , & quelquefois on appercevoit quelques points gangrenés sur le grand pectoral du côté où l'animal avoit été mordu. Le venin de la vipere introduit avec la dent pénétoit la peau & la substance cellulaire pour arriver jusqu'aux muscles. Puisque ce venin est de nature à produire la gangrene , il n'est point étonnant qu'elle se manifestât plus particulièrement dans la substance cellulaire. Nous sçavons que c'est la même chose chez nous , où la gangrene fait un progrès plus grand & plus prompt dans cette

partie que dans les autres ; peut-être que le venin de la vipere agit de plusieurs façons pour causer la mort ; mais il est certain que la gangrene considérable qu'il produit doit y avoir beaucoup de part ; cependant ce venin si puissant n'a , au rapport de M. Redi , d'autres qualités sensibles que la consistance & la faveur de l'huile d'amandes douces.

Le dindon & les poulets qui n'ont pas péri par la morsure de la vipere , soit qu'ils eussent été frottés avec l'huile , soit qu'ils ne l'eussent pas été , ont essuyé à peu près les mêmes accidents. De l'endroit de la piquure il suintoit pour l'ordinaire une sérosité lorsque la lividité & la tumeur commençoient à être un peu considérables ; nous n'avons pas observé un pareil suintement dans les animaux qui sont morts. Il est survenu après quelque temps au dindon & à tous les poulets qui ont réchappé une espece de croûte noirâtre à l'endroit de la piquure ; c'étoit une escarre profonde qui au bout de quelques jours se détachoit peu à peu , la peau devenoit ridée à sa circonférence , & ensuite elle tomboit. Il se formoit une pareille escarre sous le ventre , quoique l'animal n'eût pas été piqué en cet endroit : nous avons dit que dans la cellulosité qui est sous le ventre il s'amassoit beaucoup d'humeur , & que l'inflammation & la gangrene y étoient très considérables. Voilà pourquoi il s'y faisoit aussi une escarre.

Il est clair que la gangrene produite par le venin introduit dans la morsure se communique de proche en proche aux parties voisines ; mais nous savons aussi que le sang infecté par la gangrene la produit dans des parties bien éloignées de celle par où le venin est entré. Nous en avons eu plusieurs preuves , particulièrement dans l'oie dont nous avons parlé ; car nous avons remarqué sur le ventricule droit de son cœur un commencement de

gangrene superficielle, & il y avoit sur son ventricule gauche trois points gangréneux qui n'étoient guere plus étendus chacun que la tête d'une épingle; cependant aucune partie voisine du cœur n'étoit gangrénée. La face concave du foie de cet animal étoit gangrénée, & n'avoit nulle consistance; on ne remarquoit presque pas de changement à sa face convexe, qui pourtant est la seule qui touche aux parties extérieures du bas-ventre.

Dans un poulet qui avoit été mordu à l'aîle la gangrene s'étoit étendue aux muscles intercostaux & à la plevre; la partie du poumon qui y répondoit étoit livide, & le reste du poumon paroissoit sain.

Cette portion du poumon avoit-elle été affectée par les parties voisines? ou bien le sang infecté, après être arrivé par les voies de la circulation à cette partie du poumon, avoit-il causé l'altération?

Nous n'avons trouvé aucun indice de coagulation dans le sang de ces animaux, au contraire nous y avons trouvé des marques de fluidité: 1°. la sérosité épanchée étoit sanguinolente; 2°. les arteres étoient vuides de sang, & les veines en étoient remplies; 3°. nous faisons couler avec facilité le sang dans les veines long temps après la mort de ces animaux; 4°. les caillots de sang qui étoient dans les oreillettes & dans les ventricules n'avoient presque point de consistance.

Nous avons éprouvé qu'on ne peut pas toujours réussir à faire qu'une même vipere morde plusieurs fois de suite; il y en a même qu'on ne peut obliger à mordre; cependant il s'en est trouvé une qui a mordu vingt-quatre animaux dans l'espace de trois heures; elle a commencé par un coq, c'est celui pour lequel on s'est servi du cautere actuel, & il est mort, comme nous l'avons dit, au bout de deux

heures & quelques minutes ; ensuite nous avons fait mordre trois poulets , on n'a rien tenté pour leur guérison , non plus que pour celle de tous les animaux mordus par la même vipere. Le premier poulet a péri dans l'espace d'une heure ; le second au bout de sept heures , & le troisieme au bout d'une heure & demie. Trois pigeons après cela ont été mordus ; le premier a péri en dix minutes ; le second en cinquante , & le troisieme en une heure cinq minutes. Il y a apparence que les derniers mordus de ces sept animaux ne seroient morts guere plus promptement s'ils avoient été piqués par des viperes qui n'eussent point encore servi. Par rapport à la promptitude de la mort , nous ne devons pas comparer les poulets avec des pigeons ; nous sçavons qu'en général ceux-ci ne résistent pas si long temps. Par l'expérience faite sur ces derniers pigeons il paroîtroit que le venin alloit en s'affoiblissant ; mais on ne trouve pas la même chose du côté des trois poulets : de plus , il est souvent arrivé , après avoir fait mordre deux poulets ou deux pigeons par la même vipere , de voir d'abord périr celui qui avoit été mordu le dernier. On voit par-là que c'est sans trop de fondement que bien des personnes assurent que l'effet de la seconde morsure d'une vipere est moins prompt que celui de la premiere ; qu'à la troisieme morsure il est encore plus affoibli , & ainsi successivement comme par degré. La suite de ces expériences fera bien voir que la morsure des viperes n'a pas toujours la même force ; mais celles que nous venons de rapporter prouvent aussi que le décroissement de cette force n'est pas exactement gradué , comme quelques uns le pensent. Enfin notre vipere qui avoit déjà répandu son venin dans le corps de sept animaux , a encore mordu dix-sept poulets ; il leur est survenu ,

Du moins à la plupart, un peu de lividité & de la tumeur, mais moins considérable & moins prompte que dans les autres expériences. De ces dix-sept poulets on en a trouvé deux de morts au bout de vingt quatre heures; c'étoit le premier & le seizieme, c'est à-dire le huitieme & le vingt-troisieme des animaux mordus par la vipere, mais nous ne sçavons pas trop la cause de leur mort; on les avoit enfermés dans une cage, où ils étoient fort gênés, & nous n'avons pu les examiner après leur mort. Parmi ceux qui ont survécu, nous ne pouvons pas dire au juste lesquels ont été les plus affectés par la morsure, les marques qu'on leur avoit mises pour les distinguer s'étoient détachées.

Sept des poulets dont nous venons de parler, qui avoient réchappé, furent mordus neuf jours après par de nouvelles viperes, & trois d'entre eux réchapperent encore; ils furent frottés avec l'huile cette seconde fois: mais si l'on ne veut compter pour rien l'application de l'huile, ne pourroit on pas soupçonner qu'ils doivent leur guérison à ce que l'action du venin reçu la premiere fois étant trop foible pour les faire périr, elle les auroit rendus moins susceptibles d'un nouveau venin, à peu près comme l'opium, dont on peut prendre une dose bien forte quand on s'y est disposé successivement par des doses plus foibles? Nous regardons cette conjecture comme fort douteuse, quoique l'expérience du dindon mordue deux fois, à neuf jours de distance, lui sembleroit favorable; mais il en faudroit davantage pour établir une telle idée. Il est plus naturel de croire que parmi les animaux d'une même espece il y en a sur lesquels le venin de la vipere produit plus ou moins d'effet. On sçait que la piqure d'une seule vipere suffit quelquefois pour faire périr un chat; nous en avons fait piquer

un par quatre viperes; il n'en est pas mort : d'où on pourroit conclure que ce n'est pas toujours la quantité du venin introduit par la morsure qui est la cause de la mort ou d'une mort plus ou moins prompte. De plus, pour peu que l'on y fasse attention, on sentira assez qu'il peut y avoir bien des différences dans les morsures faites à deux animaux, quoiqu'elles paroissent d'abord les mêmes. *Acad. Roy. des Scienc. 1737. Mém. pag. 183.*

On compte, parmi les remedes contre le venin de la vipere, le fel volatil qu'on en tire. On en dissout un gros dans de l'eau thériacale, ou de l'eau de chardon bénit, qu'on fait prendre en quatre doses : on peut, si l'on veut, ne mettre qu'un demi-gros de fel dans quatre onces d'eau de chardon bénit, pour une seule dose. On couvre ensuite le malade, afin de favoriser la sueur; au bout de vingt-quatre heures il avalera une seconde dose, qui sera encore répétée les jours suivans, jusqu'à ce que les symptomes violents soient dissipés.

Au lieu de fel volatil de viperes, on peut mettre en usage celui de corne de cerf, celui d'urine ou celui de crâne humain.

On a encore un excellent alexitere dans l'eau de Luce, ou Lusse. C'est avec cette eau que M. B. de Jussieu, en 1746 ou 1747, guérit un jeune homme qui, en suivant ses herborisations, fut mordu par une vipere. La morsure fut promptement suivie d'engourdissement & d'enflure. Ce savant naturaliste lui fit prendre d'abord six gouttes dans un verre d'eau; on en versa ensuite un peu sur chaque plaie. Le blessé une heure après eut des nausées, & tomba en défaillance. Une seconde dose d'eau de Luce dans du vin le tira de cet état. Les foiblesses revinrent, avec un peu de délire & des vomisse-

ments , qui céderent à des doses répétées du même remède. Le malade transpira beaucoup , & fut tranquille toute la nuit. Le lendemain , comme l'enflure subsistoit , on lui fit une embrocation avec de l'huile d'olives , dans laquelle on mit un peu d'eau de Luce ; elle ne tarda point à se dissiper. Durant huit jours le jeune homme prenoit trois fois par jour , dans un verre de sa boisson , deux gouttes de cette eau. Il parvint par ce moyen à détruire absolument l'engourdissement & l'enflure , aussi-bien que la jaunisse qui étoit répandue sur les deux avant bras.

Il est fait mention dans le Journal de Médecine de 1766 , Mars , page 261 & 262 , d'une guérison avec de l'esprit volatil de sel ammoniac en forme concrete ; ce qu'on nomme sel d'Angleterre.

En général , tous les esprits volatils sont les mêmes ; mais celui de sel ammoniac est le plus employé. Il y en a qui donnent la préférence à l'esprit volatil de vipères , ou de corne de cerf.

On doit choisir les vipères vives , les prendre au printemps , préférer les femelles , examiner si elles ne viennent point de faire leurs petits depuis peu ; prendre celles qui sont grasses , qui habitent des lieux secs & montagneux , & non pas celles qui sont sur le bord des marais , car elles ne valent rien. Les anciens , pour faire les trochisques , qui sont la base de la thériaque , ont toujours ordonné les vipères de montagnes , & avec raison.

La vipère est alexipharmaque , restaurante , corroborante , cordiale , stimulante , & réveille les esprits. On l'emploie d'abord en poudre ou en bouillon. Pour avoir la poudre , on coupe la tête de la vipère , on lui ôte les intestins , & on laisse le fiel , le foie & les poumons ; on la fait sécher à la cheminée , on la met en poudre , on y ajoute un

huitieme de sel, crainte des vers. Cette poudre ainsi préparée s'ordonne à la dose d'un demi-scrupule, d'un scrupule, & même d'un gros, pour les épuisements, dans les catarrhes, les paralysies, la vieillesse, & pour réveiller les esprits quand le malade dépérit sans cause apparente.

Le bouillon de vipere est un grand remede ; il est trop peu en usage. Voici comme on le prépare. On ôte la tête à la vipere, on en tire les intestins, comme si c'étoit pour la faire sécher. On la coupe par tronçons, sans la laver ; on ramasse le sang qui dégoutte ; on la met dans un pot de terre au bain-marie, avec un poulet maigre coupé par morceaux ; on ajoute un demi-verre d'eau ou de vin. On lutte le pot avec de la pâte, on le fait bouillir, puis on passe le bouillon avec expression : on en tire environ une chopine. On en donne au malade un verre par jour avant qu'il se mette au lit. C'est un parfait restaurant pour les épuisements occasionnés par des veilles, des chagrins, par le commerce immodéré des femmes, pour avoir trop étudié. Il convient dans la paralysie & les engourdissements, pour réveiller les solides dans la langueur. Je l'ai ordonné à une dame qui, depuis douze ans, étoit dans le dernier anéantissement, pâle & sans force, & en peu de temps elle vint à pied me remercier. Ces bouillons font du bien dans la phthisie commençante, le marasme ; ils conviennent aux vieillards qui tendent à leur fin. Les femmes qui veulent ne point vieillir en prennent deux ou trois tous les mois : on peut tuer au soir la vipere pour le lendemain, & égoutter le sang dans le bouillon qu'on va donner au malade.

Le syrop de vipere se prépare ainsi. On tire le suc d'une douzaine de viperes, on fait une décoc-tion de deux onces de gaïac, de falsepareille ; on

y met infuser trois gros d'aromates. On passe la décoction, on la mêle au suc des vipères, on y ajoute du sucre, on clarifie avec le blanc d'œufs, & on le fait bien cuire; puis on verse un peu de teinture d'ambre. C'est un restaurant fort vanté des anciens: il est préférable au syrop de tortue.

La graisse de vipères est un des meilleurs anodyns, émollients & résolutifs. Le fiel, à l'intérieur, est un bon stomachique. Le fiel, le foie & le poumon desséchés, font un bézoard animal qui possède, au plus haut degré, la vertu de la poudre de vipère. On l'ordonne à la dose de trente grains.

On tire de la vipère, par le secours de la chymie, une eau, une huile qui est fort peu employée, un esprit & un sel volatils. Voici l'opération. On coupe la tête aux vipères, on en remplit environ le tiers d'une cornue, on la place au bain de sable. Au commencement on pousse le feu lentement, & il sort du phlegme, qui est l'eau; puis quand on s'apperçoit qu'il monte dans le ballon des vapeurs blanches, on ôte le récipient, on en adapte un autre. On lutte les jointures; alors l'esprit distille. En même temps il s'attache au goulot un sel volatil concret, qu'on peut garder sous cette forme, si l'on veut, ou le dissoudre dans de l'esprit, comme on fait au sel volatil de cerf.

L'eau n'a pas de grandes vertus. Elle est adoucissante & un peu restaurante. On en bassine les yeux dans les inflammations, on en bassine les boutons dans la petite vérole; on en fait même boire dans cette maladie, mais j'aimerois autant dans ce cas l'eau de scabieuse, de scorfonere, &c.

L'esprit & le sel volatil est très bon dans la morsure de la vipère; il a les mêmes propriétés que l'esprit & le sel volatil de corne de cerf. On peut les substituer les uns aux autres. Il est bon d'avertir

que la vipere entre dans presque toutes les compositions alexipharmatiques.

Après avoir ôté à la vipere ses entrailles & sa peau, & jetté la tête & la queue, dit M. VOGEL, on la fait sécher pour être ainsi gardée dans les boutiques : réduite en poudre, on lui donne le nom de bézoard animal. Les plus anciens médecins en ont conseillé l'usage, sur-tout dans les maladies de la peau, telles que l'éléphantiasis, la gale & les tumeurs de la tête, connues sous le nom de *favi*. MÉAD, de *Venen. pag. 32*, dit avoir vu guérir une lepre très rebelle avec un vin de vipere. ARÉTÉE, de *Cur. diut. lib. ij. c. 13*, recommande pour cette maladie de manger des viperes. On a aussi donné contre les obstructions des nerfs & des viscères, contre l'ictère & la stérilité, du bouillon, du vin & de la poudre de vipere, à la dose d'un scrupule. ADOLPHI, A. N. C. *vol. ij. obs. 158*, a dissipé, avec des remèdes tirés de la vipere, une goutte de la mâchoire inférieure. Il y en a qui disent avoir appris, par leur propre expérience, que les viperes étoient dénuées de toute vertu contre les maladies de la peau causées par un vice de mauvais caractère. JUL. PALMARIUS, de *Morb. contag. lib. iv. c. 9*, s'est fortement élevé contre la crédulité des médecins ; & HOFFMAN, *med. system. t. iv. p. v. c. 5. §. 18*, fondé sur un nombre d'observations, avoue ingénument qu'on ne peut attendre pour ces maladies aucun secours bien réel des remèdes tirés des viperes.

La graisse de ce reptile, dont on se frotte les yeux, passe pour avoir la vertu d'éclaircir la vue. Elle est encore regardée comme un bon remède dans d'autres maladies de l'œil, telles que le ptérygion, l'onglet, les phlyctènes, les petites cicatrices, la chassie, si l'on en fait tomber une goutte

Viperina. Vipérine.



deux ou trois fois par jour dans l'œil, ou si l'on y en infere avec un petit pinceau. Le grand secret de ceux qui vont à la chasse aux viperes, pour se guérir des morsures auxquelles ils sont exposés, est l'axonge même de l'animal, qu'ils font entrer dans la plaie par des frictions réitérées. MEAD, *loc. cit.* p. 27, a reconnu la bonté de ce spécifique pour des chiens qu'il avoit fait mordre par des viperes. Les Lapons dans la pleurésie se frottent de cette axonge, & en attendent leur guérison. Ils vantent comme un excellent purgatif la peau des viperes; ils en avalent un morceau de la grandeur de l'ongle découpé fort menu. A une dose plus forte, elle est regardée comme mortelle, sur-tout pour les nouvelles accouchées, l'expérience ayant convaincu qu'elle excite des mouvements convulsifs; MOULIN, *Dissert.* Au reste, la chair des viperes est un aliment très restaurant. Les Indiens en font aujourd'hui leurs délices, & sçavent la préparer de différentes manieres.

VIPÉRINE, ou. Herbe aux Viperes. *Echium*, off. *Echium vulgare*, C. B. Pin. & Inst. r. h. *Echion*, CÆSALP. *Buglossum sylvestre*, LOBEL. Icon. *Lycopsis*, CORD. *Buglossa sylvestris*, BRUNSF. *Onosma*, MATTH. *Lycopsis germanica*, *purpurea*, FUCHS. *Anchusa prima*, Dioscor. GUILLAND. *Echium caule simplici*, *foliis caulinis lanceolatis*, *floribus spicatis lateralibus*, LINN. *Lingua hircina*; *Viperina* sive *Serpentaria*; *Herba viveraria*, quorumdam.

Sa racine, qui est de la grosseur du pouce, longue, ligneuse, bisannuelle, pousse jusqu'à la hauteur de vingt-cinq à vingt-six pouces, une tige ferme, ronde, velue, verte, tachée de points noirs. Ses feuilles sont étroites, oblongues, rudes, d'une saveur fade. Ses fleurs, placées en grand nombre le long de la tige, sont en entonnoir, découpées en cinq

parties inégales , bleues ordinairement , à cinq étamines , & portées sur un calyce fendu en cinq portions. Il leur succede quatre graines unies ensemble , ridées , semblables à la tête d'une vipere.

On trouve cette plante dans les champs , dans les bleds , dans les terres incultes , le long des chemins. Sa fleur paroît en Juin & en Juillet. La plante conserve sa verdure tout l'hiver.

Quoiqu'on lui ait donné le nom d'herbe aux viperes , on ne croit pas aujourd'hui qu'elle ait la vertu de guérir la dangereuse & fatale morsure de ce reptile. Celles qu'on lui reconnoît le plus généralement , est d'être émolliente , humectante , pectorale ; elle peut être substituée à la buglosse.

VIPÉRINE de Virginie. Voyez SERPENTAIRES de Virginie.

VISNAGE. Voyez FENOUIL annuel , iij espece.

VITRIOL. On a déjà dit que , de la combinaison de l'acide universel , autrement dit acide vitriolique , avec différentes bases , il se forme différents sels neutres , du nombre desquels est le vitriol , lorsque cet acide se trouve uni avec une base métallique ; & ce vitriol differe encore , suivant que cette base métallique tient de la nature du plomb , du cuivre ou du fer , comme je le ferai voir par la suite.

Le vitriol ou *vitrium* , du mot *vitrum* , parce qu'il est brillant comme du verre ; le vitriol , dis je , a reçu différents noms. Les Grecs l'ont appelé *calcanthum* , comme qui diroit *aris efflorescentia*. Les Latins l'ont appelé *auramentum sutorium* , parce qu'on s'en sert pour teindre les cuirs en noir. En françois on l'appelle couperose , dérivé du latin *cupri erosio* , qui signifie rouille de cuivre.

Il y a deux especes de vitriol , un naturel , & un artificiel.

Les anciens ont appelé le vitriol naturel , *stalac-*

acon, parcequ'on le trouve tout fait à certaines voûtes souterraines. Ce vitriol est de peu d'usage, parcequ'il est rare & cher; de plus, il n'est jamais pur, il contient toujours quelque matiere étrangere : ainsi le vitriol artificiel vaut infiniment mieux.

Le *vitriol artificiel* se tire par l'évaporation d'une eau qui se trouve dans différentes mines. Il se tire aussi de certaines pyrites.

A raison du pays, les anciens ont fait une infinité d'especes de vitriol; savoir le vitriol romain, le vitriol d'Allemagne, de Hongrie, d'Angleterre, de Pise, & autres : mais, par leurs divisions, ils ne font point connoître la différence essentielle des vitriols. Par exemple, le vitriol de Rome, ou le vitriol bleu, se tire également d'Allemagne, de Hongrie, d'Angleterre & d'Italie : le vitriol de Pise peut se faire par-tout, dans son laboratoire même, quand on voudra.

Pour moi, je divise le vitriol, quant à la couleur, en vitriol blanc, vitriol bleu & vitriol verd; & toutes les especes de vitriol sont comprises dans ces trois, même le vitriol de Pise, puisque ce n'est qu'un composé de vitriol bleu & de vitriol verd, comme je le démontrerai par la suite. Au reste, comme cette derniere espece de vitriol contient toujours quelque mélange, ce qui lui a fait donner le nom de vitriol hermaphrodite, il est peu employé en médecine.

Le *vitriol blanc* est une substance saline, blanchâtre, pesante, d'une saveur âcre, acerbe, un peu douçâtre : il nous vient d'Allemagne; on le tire de l'eau qui se trouve dans des mines de plomb qui sont auprès du Goslard. C'étoit là le vitriol que les anciens employoient le plus communément. Pour l'avoir, les mineurs ramassent l'eau

de la mine ; ils la mettent dans des vaisseaux à évaporer , jusqu'à ficcité , & ils ont le vitriol blanc. Ce vitriol est formé de l'acide vitriolique uni spécialement à du plomb , une certaine quantité de zinc , un peu de cuivre , & très peu de terre.

L'existence du plomb y est plus que prouvée , par la saveur douçâtre , puisque nous savons que le plomb , uni avec un acide , forme le sucre de Saturne , qui donne cette même saveur.

Quant au zinc , nous savons qu'il n'y a que lui qui puisse former du laiton par son alliage avec le cuivre. Or GLAUBER a manifestement prouvé qu'on peut , avec le *caput mortuum* qui reste après la distillation du vitriol blanc , faire du laiton en le travaillant avec du cuivre : donc le zinc entre dans la base du vitriol blanc.

A l'égard du cuivre , nous savons qu'il donne seul la couleur bleue aux dissolutions alkales. Or une dissolution de vitriol blanc , versée sur une dissolution alcaline fixe , lui donne une couleur bleue : donc le cuivre entre dans la base du vitriol blanc.

Personne n'ignore que le fer est le seul métal qui puisse être attiré par l'aimant. Or dans le précipité d'une dissolution de vitriol blanc , il se trouve une quantité prodigieuse de petites particules que l'aimant peut attirer. Donc il entre une petite quantité de fer dans la base du vitriol blanc. De plus , ce vitriol a l'air verdi ; ce qui ne peut venir que d'une certaine quantité de terre martiale. Donc il résulte de tous ces arguments que l'acide vitriolique , dans le vitriol blanc , est combiné avec du plomb spécialement , du zinc , du cuivre , & une petite quantité de fer.

Le *Vitriol bleu* ; *Vitriolum Romanum* ; *Vitriolum Italicum* , *Hungaricum* , *Germanicum* ; *Vitriolum ceruleum* ; *Vitriolum Veneris* , parceque sa base est

le cuivre minéral désigné par les chymistes sous le nom de Vénus. Ce vitriol est en beaux crystaux, taillés en lozanges, brillants; sa saveur est styptique, acerbe, mordante. Il se tire de Suede & d'autres pays, de l'eau que l'on ramasse dans les mines de cuivre. Ce vitriol est fort employé en médecine, spécialement à l'extérieur.

Le vitriol bleu est formé de l'acide universel, ou acide vitriolique uni avec une certaine quantité de cuivre. La preuve que j'en donne, c'est qu'avec cet acide & du cuivre on peut former de beau vitriol bleu. Par exemple, si vous mettez du cuivre & du soufre dans un creuset, que vous les fassiez stratifier ensemble, que vous calciniez la matiere, que vous en fassiez une lessive, & que vous l'évaporiez, vous obtenez de très beau vitriol bleu. Donc, dans le vitriol bleu, la base de l'acide vitriolique est le cuivre.

Dans cette opération, la partie bitumineuse du soufre est dissipée par le feu avec son phlogistique, & il entraîne aussi la dissipation du phlogistique du cuivre; car on remarque que l'acide universel ne forme jamais un vitriol avec une substance métallique, tant que cette substance métallique est combinée avec son phlogistique.

Le *Vitriol verd*, (*Vitriolum Anglicanum*, *Vitriolum Martis*,) est une substance saline, pesante, dissoluble dans l'eau: [il en est de même de tous les vitriols en général, parcequ'ils contiennent beaucoup d'eau dans leurs crySTALLISATIONS;] d'une saveur âcre, amere, styptique, mais moins que le vitriol bleu. Il se tire en Angleterre spécialement de certaines pyrites: c'est un composé de l'acide universel avec le fer.

Les pyrites en général contiennent du mars, une terre martiale, du cuivre, de l'arsenic & du soufre,

& elles different suivant la substance qui y domine ; d'où on les a distinguées en pyrites martiales , pyrites cuivreuses , & pyrites arsénicales. Dans les pyrites martiales , c'est le mars & le soufre qui y dominent ; ce sont les plus pesantes : dans les cuivreuses , c'est le cuivre : dans les arsénicales , c'est l'arsenic ; ce sont les plus légères. Les seules pyrites martiales ont la propriété de se gercer , de se fendre à l'air libre , & de se couvrir d'une efflorescence qui a la faveur du vitriol verd ; elles tombent ensuite en chaux , & c'est alors qu'on ramasse le vitriol.

Pour l'obtenir , les habitants du pays ont des parcs faits exprès , enduits de glaise , avec des citernes d'endroit en endroit , & des conduits qui s'y rendent de toutes parts. Ils ramassent les pyrites , les mettent dans ces parcs à l'air libre , où elles se gercent , comme je l'ai dit , ce qui est facilité par l'eau de pluie qui les arrose de temps en temps. Elle se ramasse dans les citernes : au bout d'un certain temps ils la prennent , & la mettent dans des vaisseaux de plomb évaporer. Quand elle est à un certain point d'évaporation , ils y jettent de vieilles ferrailles , ils évaporent encore un peu , puis ils transportent cette eau dans d'autres vaisseaux de plomb où il y a des barres de bois , & c'est à ces barres que s'attachent les crystaux de vitriol verd.

Le vitriol n'est pas tout formé dans les pyrites , comme il le sembleroit ; car l'acide universel est combiné avec le phlogistique , & le feu contient encore tout son phlogistique : & on sçait qu'il faut qu'il en soit privé pour former avec l'acide universel un vitriol de Mars. Or c'est ce qui arrive lorsque les pyrites sont exposées à l'air libre ; car du fer mêlé avec du soufre , exposé à l'air libre , & arrosé de la pluie , a la propriété de décomposer le soufre , de l'enflammer , & alors son phlogistique le dissipe

avec la terre bitumineuse, & l'acide reste combiné avec le fer, qui est aussi dépouillé de son phlogistique, & forme un acide vitriolique.

La preuve que j'en donne, c'est que si l'on jette de l'eau sur de la limaille de fer & du soufre mêlés ensemble, & exposés à l'air, la matiere se boursoffle, le soufre se dissipe, & prend même feu.

Dans le vitriol verd, l'acide universel a pour base le fer. En effet, si vous versez de l'acide vitriolique sur de la limaille de fer, après l'effervescence il se précipite une poudre; on n'a qu'à la faire sécher, la lessiver, évaporer la lessive, & on aura de très beau vitriol verd. Donc, dans ce vitriol, l'acide universel a pour base le fer.

Le *Vitriol de Pise*, ou *Vitriol androgyne*, se tire de certaines terres verdâtres & bleuâtres. Les habitants de ce pays prennent cette terre, en font une lessive, la filtrent, la font évaporer, & la mettent crystalliser. Ils obtiennent le vitriol androgyne, qui participe du vitriol verd & du vitriol bleu.

Dans le vitriol androgyne, l'acide universel a pour base le fer & le cuivre. Ce qui le prouve, c'est que, si dans une dissolution de ce vitriol vous mettez du fer, l'acide universel, suivant la loi des affinités, quitte le cuivre qu'elle tenoit en dissolution, & il se précipite au fond: aussi-tôt l'acide se jette sur le fer, & s'en empare, & vous avez un vitriol entièrement martial. Comme le vitriol androgyne a une double base, le cuivre & le fer, il est peu employé en médecine.

En parlant de chacun des vitriols en particulier, j'ai prouvé l'existence de chaque terre métallique, suivant chaque espece de vitriol; mais il me reste à prouver en général que c'est l'acide universel qui forme les différentes especes de vitriol, suivant

l'espece de terre métallique avec laquelle il est uni. En effet, l'acide universel est le plus fort de tous les acides; car dès qu'il s'agit de distiller le vitriol, nous ne pouvons employer aucun intermede : il faut nécessairement le distiller à un feu violent, puisque nous ne connoissons point d'acides capables de le chasser de sa base. Donc c'est l'acide universel qui, avec différentes terres métalliques, forme différents vitriols : ce qui est cause qu'on a beaucoup de peine à le distiller, & qu'on obtient très peu d'acide.

Cet acide fermente avec les alkalis fixes, & forme un tartre vitriolé. Il fermente aussi avec les alkalis volatils. La fermentation est froide dans le vase, & répand des vapeurs chaudes. Il coagule le lait & le sang, & donne à ce dernier une couleur noire. Or il n'y a que l'acide universel qui ait ces propriétés : donc c'est l'acide universel qui, avec différentes terres métalliques, forme différents vitriols. Cet acide, comme tous les autres, donne la couleur rouge aux teintures bleues des végétaux.

Toute dissolution de vitriol coagule le lait, donne la couleur rouge aux teintures bleues des végétaux : donc l'acide vitriolique se trouve dans le vitriol en plus grande quantité qu'il ne faudroit pour former un véritable sel neutre.

En médecine on emploie le vitriol blanc, le vitriol bleu, le vitriol verd, & jamais le vitriol androgyne. Les trois especes de vitriol ont chacune leurs propriétés particulieres. Suivant ce que j'ai dit en parlant de chaque espece, on doit sçavoir le choix qu'on en doit faire.

Les anciens ont donné beaucoup de vertus aux vitriols. En général ils sont astringents, styptiques & caustiques, très peu rafraîchissants. Leur usage

est peu sûr à l'intérieur : il n'y a que le blanc qu'on puisse donner ainsi , encore faut-il bien des précautions.

Pour le verd & le bleu , ils sont trop caustiques. Il n'en est pas de même à l'extérieur : HIPPOCRATE, GALIEN , DIOSCORIDE encore , employoient les vitriols dans les vieux ulceres , les maladies de la peau. Ils les faisoient entrer dans les gargarismes pour les maladies de la bouche.

Le vitriol blanc est styptique , astringent , capable d'arrêter les hémorrhagies & de suspendre les excréctions augmentées. C'étoit de ce vitriol que les anciens se servoient le plus communément : quelques-uns l'ont employé comme vermifuge , & ont dit qu'il tuoit sûrement les vers , & les faisoit sortir sous la forme de glaires ; mais son usage est peu sûr à l'intérieur. Il cause des angoisses , le resserrement d'estomac & du diaphragme , & donne des envies de vomir qui sont inutiles , à moins qu'il n'ait été donné à certaines doses ; car il est bon d'observer qu'il devient vomitif alors. On a aussi vanté sa vertu fébrifuge. Un médecin du roi de Prusse l'a employé dans des fievres d'armées , à la dose d'un gros , & dit qu'il lui a toujours réussi. Cela se peut , mais ce n'est pas là de quoi autoriser une pratique , sur-tout généralement ; car on sçait que les maladies des camps & armées , quoiqu'en apparence les mêmes que celles qui regnent dans les villes , résistent aux traitements & aux remedes ordinaires. L'ipécacuanha , par exemple , dont l'efficacité est reconnue dans les dyssenteries & dévoiements , est absolument inutile & ne réussit jamais dans les dyssenteries des armées.

Il en est peut-être de même à l'égard des fievres qui arrivent dans les armées. Au reste , le vitriol étant émétique & astringent , débarrasse les pre-

mieres voies des humeurs morbifiques , & fortifie en même temps les intestins : ainsi il peut convenir dans les fievres d'armées , sur-tout faute d'autres remedes ; car pour moi , je préférerai toujours le quinquina.

L'usage du vitriol blanc est plus sûr à l'extérieur qu'à l'intérieur : c'est un très bon remede topique pour consumer les chairs fongueuses & baveuses des vieux ulceres. HIPPOCRATE , GALIEN & DIOSCORIDE l'employoient dans les gargarismes , dans les collyres pour les yeux. Voici la composition du *collyre deterfif* du codex de Paris , qui est très bon dans les rougeurs & inflammations des yeux.

Prenez de l'eau de plantain & de

rose ,

seize onces.

de l'iris de Florence ,

un gros.

Faites bouillir jusqu'à la réduction de moitié , puis ajoutez un gros de vitriol blanc. Ce collyre s'emploie avec succès dans les longues inflammations des yeux , après avoir administré les remedes généraux. Pour s'en servir , il n'est pas nécessaire qu'il soit chaud. On y trempe des compresses , on les applique sur l'œil ; & dès qu'elles sont seches , on les y trempe de nouveau : si la maladie l'exige , on fait tomber quelques gouttes du collyre dans l'œil.

BINNINGERUS vante , comme un remede éprouvé dans la chassie , une pommade faite avec de bon beurre frais & du vitriol blanc en poudre. Je m'en suis toujours servi avec succès. Il suffit d'en insérer au soir un peu entre la paupiere & le globe de l'œil ; on applique par dessus des compresses trempées dans le collyre deterfif. J'en ai toujours vu de bons effets. On tire , comme l'on voit , d'assez bons remedes du vitriol blanc. Mais quant aux amulettes

que l'on fait avec l'alun, le sel & le vitriol blanc, elles n'ont d'autres vertus que celles que leur prête l'imagination.

Le vitriol bleu, ou vitriol romain, est styptique, astringent & fort caustique; on ne l'emploie point à l'intérieur. Cependant un peintre romain rapporte qu'il a guéri plusieurs enfants épileptiques avec deux grains de vitriol bleu dans de l'eau de galega: ce n'est pas là une grande autorité en médecine. Cependant, comme nous n'avons point encore de remèdes sûrs contre l'épilepsie, BOERHAAVE dit qu'on peut le tenter.

Si le vitriol bleu n'a point d'usage à l'intérieur, il n'en est pas de même à l'extérieur; c'est un très bon astringent contre les hémorrhagies. C'étoit de lui qu'on se servoit quand on appliquoit le bouton de vitriol; on le mettoit en poudre, & avec de la charpie on l'appliquoit sur l'ouverture des vaisseaux. Ce remède réussissoit très bien, & on peut encore s'en servir aujourd'hui au défaut du fungus. Autrefois, avec les trois especes de vitriol, la terre sigillée & le bol, on faisoit un cataplasme avec quelques délayants, pour appliquer sur le moignon après les amputations. Je condamne cette pratique, elle est mauvaise; elle produit une trop grande escarre & une trop grande fonte des humeurs.

Ce vitriol est très bon pour consumer les chairs baveuses des vieux ulcères. Délayé dans quelque eau astringente, comme l'eau de trainasse & de plantain, il a une merveilleuse efficacité dans les maladies de la peau, spécialement dans la teigne; mais il faut avoir administré auparavant les remèdes généraux, de crainte d'une métastase sur quelque viscère, ce qui causeroit une maladie infiniment plus dangereuse que la première.

Le vitriol verd, ou le vitriol de Mars, est le

plus styptique , mais il est moins mordant & caustique que le vitriol bleu. Il est très bon pour consumer les chairs baveuses des vieux ulcères. Il cause moins de douleurs que le vitriol bleu , mais les chairs qui reviennent ne sont pas si fermes que quand on a employé le vitriol bleu. Quelques-uns veulent que sa dissolution soit propre dans les vieilles gonorrhées ; mais je condamne cette pratique. On peut avec le vitriol verd faire des eaux minérales artificielles , égales à celles de Passy ; on en met cinq gros par pinte. En effet , nous sçavons que les eaux de Passy tiennent leur vertu d'une terre martiale qui y est dissoute. Or cette terre ne peut s'y tenir suspendue que par une qualité saline qu'elle a acquise , en contractant union avec quelque acide. De plus , je n'ai jamais vu de meilleurs effets des eaux de Passy , que de celles qu'on prépare avec le vitriol verd.

Les chymistes dans la distillation préfèrent le vitriol verd , parceque le feu le décompose plus facilement qu'aucun autre vitriol. Ce phénomène est d'autant plus surprenant , que l'acide universel a plus d'affinité avec le fer qu'avec aucune autre terre métallique. Je n'en puis donner la raison.

L'*aqua styptica* , l'eau styptique , se prépare avec tous les vitriols & l'alun , dans de l'eau de trainasse & de plantain. Elle est fort bonne dans les saignements de nez , diarrhées , & les pertes des femmes. On l'ordonne par goutte , de temps en temps , dans un grand délayant.

Avec le vitriol blanc , on prépare le *gilla vitrioli*. Dans cette préparation , on cherche à avoir l'acide uni avec le plomb & le zinc seul , & à le priver du cuivre & du fer qu'il contient. Pour cela on dissout le vitriol blanc ; il se précipite quelque chose. On filtre la dissolution , on la met à évaporer , puis à
cristalliser.

crystalliser. On répète les dissolutions, les cristallisations, évaporations, deux ou trois fois.

Les alchimistes veulent qu'on répète les dissolutions & les préparations, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien; mais il faut observer qu'il se précipite toujours une matière rouge, jaune, qu'on appelle *ochre*, & qu'ainsi, à force de répéter ces préparations, on parvient absolument à décomposer le vitriol.

D'autres ont voulu calciner le vitriol avant que d'en faire la dissolution; mais ils lui enlèvent seulement l'eau de sa cristallisation, & en même temps quelques acides. Ainsi cette préparation est inutile, & cause de la perte.

D'autres ont voulu employer le vitriol verd, ou le *colcothar* qui reste après la distillation du vitriol; mais par cette préparation, ils n'ont pas l'acide universel combiné avec du plomb & du zinc comme on le desire. Donc c'est la première préparation qui est la meilleure.

Le vitriol blanc, ainsi préparé, s'appelle *gilla vitrioli*, *vitriolum album depuratum*. C'est un émétique très fort & un astringent très tonique. Il étoit fort employé des anciens, qui ne connoissoient ni le tartre stibié, ni l'ipécacuanha. Ils le donnoient à un demi-gros dans les dysenteries & les dévoiements. Pour moi, je préférerois l'ipécacuanha; mais si je n'en avois pas, je préférerois le *gilla vitrioli* au tartre stibié dans les dysenteries & les dévoiements, avec d'autant plus de raison, que le *gilla vitrioli*, avec sa vertu émétique, possède celle d'être tonique & de fortifier les fibres. Au reste, je l'emploierois à petite dose.

La poudre de sympathie n'est autre chose que du vitriol bleu calciné au soleil, où il perd l'eau de sa cristallisation, & tombe en efflorescence, ordinairement.

rement en quarante jours. C'est un très bon remède ; il est styptique & astringent : il arrête parfaitement les hémorrhagies , étant appliqué sur les vaisseaux. Au reste , quant à ce qu'a dit le Chevalier Digby , que la poudre de sympathie arrête le sang à vingt ou deux cents lieues à la ronde , ce sont des contes ridicules. On ne la donne jamais à l'intérieur , elle est trop caustique.

On calcine le vitriol verd dans un creuset , jusqu'à blancheur ; alors il perd l'eau de sa crySTALLISATION. Cette préparation de vitriol verd n'est point employée seule ; mais elle entre dans l'orviétan & autres compositions pharmaceutiques.

En décomposant le vitriol , on en tire plusieurs substances. Nous avons d'abord à en parler , puis nous viendrons aux différents sels qu'on forme en combinant son acide avec différentes bases.

Pour distiller le vitriol , on prend le vitriol verd , on le calcine bien , on en emplit la moitié d'une cornue , on adapte un récipient , & on la met au fourneau de réverbère. D'abord on pousse par un feu très doux , & il monte du phlegme environ pendant quatre à cinq heures. Ce phlegme est assez abondant , sur-tout si le vitriol n'est pas bien calciné ; & alors il se gonfle , & risque de briser les vaisseaux. Quand il ne passe plus de phlegme , on change de récipient , on adapte un très grand ballon , on augmente un peu le feu , & il monte un esprit volatil sulphureux. On augmente encore le feu , l'acide du vitriol monte ; & si on le pousse jusqu'au dernier degré , on a un acide des plus concentrés , qu'on appelle *huile glaciale de vitriol*. Si l'on veut avoir toutes ces substances à part , il faut changer plusieurs fois de récipient ; ce qui reste dans la cornue est le *colcothar*.

Le phlegme qui monte le premier s'appelle *aqua*

vitrioli, *ros vitrioli*, *phlegma vitrioli*. Il n'est guere employé à l'intérieur : on peut cependant le donner pour étancher la soif dans les fièvres ardentes, malignes. A l'extérieur autrefois on l'a vanté pour bassiner les inflammations : à présent il est oublié, & M. MALOUIN s'en plaint, je crois, avec raison.

L'esprit de vitriol, qu'on tire dans cette distillation, est de deux especes ; l'un mêlé avec du phlegme, & le dernier, qui est extrêmement concentré. Quand on change de récipient, on les a séparés ; mais au cas qu'ils soient confondus ensemble, pour les séparer on distille de nouveau. On a soin d'adapter un très grand ballon : ce qui monte d'abord est le plus léger avec un peu de phlegme, & l'huile glaciale reste dans la cornue. Il est bon d'observer que, dans ces procédés, il faut un trou au haut du ballon, qu'on débouche de temps en temps pour laisser échapper quelque peu de vapeurs, pour prévenir la fracture des vaisseaux.

L'huile glaciale qui reste dans la cornue prouve qu'on pourroit, en déphlegmant les acides, les rendre sous une forme solide, si ce n'étoit leur extrême affinité avec l'eau. On n'emploie point cette huile glaciale en médecine, excepté à l'extérieur. Si on en laisse tomber une goutte sur les chairs, elle les gangrene & les mortifie sur le champ sans douleur ; ce qui prouve la fausseté des expériences de M. HALLER, qui dit que les tendons & les aponevroses ne sont point sensibles ; parcequ'il a laissé tomber dessus de l'huile de vitriol sans que l'animal ait crié. Au reste, je préférerois à ce caustique la pierre à cauter.

L'esprit de vitriol se donne *ad gratam aciditatem* dans des ptisanes, en potions, dans les chaleurs excessives. Cet acide mêlé avec le sang, le coagule, & lui communique la couleur noire. Il imprime cette

couleur à toute matiere qui contient du phlogistique , d'où je conclus que cet acide est très altérant. Ainsi je voudrois qu'on le préférât aux autres acides ; par exemple , dans les chaleurs excessives & les soifs inextinguibles : mais quand les chaleurs sont modérées , je préférerois les autres acides.

Ce qui reste dans la cornue après la distillation de l'acide vitriolique , s'appelle *colcothar artificiel*, pour le distinguer d'une espèce de colcothar naturel qui se trouve aux environs des mines de cuivre , spécialement en Suede & en Allemagne. Ce colcothar , ou calcitis , est également la base d'un vitriol dont l'acide s'est trouvé en partie détruit par les feux souterrains.

Les anciens ont préféré ce colcothar au colcothar artificiel. Ils le recommandoient spécialement dans la thériaque & l'emplâtre magnétique. Cela n'est pas étonnant , puisqu'ils préparoient le colcothar artificiel en calcinant seulement du vitriol verd. Ainsi ils ne parvenoient jamais à le dépouiller si parfaitement de son acide , qu'on le fait aujourd'hui par la distillation.

Pour moi , je donnerai la préférence au colcothar artificiel , tel qu'on l'a aujourd'hui. Les raisons sur lesquelles je m'appuie sont que le colcothar contient très peu de vitriol non décomposé , & que ce qu'il en contient est toujours un vitriol martial. Il contient beaucoup de terre martiale dont on est sûr , puisqu'on a employé du vitriol de Mars : au contraire , le colcothar naturel contient beaucoup de vitriol non décomposé , puisque les feux souterrains ne sont pas capables de lui enlever tout son acide. Ce vitriol peut être un vitriol de Vénus , & la terre qu'il contient une véritable terre cuivreuse , puisqu'on ne sçait si c'est un vitriol de Mars ou de Vénus qui a été calciné par les feux souterrains ; &

ce qui me porte à croire que c'étoit un vitriol bleu, c'est que ce colcothar se trouve spécialement aux environs des mines cuivreuses. Or on sçait que le cuivre est ennemi de l'homme : donc on doit toujours préférer le colcothar artificiel au naturel, puisqu'on n'est jamais sûr de celui-ci. Il peut de plus contenir quelques matieres arsénicales.

Quoi que les anciens en aient dit, CHARAS est de mon sentiment ; il préfère le colcothar artificiel au naturel. Les anciens ont attribué beaucoup de vertus au colcothar ; ils l'ont regardé comme alexitère , cordial , alexipharmaque : & dans cette intention , ils l'ont fait entrer dans la thériaque. CHARAS croit qu'il n'a point d'autre efficacité dans la thériaque , que de la noircir. Je le pense comme lui , car ce que l'on en met n'est pas capable de le faire fermenter ; ainsi je regarde le colcothar comme superflu dans cette composition.

Le colcothar, n'étant qu'une terre martiale, avec quelque peu de vitriol de mars non décomposé, est astringent , légèrement styptique & très peu caustique. A l'extérieur, il convient dans les vieux ulcères , pour réprimer les chairs baveuses , contre les maladies des yeux : dans ce dernier cas , je préfère les préparations de vitriol blanc, dont j'ai donné la composition ci-dessus.

Le *sel émétique* d'ANGELUS SALA se prépare avec le colcothar. Voici le procédé qu'il faut suivre. On prend le colcothar tel qu'il reste dans la cornue , on le calcine bien , on le réduit en poudre , on le lessive , on le met évaporer , puis cristalliser , & on obtient très peu de sel , qui est le sel d'ANGELUS SALA. On a dit que quand la calcination est bien faite , ce sel est blanc ; que quand elle n'est pas bien faite , ce sel est verd. Quant au sel verd, ce n'est que l'acide universel combiné avec une terre martiale , & ainsi un pur vitriol de mars qui n'a point été

décomposé : quant au sel blanc , il peut être de la matiere de la selenite , ou du tartre vitriolé. En effet , il est constant que dans tous les vitriols il se trouve toujours quelque peu de terre qui n'est pas métallique. Cette terre , dans la calcination du colcothar , a pu devenir absorbante , même alkaline. Or on sçait que tout acide a plus d'affinité avec les terres absorbantes & les alkalis fixes , qu'avec les terres martiales. Donc l'acide du vitriol de mars , qui n'aura point été décomposé dans la distillation , quittera sa terre métallique , & ira former un sel blanc semblable à la selenite , si la base est une terre absorbante ; ou de la nature du tartre vitriolé , si la base est alkaline fixe.

Ce sel est émétique , un peu moins cependant que le *gilla vitrioli*. Aussi ANGELUS SALA lui donnoit-il la préférence. Au reste , ce sel est peu employé depuis qu'on connoît le tartre émétique & l'ipécacuanha.

La terre douce du vitriol se prépare aussi avec le colcothar. On prend le colcothar ; on lui enleve, par des lixiviations réitérées , tous ses sels. Il reste une terre que l'on fait sécher : c'est la terre douce du vitriol. Cette terre est une pure terre ferrugineuse , privée de tout acide & de tout phlogistique : c'est le crocus de mars ou la rouille de fer ; elle en a toutes les propriétés.

Le tartre vitriolé se fait avec l'alkali fixe du tartre , & l'acide vitriolique. On verse goutte à goutte sur cet alkali fixe de l'acide vitriolique , jusqu'au point de saturation ; on fait évaporer jusqu'à siccité. On prend la masse , on la lessive , on la fait évaporer ; puis on la met crySTALLISER , & on obtient le tartre vitriolé.

On a confondu le tartre vitriolé avec le sel de *duobus* & le sel de SEIGNETTE. J'ai déjà dit que j'y trouve de la différence. La base du sel de *duobus*

est l'alkali fixe du nitre , & la base du tartre vitriolé est l'alkali fixe du tartre ; & je crois que cela mérite de l'attention. De plus , le tartre vitriolé ne se crystallise pas comme ces autres sels. Les crystaux du tartre vitriolé sont plus gros & moins dissolubles dans l'eau , que les crystaux du sel *de duobus*. Quant au sel de SEIGNETTE , sa base est aussi l'alkali fixe du nitre , combiné avec une espece d'acide sulphureux ; ainsi je crois que cela doit établir quelque différence entre le tartre vitriolé , le sel de SEIGNETTE & le sel *de duobus*.

Les crystaux du tartre vitriolé sont taillés en diamants. Ce sel est peu dissoluble dans l'eau ; & quand on l'ordonne , on doit avoir soin de le prescrire dans beaucoup de liquide qui soit bien chaud. Il faut aussi que le tartre vitriolé soit en poudre , afin de pouvoir l'y dissoudre.

Ce sel est apéritif , fondant , diurétique ; on le donne à la dose de ʒ j ou ʒ j ss. , même ij dans des ptisanes & bouillons appropriés. Ce sel a la propriété de tous les sels neutres ; il est aussi légèrement purgatif , & convient parfaitement pour tirer la teinture des purgatifs. On l'ordonne avec succès dans les suites de couches , quand les lochies n'ont pas bien coulé , quand il est survenu quelque dépôt lacteux ; car rien ne juge mieux les maladies qu'un flux d'urine : ainsi le tartre vitriolé en qualité d'apéritif procure un écoulement abondant d'urine , & en qualité de purgatif il fait faire deux ou trois selles par jour , & entretient la liberté du ventre : ce qui est un grand avantage. Je l'ai employé avec succès à l'égard d'une jeune femme de vingt ans environ , mélancolique ; le quatrieme jour après sa couche j'allai la voir au matin , & le lait ne s'étoit point porté aux mammelles ; au soir je la trouvai assise sur son lit où elle chantoit , rioit contre son ordinaire ; elle étoit dans une espece de petit délire ; la tête

étoit prise , le pouls dur & plein avec fièvre ; il marquoit l'éréthisme : je lui donnai sur le champ , au lieu de la saigner du pied , comme on a coutume dans ces cas , une potion antihystérique avec la teinture de castor & la liqueur anodyne minérale d'HOFFMAN ; le lendemain je la purgeai doucement, puis je la mis à l'usage du tartre vitriolé zij par jour : ce qui m'a très bien réussi. On peut aussi employer le tartre vitriolé dans les obstructions avec l'huile de vitriol préparé, l'eau de RABEL, la liqueur anodyne minérale d'HOFFMAN , & l'æther.

L'eau de RABEL porte le nom de son auteur. Pour la faire on prend de l'huile de vitriol bien concentrée ; on la met dans un grand matras à long col , on verse dessus à plusieurs reprises trois parties d'esprit-de-vin bien rectifié ; si on veut qu'elle soit plus forte , on ne met que deux parties d'esprit-de-vin ; & si on la veut encore plus forte , on met partie égale. On adapte un vaisseau de rencontre , & on laisse en digestion pendant un mois. Cette eau est d'un beau jaune citrin , & a une odeur fort agréable.

Voici comment RABEL la préparoit ; il prenoit des marcaissites ferrugineuses qui se trouvent autour de Paris , il les faisoit bouillir long-temps dans de l'eau pure , puis il les mettoit à l'air , & les arrosoit de temps en temps. Alors ces marcaissites se gerçoient & se fendoient d'elles-mêmes, puis il les lessivoit & en tiroit ainsi un vitriol de mars ; il tiroit de ce vitriol l'acide par la distillation ; il le rectifioit plusieurs fois , & à la fin obtenoit une espece d'huile de vitriol qu'il dulcifioit , comme nous avons dit ci-dessus. On voit par ce procédé qu'il étoit peu chymiste , qu'il se donnoit de la peine bien inutilement , & qu'il auroit eu beaucoup plutôt fait de prendre l'huile de vitriol.

L'eau de RABEL est un fort bon remede. Elle est

styptique, astringente ; elle convient à l'intérieur , dans les pertes de femmes , crachements de sang , saignements de nez ; dans les vomissements de sang elle réussit assez bien , mais il faut auparavant administrer les remèdes généraux. On la donne depuis quatre jusqu'à huit gouttes, ou *ad gratam aciditatem*, dans de l'eau de trainasse ou de plantain. On peut l'employer dans les fleurs blanches ; cependant dans ce cas je préférerois l'*alumen tinctum*. Elle est très utile sur la fin des vieilles gonorrhées, quand il n'y a point de vice local , que le virus vénérien est détruit , & qu'il ne reste plus qu'un relâchement ; c'étoit spécialement dans ce cas que RABEL la van-toit avec raison , car c'est à tort que quelques-uns craignent de l'employer.

Il y a une autre eau de RABEL , qu'on appelle eau de RABEL verte : en voici la préparation.

℞. Vitriol blanc , verd , bleu , ana ℥ ℥
 Sucre candi ℥ j
 Dissolvez dans de l'eau de fontaine lb j
 Ajoutez blancs d'œufs n^o. ij

Alors agitez la matiere pendant long-temps , puis mêlez de l'eau de plantain, de rose ana ℥ ij, ajoutez-y ℥ j de camphre dissout dans un peu d'esprit-de-vin. Tout le mélange étant fait , mettez en digestion pendant dix heures au soleil , ou au bain de sable.

Cette eau de RABEL est un très bon remède. Elle est plus styptique & plus astringente que la première ; mais on ne s'en sert jamais à l'intérieur. A l'extérieur , elle convient dans toutes les hémorrhagies , & dans les contusions.

Pour avoir la *liqueur anodyne minérale d'Hoffman*, on prend une partie de vitriol très concentré , on la verse peu à peu & à plusieurs reprises sur quatre parties d'esprit-de-vin très rectifié qu'on a mis dans un matras ; après l'effervescence , la liqueur prend

une couleur de rubis , & répand une odeur très agréable. On met en digestion pendant quelques jours ; puis on distille au bain de sable dans une cucurbite de verre suffisamment haute. Il monte d'abord un esprit-de-vin d'une odeur fort agréable ; il est suivi d'une autre qui l'est encore plus. Quand on s'apperçoit que la liqueur , qui est dans la cucurbite , devient noire , on change de récipient , & on pousse à un feu très doux , de peur que la matiere ne se sublime tout d'un coup ; il s'élève un phlegme d'une odeur sulphureuse , avec une huile qui se précipite au fond du récipient : on décante l'eau sulphureuse , & l'on obtient une huile d'un goût aromatique très agréable , & très pénétrante , qu'il faut garder dans une bouteille. On donne cette huile à la dose de deux ou trois gouttes dans trente ou quarante gouttes des esprits qu'on a mis à part , & c'est la liqueur anodyne minérale d'Hoffman.

Cette liqueur est claire , pesante ; elle est apéritive , calmante , anodyne ; elle convient dans les tensions de nerfs , dans les accès hypocondriaques & hystériques ; dans ce cas , on la mêle avec la teinture de castor ; on la donne aussi avec succès au soir pour calmer dans les fortes fièvres.

L'æther se tire de l'eau de RABEL par la distillation. Après l'esprit aromatique , il monte des vapeurs blanches : c'est l'æther. Il n'est point miscible à l'eau , & se dissipe promptement à l'air.

L'æther est tonique , stimulant à un très haut degré. On en donne trois ou quatre , même cinq gouttes avec l'huile animale de DIPPEL dans l'épilepsie. J'ai remarqué qu'il éloignoit les accès ; mais quoique je l'aie employé avec tous les remèdes appropriés , je ne l'ai jamais vu guérir entièrement cette maladie. Il convient aussi dans la paralysie & les maladies de nerfs.

VITRIOL LUNAIRE. Voyez ARGENT.



VITRIOLE, plante. Voyez PARIÉTAIRE.

VOLET. Voyez NÉNUPHAR.

VRILLÉE commune. Voyez LISERON.

VOMITIFS. Voyez Introduction, pag. 56.

VULNÉRAIRE des payfans. *Vulneraria* off.

Loto affinis, *vulneraria pratensis*, C. B. Pin. *Vulneraria rustica*, J. B. & Inst. r. h. *Anthyllis lenti similis*, DOD. Pempt. *Anthyllis leguminosa*, GER. & RAI hist. *Anthyllis leguminosa vulgaris*, PARK. *Vulneraria consolida*, GESN. Hort. *Glaux*, quorumdam, LOBEL. Adv. *Lotus latifolia*, DALECAMP. *Lagopodium flore luteo*, TABERN. Icon. *Anthyllis, foliis pinnatis, foliolis pluribus, terminatrice majore*, LINN. *Vulneraria rustica flore ferrugineo*, Act. Stoch.

De sa racine, qui est simple, longue, droite, boiseuse, d'une couleur noirâtre, d'une saveur légumineuse, s'élèvent d'environ un pied des tiges grêles, velues, légèrement rougeâtres, courbées ou couchées vers la terre. Ses feuilles ressemblent à celles des galéga; elles sont placées par paires le long d'une côte simple qui se termine par une seule feuille; elles sont glabres en dessus, velues en dessous, & un peu blanchâtres, mais d'un verd jaunâtre en dessus, d'une saveur douceâtre un peu âcre. Des sommités des branches sortent des fleurs, disposées en bouquet, légumineuses, jaunes, presque inodores, portées sur un calyce en forme de tuyau, qui, après que la fleur est tombée, devient comme une vessie, dans laquelle se trouvent une ou deux graines jaunâtres.

On rencontre cette plante sur les lieux montagneux, remplis de sable, de craie, secs, maigres. Sa fleur paroît en mai & en juin; ses semences sont mûres en juillet & août.

Elle est mise au nombre des vulnéraires. On la pile & on l'applique, en forme de cataplasme, sur

les plaies récentes. Cependant on en fait peu d'usage.

VULNÉRAIRES (Remedes, ou médicaments) *vulneraria, traumatica*, gr. τραυματικά. On appelle vulnéraire en général toute substance qui mene à cicatrice une solution de continuité ; mais comme les solutions de continuité varient beaucoup, il en est de même de ces plantes, & c'est ce qui mérite d'être examiné.

Toute solution de continuité dans les solides de notre corps est récente ou ancienne ; si elle est ancienne, la cicatrice ne se fait pas, ou parceque les bords de l'ulcere sont gonflés & enflammés, ou parceque l'ulcere est rempli de chairs mollasses & fongueuses. Dans le premier cas, les vulnéraires seront les doux apéritifs qui, en relâchant & détrempant les solides, atténuent un tant soit peu les fluides : tels sont une décoction d'hypericum, de lierre terrestre, de l'huile battue avec du vin ; voilà les vulnéraires apéritifs : dans le second cas, il faut avoir recours aux vulnéraires détersifs, qui sont un diminutif des plantes escarotiques, c'est-à-dire, qui agissent en redonnant du ton aux fibres, & en les stimulant légèrement ; mais pour cela il faut que les chairs fongueuses soient peu abondantes, car si la couche en étoit fort épaisse, il faudroit nécessairement avoir recours aux escarotiques dont j'ai déjà parlé.

Si la plaie est récente, qu'il n'y ait aucun obstacle, il suffit de maintenir les bords rapprochés ; mais si la plaie s'est engorgée, tuméfiée, qu'il y ait inflammation, il faut avoir recours aux vulnéraires apéritifs ; si c'est l'hémorrhagie qui fasse obstacle, les vulnéraires sont les astringents dont j'ai déjà parlé : souvent, soit que la solution de continuité soit récente, soit qu'elle soit ancienne, la cicatrice peut être retardée par le vice des hu-

meurs , comme il arrive dans la vérole , le scorbut , les écouelles.

VULVARIA. *Voyez* ARROCHE puante.

VULVE de la truie. *Voyez* COCHON.

W.

WINTER (Ecorce de). *Voyez* ECORCE de WINTER.

Y.

YABACCANI ou APINEL. *Voyez* APINEL.

YEUX d'écrevisses. *Voyez* ECREVISSES.

YSARD. *Voyez* CHEVRE , iij espece.

Z

ZÉDOAIRE. On distingue sous ce nom deux racines ; l'une longue , & l'autre ronde : ce ne sont pourtant , suivant quelques-uns , que des parties différentes de la même racine.

I^o. La ZÉDOAIRE LONGUE , *Zedoaria longa* , est une racine tubéreuse , dense ; longue de quelques pouces , grosse comme le doigt , & terminée à ses deux extrémités par une pointe mouffe. Elle est blanche en dedans , & de couleur cendrée extérieurement ; d'une saveur âcre , légèrement amère , aromatique. Elle a peu d'odeur , mais celle qu'elle exhale est agréable.

II^o. La ZÉDOAIRE RONDE , *Zedoaria rotunda* , est une racine qui ne diffère de la précédente que par sa figure ronde , mais inégale sur la superficie.

Ces deux racines sont apportées de la Chine. On croit que la plante vient dans l'Inde, & que c'est celle qui est désignée sous ces noms par les botanistes : *Malan-Kua*, Hort. malab. *Bon-tsiappo*, BRAM, *Colchicum zeylanicum flore viola*, *odore & colore ephemeris*, HERMAN. Parad. batav. *Kæmpferia foliis lanceolatis petiolatis*, LINN.

La racine de cette plante, que M. DE GARSAULT nomme *Zerumbeth* de Ceylan, est bulbeuse, revêtue d'une membrane coriace, grise extérieurement, & blanche intérieurement, d'une substance compacte. A cette racine sont adhérentes plusieurs bulbes ovalaires, & il en part des fibres chevelues. De cette racine s'élève une gaine blanche, membraneuse comme dans le safran, dans laquelle sont renfermées quelques fleurs, qui sortent du fond de cette gaine : elles sont d'une couleur mêlée de bleu, de blanc, de rouge ; leur odeur est agréable. Ses feuilles, qui sont terminées en pointe, sont lisses, unies, d'un verd gai.

L'odeur de la racine est forte, sa saveur est âcre & aromatique. La zédoaire échauffe, favorise la digestion, dissipe les flatuosités, apaise les douleurs de colique & celles de la matrice, remédie aux nausées, est bonne pour l'asthme. Si on la mâche, elle procure une abondante excrétion de salive. Elle se donne en poudre, à la dose de quinze grains.

ZERUMBETH. *Zerumbeth*, off. & GARZ.

Racine tubéreuse, genouillée, inégale, grosse comme le pouce, & quelquefois comme le bras ; blanchâtre ou jaunâtre. Son odeur est agréable, & sa saveur âcre, légèrement amère, aromatique.

La plante est désignée par ces phrases dans les livres de botanique : *Zinziber latifolium sylvestre*, HERMAN. *Zerumbeth*, GARZ. *Walinghuru*, sive *Zingiber sylvestre Zeylanensibus*, Hort. Lug. bat. Catal.

Catal. Kun, Hort. malab. *Pacoceroa* Brasiliensibus,
PISON & MARCG. *Zinziber sylvestre majus*, fructu
in pediculo singulari, SLOANE, RAI hist.

Sa racine, suivant le Père PLUMIER, est entièrement semblable à celle du roseau, mais d'une substance tendre, rougeâtre. Elle est garnie de fibres courtes & peu grosses. Elle pousse une tige d'environ cinq pieds, épaisse d'un pouce, cylindrique, qui n'est formée que par les queues des feuilles qui s'embranchent alternativement. Ses feuilles sont au nombre de dix ou de douze, disposées à droite & à gauche, membraneuses, de la même figure, de la même grandeur & de la même consistance que celle de l'alifier ordinaire, rougeâtres & ondées sur leurs bords, d'un verd clair en dessus, & d'un verd foncé & luisant en dessous. De la même racine & très près de cette tige, sortent d'autres petites tiges de couleur d'écarlate, hautes d'environ un pied & demi, épaisses de quatre pouces, & couvertes de petites feuilles étroites & pointues, des aisselles desquelles naissent des fleurs d'un beau rouge, qui sont rangées comme en épi ou en pyramide, & composées comme de trois tuyaux posés l'un sur l'autre. Ces tuyaux sont partagés en deux parties à leur extrémité, & de leur fond naît une petite feuille un peu épaisse & jaunâtre, accompagnée de deux petits sommets de couleur pâle. Enfin le calyce, qui porte un pistil allongé, menu, blanc, rouge en dehors, & rempli d'un suc de même couleur, s'ouvre par le haut en trois parties, & est rempli de plusieurs semences rousses, dures, & nichées dans une pulpe filamenteuse.

Cette plante se plaît dans les forêts humides & le long des ruisseaux. Son fruit est un aliment très agréable pour les bœufs & les autres bêtes de charge.

ZIBET. *Zebed* & *Zebet* Arabum. *Felis Zibe-*
Tome VIII. N ij

chi, GESN. *Animal Zibethi*, ALDROV. *Meles unguibus uniformibus*, LINN.

La plupart des naturalistes, dit M. DE BUFFON, ont cru qu'il n'y avoit qu'une espece d'animal qui fournît le parfum, qu'on appelle *civette*. Nous avons vu deux de ces animaux, qui se ressemblent à la vérité par les rapports essentiels de la conformation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; mais qui cependant different l'un de l'autre par un assez grand nombre d'autres caracteres, pour qu'on puisse les regarder comme faisant deux especes réellement différentes. Nous avons donné au second le nom de zibet.

Il differe de la *civette* en ce qu'il a le corps plus allongé & moins épais, le museau plus délié, plus plat, & un peu concave à la partie supérieure, au lieu que le museau de la *civette* est plus gros, moins long & un peu plus convexe. Il a aussi les oreilles plus élevées & plus larges, la queue plus longue & mieux marquée de taches & d'anneaux, le poil beaucoup plus court & plus mollet; point de criniere, c'est-à-dire, point de poils plus longs que les autres sur le cou, ni le long de l'épine du dos, point de noir au-dessous des yeux ni sur les joues: caracteres particuliers & très remarquables dans la *civette*.

On a appelé ces animaux *chats musqués* ou *chats civettes*; cependant ils n'ont rien de commun avec le chat, que l'agilité du corps. Ils ressemblent plutôt au renard, sur-tout par la tête: ils ont la robe marquée de bandes & de taches, ce qui les a fait prendre pour de petites pantheres par ceux qui ne les ont vus que de loin.

Le parfum du zibet est d'une violence extrême, & plus vif encore que la *civette*. Cette liqueur odorante se trouve dans une ouverture placée auprès des parties de la génération. C'est une humeur

épaisse, d'une consistance semblable à celle des pommades, & dont le parfum, quoique très fort, est agréable au sortir même du corps de l'animal.

Le zibet est un animal de l'ancien monde, & non de l'Amérique; il se trouve dans l'Afrique & dans l'Asie. Il peut vivre cependant dans les pays tempérés, & même froids, pourvu qu'on le défende avec soin des injures de l'air, & qu'on lui donne des aliments succulents & choisis. On en nourrit en assez grand nombre en Hollande, où l'on fait commerce de leur parfum. Pour le recueillir, ils mettent l'animal dans une cage étroite où il ne peut se tourner. Ils ouvrent la cage par le bout, tirent l'animal par la queue, le contraignent à demeurer dans cette situation, en mettant un bâton à travers les barreaux de la cage, au moyen duquel ils lui gênent les jambes de derrière; ensuite ils lui font entrer une petite cuiller dans le sac qui contient le parfum, ils raclent avec soin toutes les parois intérieures de ce sac, & mettent la matière qu'ils en tirent dans un vase qu'ils couvrent avec soin. Cette opération se répète deux ou trois fois par semaine. La quantité de l'humeur odorante dépend beaucoup de la qualité de la nourriture & de l'appétit de l'animal; il en rend d'autant plus qu'il est mieux & plus délicatement nourri. De la chair crue & hachée, des œufs, du riz, de petits animaux, des oiseaux, de la jeune volaille, & sur-tout du poisson, sont les mets qu'il faut lui offrir, & varier de manière à entretenir sa santé & exciter son goût. Il lui faut très peu d'eau; & quoiqu'il boive rarement, il urine fréquemment: & l'on ne distingue pas le mâle de la femelle à leur manière de pisser.

Cet animal est naturellement farouche, & même un peu féroce; cependant on l'apprivoise aisément,

au moins allez pour l'approcher & les manier sans grand danger. Il a les dents fortes & tranchantes, mais ses ongles sont foibles & émouffés. Il est agile, & même léger, quoique son corps soit assez épais. Il saute comme les chats, & peut aussi courir comme les chiens. Il vit de chasse, surprend & poursuit les petits animaux, les oiseaux. Il cherche, comme les renards, à entrer dans les basses-cours pour emporter les volailles. Ses yeux brillent la nuit, & il est à croire qu'il voit dans l'obscurité. Lorsque les animaux lui manquent, il mange des racines & des fruits. Il boit peu, & n'habite pas dans les terres humides. Il se tient volontiers dans les sables brûlants & dans les montagnes arides. Les zibets produisent en assez grand nombre dans leur climat; mais quoiqu'ils puissent vivre dans les régions tempérées, & qu'ils y rendent, comme dans leur pays natal, leur liqueur parfumée, ils ne peuvent y multiplier. Ils ont la voix plus forte & moins rude que celle du chat : leur cri ressemble assez à celui d'un chien en colere.

La liqueur du zibet, qu'on appelle *civette*, n'est presque plus d'usage en médecine. Les parfumeurs & les confiseurs l'emploient encore dans le mélange de leurs parfums.

ZINC. C'est un demi-métal de couleur plombée, livide, pesant, plus volatil & plus sulfureux que le bismuth. Il est formé à l'intérieur d'écailles très fines. En françois on l'appelle zinc, de *zincum*, *zinctum*, *marcassita pallida*, pour le distinguer du bismuth ou *marcassita argentea* : les anciens ne l'ont point connu, & c'est à STHAL qu'on doit ce qu'on sçait aujourd'hui sur son origine.

Le zinc se tire des mines de Goslar, & dans sa mine il y a quantité de plomb & de cadmie des fourneaux. Pour avoir le zinc on prend la mine, on la fait brûler dans un fourneau quarré, dont le devant est

fait d'une pierre talqueuse , épaisse seulement d'un doigt : & afin que cet endroit se conserve toujours frais , on arrose de temps en temps cette pierre avec de l'eau , & l'on souffle continuellement dans le fourneau tant que le zinc y est. On continue le feu pendant douze heures ; il se forme aux côtés du fourneau une espece de croûte talqueuse , on l'ôte de temps en temps de crainte qu'elle ne bouche le fourneau , puis au bout de douze heures on ôte tout le charbon ardent qui se trouve dans le fourneau ; on y met à la place du charbon pulvérisé ; on en met aussi en bas du fourneau ; ce charbon pulvérisé sert à donner au zinc son phlogistique nécessaire. Quand tout est ainsi disposé , on frappe sur les côtés du fourneau , & le zinc découle par une gouttiere dans le charbon qui est au bas du fourneau ; il reste attaché aux côtés du fourneau une matiere poreuse qu'on appelle *cadmia fornacum* , *cadmie des fourneaux* : c'étoit dans ses logettes que se trouvoit retenu le zinc ; le plomb qui étoit dans la mine se trouve au fond du fourneau sans être fondu ; car si le feu qu'on a employé eût été capable de fondre le plomb , le zinc se seroit sublimé.

Le zinc est , comme on le voit , une substance très volatile , dont le phlogistique est plutôt bitumineux que sulfureux. Je le prouve : le zinc , tenu en fusion dans un creuset , & remué avec une verge de fer , donne des vapeurs & une flamme très blanche ; ce qui est le propre des bitumes , & non pas du soufre dont la flamme est toujours bleue : de plus , le zinc n'a aucune affinité avec le soufre ; en effet , si l'on traite du zinc avec de l'antimoine , du foie de soufre , l'acide vitriolique rendu sulfureux , on remarque que ces substances n'ont aucune action sur lui , tandis que le régule d'antimoine s'unit avec lui ; que les alkalis fixes le fondent , & par la voie humide , & par la voie

seche ; que l'acide vitriolique pur le dissout. Ces différences donc viennent du soufre qui est dans l'antimoine , dans le foie de soufre , ou combiné avec l'acide vitriolique : d'où je conclus que le zinc n'a aucune affinité avec le soufre.

Le zinc , tenu en fusion dans un creuset , s'élève en aiguilles brillantes qui s'attachent au haut du creuset ; il paroît à la surface du zinc fondu une espece de poudre semblable à celle du zinc calciné. Il faut choisir le zinc pur ; on ne s'en sert point en médecine , mais il est d'un grand usage dans les arts ; du zinc avec du cuivre fait du métal de prince.

Les *fleurs de zinc* sont les aiguilles brillantes qui s'élèvent du métal qu'on tient en fusion dans un creuset. M. MALOUIN dit que ces fleurs ne different point de la poudre grise qui est à la surface du zinc tenu en fusion , & prétend qu'on n'a qu'à la ramasser & la calciner pour la réduire en fleurs de zinc. En Flandre & en Allemagne ces fleurs passent pour diaphorétiques , purgatives & émétiques ; mais elles possèdent foiblement ces vertus. On ne s'en sert point en France. A l'extérieur , ces fleurs font un bon effet dans les ophthalmies , gerçures , coupures du mamelon , des aines & des aisselles des enfants , des parties génitales des femmes ; elles détergent & nettoient les escars gangréneuses qui surviennent au croupion des malades qui restent trop long-temps couchés sur leur dos.

ZING marin. Voyez SCINC marin.

I N D E X

I N Q U O

R E C E N S E N T U R

O R D I N E A L P H A B E T I C O

G R Æ C A , L A T I N A , A R A B I C A

S U B S T A N T I A R U M O M N I U M

I N U S U S M E D I C O S V O C A T A R U M

N O M I N A ,

Q U I B U S S I N G U L I S S U B J I C I U N T U R

G A L L I C Æ V O C E S :

Q U O D P H I L I A T R I S

T U M R E G N I C O L I S T U M A L I E N I G E N I S

N O N E X I G U O F I E T C O M M O D O .



I N D E X

SUBSTANTIARUM OMNIUM

IN USUS MEDICOS

VOCATARUM.

A B

A B

A BALZEMER, PERSAR. *Sen-
né*, ou *Séné d'Alexandrie*.

ABELMOSCH, seu Mosch,
ARABUM, VESLING. &
RAII. *Ambrette* ou *Graine
musquée*.

ABEL-MOSCH vulgò, HERM.
Alcée indienne.

ABIES, MATTH. Abies foliis
solitariis apice emarginatis,
LINN. *Troisième espece de
Pin d'où découle la térében-
thine commune*.

Abies foliis fasciculatis obtu-
sis, LINN. *Arbre d'où dé-
coule la térébenthine de Ve-
nise*.

Abies rubra, TRAGI. Abies
foliis solitariis, apice acu-
minatis, LINN. *Seconde es-
pece de Pin d'où découle la
térébenthine commune*.

Abies taxi folio, fructu sur-
sum spectante, TOURN.
Abies conis sursum spectan-
tibus sive mas, C. B. Abies
femina, sive Ελάτη θήλεια,
J. B. *Arbre qui produit la
térébenthine de Strasbourg
ou de sapin*.

ABROTANUM femina, off.
Abrotanum femina, foliis
teretibus, C. B. *Aurone fe-
melle; Santoline; petit Cy-
près; Garderobe*.

Abrotanum lini folio acriori
& odorato, TOURNEF. *E/-
tragon*.

Abrotanum mas, off. Abro-
tanum mas angustifolium
majus, C. B. *Aurone mâle*.

ABSINTHIUM alpinum inca-
num, C. B. Absinthium se-
riphium montanum candi.

dam, SCHEUCHZ. *Absinthe des Alpes*.

Absointhium latifolium, DODON. *Absointhium vulgare majus*, J. B. *Absointhium romanum*, off. DIOSCOR. BAUH. *Absinthe vulgaire*.

Absointhium santonicum judaicum & alexandrinum, C. B. *Plante dont la graine tue les vers ; elle est connue sous le nom de santoline ou poudre à vers*.

Absointhium tenuifolium seu minus, seu *ponticum*, off. *Absointhium ponticum tenuifolium incanum*, BAUH. *Absointhium ponticum vulgare*, folio inferius albo, J. B. *Absinthe pontique*, ou *petite Absinthe*.

ABSORBENTIA medicamenta.
Remedes absorbants.

ABSTERGENTIA medicamenta.
Remedes abstergeants.

ABUTILON, ARABUM & OFF.
Fausse Guimauve ; Guimauve jaune.

ACACIA, C. B. *Acacia du Sénégal d'où découle la gomme arabique.*

Acacia folio scorpioïdes leguminosæ, C. B. *Acacia sant & Akakia*, PROSP. ALPIN. *Acacia vera*, SCHROD. & alior. *Acacia vera ægyptiaca filiquis sinuosis*, sive lupini, BREYN. *Acacia ægyptiaca*, COLUMN. *Acacia ægyptiaca foliis scorpioïdis leguminosæ*, filiquis albis, compressis, isthmo interceptis, floribus luteis, HERM. *Acacia ægyptiaca*

filiquis lupini, floribus luteis, HERM. *Acacia vera*, seu *Spina ægyptiaca foliis scorpioïdis leguminosæ*, floribus luteis, filiquis compressis lupini, DOUGL. *Acacia vera*, sive *Spina ægyptiaca subrotundis foliis*, flore luteo, filiquâ brevi, paucioribus isthinis glabris & cortice nigricantibus donata. PLUCK. *Acacia vrai.*

Acacia nostras, & *Acacia germanica*, OFF. *Suc d'acacia de notre pays*, ou *prunier sauvage*.

Acacia vulgaris, off. *Acacia arborea americana* ; *Acacia magna*, flore quasi mali aurantiæ odoratissimo ; *Acacia falsa* ; *Acacia adulterina seu spuria*. *Acacia commun* ; *grand Acacia* ; *Acacia en arbre d'Amérique* ; *faux Acacia*.

ACAIA, PISONIS. *Acaja quæ & Nametara Brasiliensibus*, MARCG. *Prunes de Monbain*.

ACAIAÏBA, MARCG. *Acajou*.
ACANTHIUM, *spina alba*, OFF. *Chardon commun* ; *grand Chardon aux ânes* ; *Artichaut sauvage* ; *Epine blanche sauvage*, ou *des champs* ; *Présure*.

ACANTHUS, sive *Branca ursina*, off. *Acanthus sativus* sive *mollis*, VIRGILII, C. B. *Acanthus foliis sinuatis inermibus*, LINN. *Branca ursine*, ou *Branche-ursine des Italiens* ; *Acanthe*.

- Acanthus vulgaris*, five germanica, FUCHS. *Berce*; *fausse Branc-ursine*; *Branc-ursine bâtarde*.
- ACANTIS, NONNULL. *Senegon*, ou *Senesson*.
- ACCIPITER, OFF. *Epervier*, *oiseau de proie*.
- ACCIPITRINA, CÆSALP. *Thalitron*, ou *Thaliætron*; *Science du chirurgien*.
- ACER montanum candidum, C. B. *Acer major* multis falsò *platanus*, J. B. *Acer major*, DODON. *Especce d'Erable d'où l'on tire un sucre*.
- ACERBA medicamenta. *Médicaments acerbes*.
- ACESCENTIA medicamenta. *Remedes acescents*.
- ACETABULUM alterum, CORD. *Orpin*; *Reprise*; *Grassette*; *Joubarbe des vignes*.
- ACETOSA rotundifolia, seu hortensis, OFF. *Acetosa rotundifolia hortensis*, C. B. *Acetosa rotundifolia*, DODON. *Oseille ronde*.
- Acetosa vulgaris*, OFF. *Acetosa pratensis*, OFF. & C. B. & TOURN. *Oseille ordinaire*; *Oseille longue*; *Vinette*.
- ACETOSELLA, OFF. *Pain à coucou*; *Alléluia*.
- ACHATES, flex fragmentis hinc convexis, indè concavis, subdiaphanis, LINN. *Achates*, OFF. & MER. *Agate*.
- ACHILLEA seu Millefolium, DODON. *Achillea fideritis*, DiosCOR. *Achillea foliis pinnato - pinnatis*, LINN. *Achillea foliis duplicato pinnatis glabris, laciniis linearibus acutè laciniatis, ejusd. Achillea pinnis foliorum plurimis, longè æqualibus, pinnatis, pinnulis trifidis & quinquefidis*, HALLER. *Millefeuille*; *Herbe au charpentier*; *Herbe à la coupure*.
- Achillea foliis integris minutissimè ferratis*, LINN. *Herbe à éternuer*.
- Achillea foliis pinnatis, pinnis longis, acutis, subhirsutis, rarè dentatis*, HALLER. *Especce de Matricaire qui croît sur le sommet des Alpes*.
- Achillea montana* DALEC. *Achillea montana artemisiæ tenuifoliæ facie*. LOBEL. *Achillée*.
- Achillea pinnis foliorum & pinnulis remotis, & angustis pinnulis plurimis*, C. BAUH. *Autre especce de Millefeuille, à laquelle TABERN. a donné le nom de noble*.
- ACHIOTL, five Medicina tingendo apta, HERMAN. *Achiotl*; *Urucu*; *Roucou*.
- ACHMELLA, DALE. *Acmelle*. Après THEOPHR. *Poirier sauvage ou des bois*.
- ACHRAS, seu *Pyrus sylvatica*, NONNUL. *Poirier sauvage ou des bois*.
- ACIDA medicamenta. *Médicaments acides*.
- ACIDULÆ aquæ. *Eaux acides ou froides*.

ACINARIA palustris ; GESNER. *Canneberge ; Cousines ; Cousinettes ; Coussinets des marais.*

ACIPENSER, RONDELET. Acipenser corpore tuberculis spinosis aspero, ARTEDI & LINN. *Esturgeon ordinaire ou commun.*

Acipenser tuberculis carens, ARTEDI. *Grand esturgeon : Poisson à colle.*

ACMELLA, off. & DALE. *Acnelle.*

ACONITI altera species cæruleo flore. GESN. *Aconit bleu ; Tue-loup ; Napel ; Coqueluchon ; Capuchon ; Capuce de moine ; Madriettes.*

ACONITUM cæruleum, seu *Nappellus primus*, C. B. Aconitum foliorum laciniis linearibus supernè latioribus lineâ exaratis, LINN. Aconitum cæruleum, seu *Nappellus cum cæsiis muscis*, THAL. *Aconit bleu ; Tue-loup ; Napel ; Coqueluchon ; Capuchon ; Capuce de moine ; Madriettes.*

Aconitum pardialanches minus, MATTH. *Doronic.*

Aconitum racemosum, an *Actæa* PLINIO ? C. B. *C'est peut-être l'Herbe de saint Christophe.*

Aconitum salutiferum, seu *Anthora*, C. B. Aconitum salutiferum, TABERN. MONT. Aconitum salutiferum luteum tenuifolium, sive *Anthora*, H. O. *Aconit salutaire ; Anthore ; Maclou.*

Aconitum salutiferum, TABERNÆMONT. Aconitum pardialanches monococcum, CORD. *Raisin de Renard ; Herbe à Paris.*

Aconitum urens ricini ferè foliis, flore cæruleo magno, staphisagria dictum, PLUCK. *Staphisaigre ; Herbe aux poux ; Herbe à la pituite.*

ACORUM falsum, CAMER. *Le faux Acorus.*

Acorum legitimum. RUPP. *Le vrai Acorus.*

ACORUS adulterinus ; Pseudoacorus ; Gladiolus, off. Acorus palustris, sive Pseudo-iris, & Iris lutea palustris, PARK. Acorus nostras palustris, CAMER. *Le faux Acorus.*

Acorus indicus, vel asiaticus, off. Acorus verus, seu Calamus aromaticus radice tenuiore, HERM. *Acorus des Indes ou d'Asie ; Glaïeul aromatique d'Asie.*

Acorus verus, officinis falsò. Acorus verus, seu Calamus aromaticus, off. C. B. *Le vrai acorus.*

ACOUSTICA medicamenta. *Remedes acoustiques.*

ACRIA medicamenta. *Remedes âcres.*

ACTÆA racemis longissimis, GRÆCOR. Actæa racemis longissimis, fructibus unico pluralibus, LINN. *Herbe de saint Christophe.*

ACULA campestris. *Aiguille ou Peigne de Venus ; Aiguille à berger.*

ACUS

ACUS pastoris. *Aiguille ou Peigne de Vénus ; Aiguille à berger.*

ADEPS. *Graisse.*

ADHER, seu **Adcher**, **ARABUM.** *Jonc odorant*

ADIANTUM album filicis folio, off. *Adiantum album folio filicis, C. B. & TOURNEF. Capillaire blanc.*

Adiantum album foliis rutæ, OFF. Capillaire blanc à feuille de rue, ou Sauve vie.

Adiantum americanum ; Adiantum canadense, off.

Adiantum americanum, J. CORNUTI. & TOURNIEF.

Adiantum fruticosum brasilianum, C. B. Capillaire de Canada.

Adiantum aureum, OFF. Capillaire doré, ou Perce-mousse.

Adiantum nigrum, off. Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro, C. B. Capillaire commun ou noir.

Adiantum rubrum, OFF. Capillaire rouge, ou Polytric.

Adiantum verum, off. Adiantum foliis coriandri, C. B. Capillaire de Montpellier, ou vrai Capillaire.

ADMELLA, **DALE.** *Acnelle.*

ADMIRABILIS jasmini rosa, **CLUS.** *Belle de nuit.*

ADONIS perennis dodecapetalos, **HALLER.** *Espece d'Elébore, qu'on croit être l'Elébore d'Hippocrate.*

ADOXA, **LINN.** *Moscatelline ; Herbe du musc ; Herbe musquée.*

Tome VIII.

ADRACHNE, seu **Andrachne** domestica, **NONNULLOR.** *Pourpier des jardins, domestique ou commun ; Pourcellane ou Pourcellaine à larges feuilles.*

Adrachne, seu Andrachne sylvestris, NONNULLOR. Petit Pourpier, ou Pourpier sauvage ; Porcellane, ou Pourcellane, ou Pourcellaine à feuilles étroites.

ÆGITHALUS major, **NONNULLOR.** *Grande ou grosse Mélange.*

ÆLUROPUS, **OFF.** *Pied de chat, plante.*

ÆRICA vel **Erica**, **GAZ.** *Harang.*

ÆS, **LATINOR.** *Cuivre ; Airain.*

ÆSCHYNOMENE grandiflora, **RUMPH.** *Arbre des battus ; Gajiti ; Æschynomene à grande fleur.*

ÆSCULUM foliis heptandris, **LINN.** *Marronnier d'Inde.*

AETITES, aquilæ lapis, **off.** *Aëtites, seu aquilinus lapis, WORM. Aëtites, SCHROD. Aëtites ochreo-ferreus, WODW. Aëtites embryone lapilluloso libero, LINN. Pierre d'angle.*

AGALLOCHUM. *Agallochum ; Bois d'Aloës.*

Agallochum, off. C. B. Seconde espece de bois d'aloës ou d'agallochum, suivant G. BAUHIN.

Agallochum præstantissimum, C. B. Première espece de bois d'aloës ou d'agallochum, suivant G. BAUHIN.

- Agallochum sylvestre , C. B. Agallochum , seu Lignum aloës mexicanum , G. CAMELLI. *Troisième espece de bois d'aloës ou d'agallochum* , suivant G. BAUHIN.
- AGALLUCHUM , ARABUM. *Agallochum ; Bois d'Aloës.*
- AGALUGEN. *Agallochum ; Bois d'Aloës.*
- AGALUGI. *Agallochum ; Bois d'Aloës.*
- AGARICUM , J. B. *Agaric.*
- AGARICUM auriculæ formâ , MICH. *Oreille de Judas.*
- AGARICUS , sive Fungus laticis , C. B. Agaricus ex laticis , PARK. *Agaric.*
- Agaricus auriculæ formâ , TOURN. *Oreille de Judas.*
- Agaricus mineralis. *Marne ; Agaric minéral.*
- Agaricus pedis equini facie , TOURNEF. *Amadouvier ; Agaric.*
- AGATY. *Arbre des battus ; Gajati ; Æschynomene à grande fleur*
- AGERATUM , off. Ageratum foliis serratis , C. B. *Eupatoire de Mésué.*
- AGGLUTINANTIA medica-
menta. *Remedes agglutina-
tifs.*
- AGNIL Indorum. *Anil , plante
du Brésil.*
- AGNUS castus , H. M. & GE-
RARD. Agnus castus folio
non serrato , J. B. *Agnus
castus.*
- AGRIFOLIUM vulgò , seu Aquifolium , J. B. & TOURN. *Agrifolium , DODON.
Houx.*
- AGRIMONIA , off. Agrimonia ,
seu Eupatorium , J. B. Agrimonia foliis pinnatis , fructibus hispidis , LINN. *Aigremoine.*
- AGRIORIGANUM , sive Onisis major , LOBEL. *Origan commun ou grand Origan ; Marjolaine sauvage ou bâtarde ; Marjolaine d'Angleterre.*
- Agrioriganum , sive Origanum sylvestre minus , NON-NULLORUM. *Petit Origan ; petite Marjolaine sauvage.*
- AGRIOTTA. *Griottes.*
- AGROSTEMMA , LINN. *Nielle des bleds ; Nielle bâtarde ; fausse Nielle ; Alesne.*
- AGUL & Almagi , ARABIBUS , planta spinosa mannam recipiens , J. B. *Alhagi.*
- AHAMELLA , HERM. *Acmelle.*
- AHOuai nerii folio , PLUM. & TOURNEF. *Ahouai yccotli , HERMAND. Ahouai.*
- Αἰγοθήλης , GRÆCOR. *Tettechevre , ou Crapaud volant , oiseau.*
- Αἰθουαί. *Ahouai.*
- Αἰλευπος , GRÆCOR. *Chat.*
- Αἷμα δράκοντος , GRÆCOR. RECENT. *Sang-dragon.*
- Αἱματίτης λίθος , GRÆCOR. *Pierre hématite.*
- AIZOON acre , CORD. *Joubarbe âcre ; Vermiculaire âcre ou brûlante ; Pain d'oiseau ; Poivre des murailles.*
- Aizoon magnum , DIOSCOR. *Grande joubarbe.*
- Aizoon minus , MATTH. *Petite Joubarbe ; Trique-madame , ou Tripe-madame.*

Aluga, sive *Chamæpitys mas Dioscoridis*, LOBEL. *Ivette ordinaire*.

Αναδιν πασίην, THEOPHR. *Larme qui découle de la Carline gommeuse, ou Chaméléon*.

Αναδιν GRÆCOR. *Chardonneret, oiseau*.

Akmella, HERM. *Acmelle*.

Ακμή, GRÆCORUM. *Sureau commun, ou grand Sureau*.

Alabastrites, seu *Alabastrum*, BOERRH. *Alabastrites*, SCHROD. *Albâtre*.

Alabastritis, off. MER. *Albâtre*.

Alabastrum & *Alabastrites*, off. *Albâtre*.

Alabastrum & *Alabastritis*, off. MER. *Alabastrum*, ALDROV. *Albâtre*.

Alachnen, ARABUM. *Sangdragon*.

Alaternoides africana lauri ferratæ folio, COMM. & DALE. *Alaterne, seconde espece*.

Alaternus, off. CHABR. & PARK. *Alternus secundus*, CLUS. *Alaternus major & minor*, RAIL. *Alaternus*, *Plinii*, & *humilior*, GER. *Alaternus*, sive *Philica elatior & humilior*, C. B. *Alaternus primus* CLUSII & *minori folio*, TOURNEF. *Alaternus priot & altera*, CLUS. *Alaterne, premiere espece*.

Alauda, off. MER. *Alauda vulgaris*, WILLUGB. *Alauda rectricibus extimis duabus extrorsum longitudi-*

naliter albis, intermediiis interiori latere ferrugineis, LINN. *Alouette ordinaire ou commune*.

Albicilla, NONNULL. *Hochequene commun; Lavandiere*.

Alcanna spuria. *Arbrisseau qui croît en Languedoc; faux Alcanna*.

Alcanna vera. *Arbre sauvage qui croît dans l'Inde, dans l'Egypte & dans la Syrie; Alcanna vrai*.

Alce, off. *Elan; Elant; Elend ou Ellend, grand quadrupede*.

Alcea ægyptiaca villosa, C. B. *Ambrette, ou Graine musquée*.

Alcea, seu *Bamia moschata ægyptiaca*, BREYN. *Alcea ægyptia moschata*, PARK. *Alcea ægyptiaca villosa*, C. B. *Alcée indienne*.

Alcea, DIOSC. off. *TABERNÆMONT*. *Alcea vulgaris*, J. B. *Alcea vulgaris major*, C. B. *Alcea vulgaris, sive Malva verbenacea*, PARK. *Alcea vulgaris major flore ex rubro roseo*, TOURNEF. *Alcée, ou Mauve sauvage*.

Alcea foliis sinuato-angulatis, LINN. *Rose d'outremer; Trémier; Rose trémiere*.

Alcea indica, *Abutilon dicta major*, pericarpio membranaceo, orbiculari, compresso, vertice corniculis extus coronato, intus in decem aut duodecim loculamenta diviso, MUCK. *Fausse Guimauve; Guimauve jaune*.

ALCEDO, SCHROD. *Martin pêcheur*; *Oiseau de S. Martin*, ou simplement *Martin*; *Alcyon muet*; *Pivert d'eau*; *Merle bleu*.

ALCHERON lapis. *Pierre qui se trouve dans la vésicule du fiel du bœuf*.

ALCHERVA, ARABUM. *Graine de ricin*, ou *Pignon d'Inde*.

ALCHIMILLA, seu *Pes leonis*, off. *Alchimilla vulgaris*, C. B. *Alchimilla foliis lobatis*, LINN. *Alchimilla folio integro stellato*, HALL. *Pied de lion*; *Alchimille*.

ALCYON fluviatilis vulgò *Piscator regis*, seu *Ispida*, CHARLETON. *Martin pêcheur*; *Oiseau de S. Martin*, ou simplement, *Martin*; *Alcyon muet*; *Pivert d'eau*; *Merle bleu*.

Ἀλκυον. Onguent.

ALEXIPHARMACA medicamenta. *Remedes alexipharmques.*

ALEXITERIA medicamenta. *Remedes alexiteres.*

ALGA angustifolia vitriarium, C. B. *Alga marina graminea*, PARK. *Alga marina*, LOBEL. *Algue commune*.

ALGA saccharifera islandica. *Algue porte-sucre.*

ALGIEDUAR, seu *Zedoaria*, AVIC. *Aconit salutaire*; *Anthore*; *Maclou*.

ALHAGI Maurorum, RAVVOLF. *Alhagi*.

ALHANDAL, ARABUM. *Coloquinte*.

ALHENNA, seu *Henna* ARABUM, WALTH. *Alcanna vrai*.

ALISMA alpinum, seu *Herba plantaginis foliis*, flore *doronici*, sternutamenta movente, GESNER. *Doronice*, ou *Arnica*.

Alisma Germanorum, TRAGI. *Tanaïsie des jardins à feuilles de menthe*; le grand *Baume*; la *Menthe coq*; la *Menthe not-e Dame*; le *Coq*; le *Pastè*; l'*Herbe du coq* ou au *coq*; le *Coq des jardins*.

ALKEKENGİ, off. **TOURN.** *Alkekengi foliis cordatis*, calyce rubente, HALLER. *Alkekenge*; *Coqueret*; *Coquerelle*.

ALKELITI, seu *Alkelt*, ARAB. *Nard celtique*.

ALLELUIA, off. & **LACUN.** & **LONICER.** *Pain à coucou*; *Alléluia*.

ALLIARIA, OFFIC. *Alliaire*.

ALLII genus, *Ophioscordon dictum quibusdam*, J. B. *Rocambole*.

ALLIOPRASUM, off. *Allioprasum caulis summo circumvoluto*, vel *Allium sativum alterum*, C. B. & **TOURN.** *Rocambole*.

ALLIUM alpinum, *viciorialis mas*, TABERN. *Allium montanum latifolium maculatum*, C. B. *Allium anguinum*, MATTH. *Allium caule plani-umbellifero*, *umbellâ globosâ*, *filamentis simplicibus*, *corollâ longioribus*, LINN. *Allium*

- radice oblongâ , obductâ reticulo , HALLER. *Ail serpentin* ; *Ail victorial* ; *faux Nard*.
- Allium sativum alterum , *sive* Allioprasum caulis summo circumvoluto , C. B. & Tourn. *Rocamboïle*.
- Allium scapo nudo infernè ventricoso longiore , foliis teretibus , LINN. *Oignon ordinaire* , *blanc ou rouge*.
- Allium vulgare , off. J. B. Allium sativum , C. B. Allium hortense , FUCHS Allium , DODON. Allium sativum multifidum , CORD. Allium caule planifolio , radice compositâ , staminibus tricuspидatis , LINN. Allium staminibus alternè trifidis , foliis gramineis , capite bulbifero , radicibus in unum congruentibus , HALLER. *Ail*.
- ALMAGI , ARABIBUS , Planta spinosa mannam recipiens , J. B. *Alhagi*.
- ALNARDIN alhendi , ARAB. *Nard indien*.
- Alnardin alsembel , ARAB. *Nard celtique*.
- Alnardin gebali , ARAB. *Nard de montagne*.
- ALNUS , off. Alnus rotundifolia glutinosa viridis , C. B. *Aune*.
- Alnus nigra baccifera , C. B. *Bourgène* , ou *Aune noir*.
- Αλόν , DIOSCOR. Aloës , suc concret , résineux - gommeux.
- ALOE & Succus aloës , Suc concret , résineux - gommeux.
- Aloë soccotorina angustifolia , spinosa , flore purpureo , BREYN. & COMM. L. Aloë Indiæ orientalis serrata , *sive* soccotorina vera , floribus phœniceis , H. B. Aloë americana , ananæ folio , floribus suavè rubentibus , PLUCK. Aloë americana serrata , floribus coccineis , P. B. P. *La plante qui donne le suc appelé aloës soccotrin*.
- ALOEES lignum *Agallochum* ; *Bois d'aloës*.
- Aloës vulgaris , C. B. & RAIH. &c .. Aloë , DIOSCOR. SLOANE. Aloë vera vulgaris , MUNT. Aloë vulgaris , *sive* Sempervivum maritimum , GER. *Plante qui fournit le suc nommé aloës hépatique*.
- ALOSA , off. & BELON. *Alose* , poisson.
- ALSEMBEL ; Alsembel alcib , ARABUM. *Nard indien*.
- Alsembel alrumi , ARABUM. *Nard celtique*.
- ALSINE aquatica perennis folio beccabungæ , MORIS. *Mouron d'eau*.
- Alsine petræa rubra , TABERN. Alsine tridactylites albicans , NONNULLOR. *Petite Saxifrage rouge*.
- Alsine verna , glabra , flosculis albis , *vel potius* Linum minimum , J. B. *Lin sauvage purgatif*.
- Alsine vulgaris , off. Alsine media , C. B. & Tourn. Alsine vulgaris , *sive* Morfus gallinæ , J. B. Alsine minor , DODON. *Alune*.

foliis ovatis, cordatis, floribus trigynis, LINN. *Alfine pentastemon*, foliis bipartitis, HALLER. *Morgeline*; *Mouron*.

ALTERANTIA medicamenta. *Remedes altérants*.

ALTHÆA, off. DIOSC. & PLIN. *Althæa*, sive *Bismalva*, J. B. *Althæa* foliis simplicibus tomentosis, LINN. *Guimauve*.

Althæa ægyptiaca moschata abelmosc dicta, H. O. *Alcée indienne*

Althæa lutea, GERARD. *Althæa THEOPHRASTI*, flore luteo, C. B. *Althæa lutea*, sive *Abutilon*, AVICENNÆ putatum, PARK. *Fausse Guimauve*; *Guimauve jaune*.

ALTHIT, AVICEN. *Assafétida*; *Merde au diable des Européens*; *Manger des dieux des Asiatiques*.

ALUCO, JONST. *Aluco minor*, WILLUGBY. *Fresaie*; *Effraie* ou *Orfraie*; *Hibou des clochers*; *petit Chat-huant plombé*; *Chouart*; *Lucheran*.

ALUMEN. *Alun*.

ALYPUM, MATTHIOLI, *tithymalis affine*, J. B. *Petit Tithymale à feuilles d'aman-dier*.

ALYSSON segetum foliis auriculatis acutis, TOURNEF. *Cameline*, *Sesame d'Allemagne* ou *bâtard*.

ALOCURUM, GRACORUM. *Renard*.

AMARADULCIS, seu *Glycyphycros*, J. B. *Morelle*; *Douce-amere*.

AMARA medicamenta. *Médicaments amers*.

AMANDINÆ aquæ. *Eaux de Saint-Amand*, dans les *Pays-Bas françois*.

AMARACUS, GALEN. & PAULI ÆGIN. *Matricaire*, ou *Espargoute*.

AMARACUS, MATTH. *Amaracus*, sive *Sampfucus*, *Latinis Majorana*, CORD. *Marjolaine vulgaire*.

AMARANTHUS, flos amoris, off. TOURNEF. *Amaranthus major semine albo*, J. B. *Amaranthe*; *Passe-velours*; *Fleur de jalousie*.

AMBAR, vel *Ampar*, AETII, *Ambre gris*.

AMBARA. *Succin*, ou *Karabé*.

AMBARE indica, GARC. & ACOSTA, &c. *Ambare*.

AMBARUM cineraceum, seu *griseum*, OFFIC. *Ambre gris*.

Ambarum citrinum. *Succin*, ou *Karabé*.

Ambarum liquidum, OFF. *Liquidambar*, *suc résineux*.

AMBRA grisea. *Ambre gris*.

AMBROSIA, sive *Lilium album* NICANDRI, ANGUIL. *Lis*, ou *Lis blanc*.

Ambrosia campestris repens, C. B. *Cresson sauvage*; *Corne de cerf d'eau*; *Ambroisie rampante sauvage*; *Pied de Corneille de RUELL.*

AMETHYSTUS. *Améthyste*.

AMIRBARIS, AVIC. *Epinevinette.*

AMLEGI, seu Emlegi, ARABUM. *Mirobolans emblics ou embliques.*

AMMI creticum, GER. Ammi parvum foliis fœniculi, C. B. *Ammi de Crete; Cumin d'Ethiopie.*

Ammi parvum, NONNULLOR. *Sison, ou faux Amome*

Ammi vulgare, off. Ammi vulgare majus, foliis latioribus, semine minùs odorato, J. B. *Ammi.*

Ἀμμωνιάκων Σουλάρια. *Gomme ammoniac.*

AMMONIACUM gummi. *Gomme ammoniac.*

AMMONIACUM SAL. *Sel ammoniac.*

AMOMUM, off. NONNULLOR. *Poivre d'Ethiopie.*

Amomum officinarum, sive Sison, J. B. Amomum germanicum, sive Sison vulgare, PARK. Amomum officinarum falsum, GESNER. *Sison, ou faux Amome.*

Amomum racemosum. *Amome en grappe.*

Amomum quorundam, CLUSII. Amomum quorundam odore caryophylli, J. B. *Poivre de la Jamaïque; Poivre de Thevet; Amomi; Toutes-épices.*

Amomum scapo nudo, spicâ ovatâ, LINN. *Plante dont la racine est le Gingembre.*

AMPAR, vel Ambar, AETII. *Ambre gris.*

AMULETA. *Amuletes.*

AMURCA. *Lie d'huile d'olives.*

Ἀμύρην. *Lie d'huile d'olives.*

AMYGDALIS similis guatimalensis, C. B. *Cacao, fruit.*

AMYGDALUS amara, officin. C. B. *Amandier amer.*

Amygdalus foliorum serraturis omnibus acutis, LINN. *Pêcher ordinaire.*

Amygdalus sativa; Amygdalus dulcis, off. Amygdalus sativa, fructu majori, C. B. Amygdalus dulcis, J. B. Amygdalus foliis petiolatis, serraturis infimis glandulosis, LINN. *Amandier doux.*

AMYLUM. *Amydon.*

ANACAMPSEROS, off. Anacampseros, vulgò Faba crassa, J. B. *Orpin; Reprise; Grassette; Joubarbe des vignes; Herbe aux charpentiers.*

Anacampseros radice rosam spirante, major, TOURNEF. *Orpin-rose.*

ANACARDII alia species, C. B. *Acajou.*

AN CARDIUM, off. Anacardium orientale, JONST. *Anacarde.*

Anacardium occidentale cajous dictum, ossiculo renis leporis figurâ, HERMAN. Anacardium occidentale, JONST. *Acajou.*

ANACATHARTICA medicamenta *Remedes expectorantis.*

ANAGALLIS aquatica, off. Anagallis aquatica folio rotundo non crenato, C. B.

Anagallis aquatica rotundifolia , GER. Mouron d'eau.

Anagallis aquatica, flore cæruleo , folio rotundiore , J. B. Petit Beccabunga.

Anagallis aquatica major , folio subrotundo , C. B. Grand Beccabunga.

Anagallis femina , off. DOD.

Anagallis cæruleo flore.

Anagallis cærulea femina ,

J. B. Mouron femelle ou à fleurs bleues.

Anagallis mas , off. DODON.

Anagallis phœniceo flore ,

C. B. Anagallis phœnicea

mas, J. B. Mouron mâle ou à fleurs rouges.

ANALEPTICA medicamenta.

Remedes analeptiques.

ANARANTIUM malum.

Orange.

ANANAS , Ananasa , Bras-

liensibus Nana , Hispanio-

lam habitantibus Jayama ,

Hispanis Pinas dictus. I. O.

Ananas.

ANAS rostro semicylindrico ,

cerâ flavâ , corpore albo...;

Cygne , oiseau.

Anas rostro semi-cylindraco ,

corpore suprâ cinereo , sub-

tus albido , rectricibus

marginis albis , LINN. Oie

domestique

Anas sylvestris , off. Anas

torquata minor , ALDROV.

Anas caudæ rectricibus in-

termediis recurvis , LINN.

Canard sauvage ordinaire

ou commun.

ANCHOAS , seu Zingiber mas ,

HERNAND. Gingembre mâle.

ANCHORAGO , QUORUMB.

Saumon.

ANCHUSA , off. Anchusa monf-

pelica , J. B. Anchusa pu-

niceis floribus , C. B. An-

chusa minor pupurea ,

PARK. Orcanette.

Anchusa foliis lanceolatis ,

spicis imbricatis secundis ,

LINN. Buglose.

Anchusa prima Dioscoridis ,

GUILLAND. Vipérine , ou

Herbe aux viperes.

Anchusa puniceis floribus ,

C. B. Faux Alcanna.

ANDRACHNE , sive Adrachne

domestica , NONNULO-

RUM. Pourpier des jardins ,

domestique ou commun ;

Pourcellane , ou Pourcel-

laine à larges feuilles.

Andrachne , seu Adrachne syl-

vestris minor , NONNULL.

Petit Pourpier , ou Pour-

pier sauvage ; Porcellane ,

ou Pourcellane , ou Pour-

cellaine à feuilles étroites.

ANDROSACES , vulgò Cuscu-

ta, TRAGI. Cuscute ; Goutte

de lin ; Herbe infernale.

ANDROSÆMON siciliana , aliis

ciciliana , J. B. Androsæ-

mon veterum , FUCHS.

Toute-saine.

ANDROSÆMUM maximum

frutescens , C. B. Androsæ-

mum vulgare , PARK. Tou-

te-saine.

Androsæmum minus , GESN.

Millepertuis , ou Herbe à

mille pertuis.

ANDRYALA major , DALE-

CAMP. Laitron , ou Laceron

doux ; Palais de lievre.

ANEMONE. *Anémone.*

Anemone nemorosa flore majore ex purpurâ rubente vel candido, C. B. Anemone nemorum alba, GERARD. & RAIL. Anemone semibus acutis, foliolis incis, caule unifloro, LINN. *Renoncule des bois; Bacinet blanc ou purpurin; fausse Anémone printanière des forêts.*

Anemone tubis caudatis, imis foliis duplicato-pinnatis, multifidis superioribus angustissimis, HALLER. *Cockquelourde; Pulsatille; Pas-se-velours.*

ANETHUM, off. Anethum hortense, C. B. Anethum fructu compresso, LINN. *Aneth.*

Anethum fructu ovato, LINN. *Fenouil commun.*

ANGELICA montana perennis, paludapii folio, TOURNEF. *Livèche, ou Ache de montagne.*

Angelica pratensis apii folio, TOURNEF. *Saxifrage des Anglois ou des prés.*

Angelica sativa, C. B. Angelica foliorum impari lobato, LINN. *Angélique.*

ANGSANA, vel Angsava Javanensibus; Draco arbor indica siliquosa, populi folio. COMMEL. *Quatrième espèce d'arbre qui donne le sang-dragon.*

ANGUILLA, off. Anguilla omnium auctorum, ΕΥΧΕΛΟΣ Græcis, RAIL. *L'Anguille, poisson.*

ANGUIS cinerea, maculâ dorsâ fuscâ longitudinali dentatâ, A. U. Anguis scutis abdominalibus 144, squamis caudæ 39, LINN. *Vipere.*

Anguis coluber, MERR. Anguis vulgaris fuscus collo flavescente, ventre albis maculis distincto, PETIV. *Serpent à collier.*

ANGURIA, off. Anguria citrullus, dicta, C. B. Anguria, Cucumis citrullus, DOD. & FUCHS. *Citrouille.*

ANHUIBA, sive Sassafras major, PISON. *Arbre dont le bois est le Sassafras.*

ANIIMUM & Animum des Portugais. *Animé d'Orient ou d'Ethiopie, résine.*

ANIL, ACOST. *Anil, plante du Brésil.*

ANIMAL ermineum. *Belette à queue noire; Hermine, ou Roselet.*

Animal magnum. *Elan, grand quadrupède.*

Animal moschiferum, OFF. *Chevre d'Afrique ou Gazelle; Chevre qui donne le musc.*

Animal sanguisugum, NON-NULL. *Sangsue.*

Animal zibethi, ALDROV. *Zibet, animal quadrupède.*

Animal zibethicum, OFF. *Civet.*

ANIMALE regnum. *Règne animal.*

ANIMALIA petrificata vermium holothuriorum, WALL. *Bélemnite, ou Pierre de lynx.*

- ANINGA iba , PISON. & MARCG. *Arum de PLUMM.*
 Aninga iba simpliciter dicta , J. PISON. *autre espece.*
 Aninga peri , PISON. *Aninga péri, plante des bois.*
 ANISUM africanum frutescens. folio & caule colore cæruleo tinctis , PLUCK. *Arbre d'où découle la gomme résine nommée Galbanum.*
 Anisum indicum stellatum badian dictum , off. Anisum peregrinum , C. B. Anisum Philippinarum insularum , CLUS. *Anis de la Chine ; Anis de Sibérie ; Anis étoilé ; Semence de Badian.*
 Anisum vulgare , off. Anisum foliis radicalibus simplicibus , LINN. *Anis.*
 ANNIL , sive Indigo ; Gali , sive Nil , herba roris marini facie , LINN. *Anil , plante du Brésil.*
 ANODYNA medicamenta. *Remedes anodyns.*
 ANONIS , sive Ononis , off. Anonis spinosa flore purpureo , C. B. Anonis floribus penè sessilibus , vaginis foliorum amplissimis , ramo quolibet in spinam terminato , HALLER. *Bugrande, ou Bugrane ; Arrête-bœuf.*
 ANONYMUS , foliis evonymi , CORD. *Fusain ; Bonnet de prêtre ; Bois à faire des lardoires.*
 ANSER , off. Anser domesticus , SCHROD. & GESN. & ALDROV. & WILLUGHBY. *Oie domestique.*
 ANSERINA , off. *Argentine ; plante.*
 ANTALE. *Antale.*
 ANTALGICA medicamenta. *Remedes antalgiques , ou contre les douleurs.*
 ANTALIMUM ; Antale , RONDEL. *Antale.*
 Antaphrodisiaca , vel Antaphroditica medicamenta. *Remedes antaphrodisiaques , ou qui éteignent la vivacité des desirs amoureux.*
 ANTARTHRITICA medicamenta. *Remedes antarthritiques , ou contre la goutte.*
 ANTASTHMATICA medicamenta. *Remedes antasthmaticques ou contre l'asthme.*
 ANTELLA , LOBEL. *Bugrande , ou Bugrane ; Arrête-bœuf.*
 ANTEMETICA medicamenta. *Remedes antémétiques , ou contre le vomissement excessif.*
 ANTEPHIALTICA medicamenta. *Remedes antéphialtiques ou contre le cochemar.*
 Ἀντεμωλικά Φάρμακα. *Remedes vermifuges.*
 ANTHELMIA , Anthelmiaæ radix , J. LINING. *Racine de benoîte sauvage.*
 ANTHEMIS , MATTH. *Camomille ordinaire.*
 Anthemis caulibus simplicibus unifloris (decumbentibus) foliis pinnato-multifidis , LINN. *Pyrethre , premiere espece.*
 Anthemis receptaculis conicis , paleis setaceis , seminibus nudis , LINN. *Camomille puante ; Maroute.*

ANTHEMON foliosum, GESNER. *Nielle des bleds; fausse Nielle; Nielle bâtarde; Alesne.*

ANTHIA. Poisson décrit sous ce nom par plusieurs auteurs.

ANTHOPHYLLI, aut Antophylli. *Clous de girofle.*

ANTHORA, C. B. Anthorazedoaria, aconitum salutiferum, TABERNÆMONTAN. *Aconit salulaire; Anthore; Maclou.*

ANTHOS, off. *Romarin; Encensoir.*

ANTHYLLIS altera, seu Chamæpitys spuria prior, DOD. Anthyllis chamæpitys minor, LOBEL. *Ivette musquée.*

Anthyllis altera salsa, CAMER. Anthyllis falsola appellata; Anthyllis, GRÆCORUM. *Grande Soude; Salicote; Marie vulgaire.*

Anthyllis lenti similis, DODON. Anthyllis leguminosa vulgaris, PARK. Anthyllis leguminosa, GERARD. Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus, terminatrice majore, LINN. *Vulnéraire des paysans.*

ANTHYPNOTICA medicamenta. *Remedes anthypnotiques, ou contre le sommeil excessif.*

ANTHYPOCHONDRIACA medicamenta. *Remedes anthypochondriaques, ou contre l'affection hypochondriaque.*

ANTHYSTERICA medicamenta. *Remedes anthysteriques, ou contre les vapeurs.*

ANTIACIDA medicamenta. *Remedes antiacides.*

ANTIPOPLECTICA medicamenta. *Remedes antiapoplectiques, ou contre l'apoplexie.*

ANTIASTHMATICA medicamenta. *Rem. contre l'asthme.*

ANTICANTHARUS, sive Proscarabæus, CHARLET. *Scarabée onctueux; Proscarabée; Escarbot onctueux.*

ANTIDOTARIUM. *Antidotaire, recueil de formules.*

ANTIDOTUM. *Antidote.*

ANTIDYSENTERICA medicamenta. *Remedes antidyssenteriques, ou contre la dysenterie.*

ANTIEPILEPTICA medicamenta. *Remedes antiépileptiques, ou contre l'épilepsie.*

ANTIHECTICA medicamenta. *Remedes antihectiques, ou contre la fièvre hectique.*

ANTIHYDROPICA medicamenta. *Remedes antihydriques, ou contre l'hydropisie.*

ANTILOÏMICA medicamenta. *Remedes antiloïmiques, ou contre la peste.*

ANTIMELANCHOLICA medicamenta. *Remedes antimélancholiques, ou contre la mélancholie.*

ANTIMONIUM. *Antimoine.*

ANTINEPHRETICA medicamenta. *Remedes antinéphrétiques, ou contre les maladies des reins.*

ANTIPARALYTICA medicamenta. *Remedes antiparalytiques, ou contre la paralysie.*

ANTIPHTHISICA medicamenta. *Remedes contre la phthisie.*

ANTIPLEURETICA medicamenta. *Remedes contre la pleurésie.*

ANTIPODRAGICA medicamenta. *Remedes contre la goutte.*

ANTIPUTRIDA medicamenta. *Remedes antiputrides, ou contre la pourriture.*

ANTIPYICA medicamenta. *Remedes antipyïques, ou contre la suppuration trop abondante.*

ANTIPYRETICA medicamenta. *Remedes antipyrétiques, ou contre la fièvre.*

ANTIPYROTICA medicamenta. *Rem. contre la brûlure.*

ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confectis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis, LINN. Antirrhinum foliis linearibus, ascendentibus, congestis, ramis spicâ florali densâ terminatis. HALL. *Linaire, ou Lin sauvage.*

ANTISCORBUTICA medicamenta. *Remedes antiscorbutiques ou contre le scorbut.*

ANTISEPTICA medicamenta. *Remedes antiseptiques, ou contre la pourriture.*

ANTISPASMODICA medicamenta. *Remedes antispasmodiques, ou contre les convulsions.*

ANTITHORA flore luteo aconiti, J. B. *Aconit salulaire; Anthore; Maclou.*

ANTIVENEREA medicamenta. *Remedes antivénériens, ou contre les maladies vénériennes.*

ANTONIANA, seu sancti Antonii Herbam maxima, GESN. *Herbe de saint Antoine.*

ANTONIANÆ AQUÆ. *Eaux de Tillerborn, à peu de distance d'Andernach, sur le Rhin.*

ANZOUROUT & Anzarout, ARAB. *Sarcocolle.*

APALACHINE, sive Cassine, I. M. *Alaterne, seconde espece.*

APARINE, off. *Aparine vulgaris*, C. B. & TOURN. *Aparine foliis lanceolatis, acuminatis, scaberrimis, corollis fructu minoribus*, LINN. *Gratteron; Rieble.*

Aparine latifolia humilior montana, TOURN. *Muguet des bois; petit Muguet; Hépatique étoilée.*

APER, off. & RAIL. *Aper; Porcus sylvestris*, KLEIN. *Cochon sauvage, ou Sanglier.*

APHACA, THEOPHR. & PLIN. *Pissenlit; Dent de lion.*

APHACE, GRÆCOR. *Vesce noire ou commune.*

APHRODISIACA medicamenta. *Remedes qui excitent aux plaisirs de l'amour.*

APIANA mala aut poma. *Pommes d'api.*

APIOLA mala aut poma. *Pommes d'api.*

APIUM, vel *Petroselinum crispum*, C. B. *Apium hortense multis, quod vulgò petroselinum, palato*

- gratum, crispum, J. B. Apium crispum, Apium multifolium, TABERN. *Persil frisé.*
- Apium, seu Petroselinum macedonicum, offic. Apium macedonicum, C. B. Apium petræum, NONNULL. *Persil de Macédoine; Ache, ou Persil des rochers.*
- Apium, anisum dictum. TOURN. *Anis.*
- Apium hæmorrhoidum, NONNULL. *Renoncule des marais; Grenouillette d'eau, ou aquatique; Herbe sardonique.*
- Apium hortense, seu Petroselinum vulgò, C. B. & TOURN. Apium hortense multis, quod vulgo petroselinum, palato gratum, planum, J. B. *Persil commun ou ordinaire; Persil des jardins ou domestique.*
- Apium hortense latifolium, C. B. Apium hortense magnum, vulgari hortensi sive petroselino vocato, sapore idem, sive anglicanum quibusdam, J. B. *Persil d'Angleterre, ou gros Persil.*
- Apium montanum, seu Oreoselinum, OFF. *Grand Persil de montagne, ou sauvage.*
- Apium montanum minus, sive Oreoselinum, officin.
- Apium montanum nigrum, C. B. Apium montanum Parisiense, PARK. *Petit Persil sauvage, ou de montagne.*
- Apium nigrum, seu saxatile, NONNULL. *Sison, ou faux Amome.*
- Apium palustre foliis oblongis, C. B. *Berle, ou Ache d'eau.*
- Apium vulgare; Apium palustre; Apium vulgare ingratius, J. B. Apium foliis caulinis cuneiformibus, LINN. *Ache.*
- APIS aut APES, off. Apis gregaria, LINN. Apis domestica, vel vulgaris alvearium, MER. Apis propriè dicta, sive mellificans. *Abeille; Mouche à miel; Avette ou Apette.*
- APOCYNUM erectum, incanum, latifolium, ægyptiacum, floribus croceis, HERM. Apocynum ægyptiacum lactescens, siliquâ asclepiadis, C. B. Apocynum syriacum, sive Beid el ossar ALPINI, J. B. *Plante d'où d'écoule la larme appelée Sucre d'Egypte.*
- Apocynum erectum malabaricum frutescens, jasmini flore candido, P. B. *Codagapala, ou Cropal.*
- Apocynum quartum latifolium, scammonia valentina, CLUSII. *Scammonée de Montpellier; Apocyn à larges feuilles.*
- APOLLINARIS, CORDI. *Jusquiame noire; Hannebane.*
- APOPHLEGMATISMUS. *Apo-phlegmatisme; remède qui attire la pituite de la tête.*
- APOPLECTICA medicamenta. *Remèdes contre l'apoplexie.*
- APOYOMATLI, seu Phatzifiranda, Cyperus americanus, HERM. *Souchet d'Amériq.*

APOZEMA. *Apozeme.*
 APSACA vera, L. H. *Vesce*
noire, ou commune.
 AQUA non madefaciens ma-
nus. Mercure ; Vis-argent.
 AQUÆ acidulæ. *Eaux acidu-*
les, ou froides.
 Aquæ minerales. *Eaux miné-*
rales.
 Aquæ thermales seu calidæ.
Eaux thermales ou chau-
des.
 Aquæ amandinæ. *Eaux de*
saint-Amand, dans les
Pays-Bas françois.
 Aquæ antonianæ. *Eaux de*
Tilleborn, à peu de distance
d'Andernach, sur le Rhin.
 Aquæ aquisgranenses. *Eaux*
d'Aix-la-Chapelle, dans le
cercle de Westphalie.
 Aquæ vel Thermæ austriacæ.
Eaux de Bade ou Baden,
dans l'archiduché d'Au-
triche.
 Aquæ badenses. *Eaux de*
Bade ou Baden, en Suabe.
 Aquæ bagnerienses. *Eaux de*
Bagnere, au comté de Bi-
gorre.
 Aquæ baregienses. *Eaux de*
Bareges, dans le comté de
Bigorre.
 Aquæ bellilucanæ. *Eaux de*
Balaruc, en Languedoc.
 Aquæ bonenses. *Eaux de*
Bonnes ou Bones, en
Béarn.
 Aquæ bononienses. *Eaux de*
Boulogne sur mer.
 Aquæ borbonienses ansel-
mieneses. Eaux de Bourbon-
Lancy, au duché de Bour-
gogne.

Aquæ borbonienses arcim-
baldicæ. Eaux de Bourbon-
l'Archambaut, dans le
Bourbonnois.
 Aquæ cauterienses. *Eaux de*
Cauteretz, dans le Bigorre.
 Aquæ cranenses. *Eaux de*
Cransac, dans le bas
Rouergue.
 Aquæ Daniel. *Eaux de Da-*
niel, dans le diocèse de
Lodeve.
 Aquæ dinienfes. *Eaux de*
Digne, en Provence.
 Aquæ egranæ. *Eaux d'Egra,*
en Bohême.
 Aquæ embsenses. *Eaux*
d'Embs, dans la Weié-
ravie.
 Aquæ forgienses. *Eaux de*
Forges, en Normandie.
 Aquæ meinenfes. *Eaux de*
Meine, à quatre lieues de
Nismes.
 Aquæ merienses. *Eaux de*
Miers, dans le Querci.
 Aquæ monferinenses. *Eaux de*
Montfrin, en Languedoc.
 Aquæ Montis aurei. *Eaux du*
Mont-d'or, en Auvergne.
 Aquæ mottenfes. *Eaux de la*
Motte, en Dauphiné.
 Aquæ passianæ. *Eaux de Pas-*
sy, près Paris.
 Aquæ plumberianæ. *Eaux de*
Plombieres, en Lorraine.
 Aquæ provinenfes. *Eaux de*
Provins, dans la Brie
champenoise.
 Aquæ pyrmontanæ. *Eaux de*
Pyrmont, dans la West-
phalie.
 Aquæ reginenses. *Eaux de*
ste. Reine, en Bourgogne.

Aquæ schwalbacenses. *Eaux de Schwalbach, assez près de Francfort sur le Mein.*

Aquæ selteranæ. *Eaux de Seltz, dans la basse Alsace.*

Aquæ sextienses. *Eaux d'Aix, en Provence.*

Aquæ spadana. *Eaux de Spa, à neuf lieues de Liege.*

Aquæ vel Thermæ superiores. *Eaux de Bade ou Baden, en Suisse.*

Aquæ tarbellicæ. *Eaux de Dax, dans les Landes de Gascogne.*

Aquæ vallenses. *Eaux de Vals, dans le bas Vivarais.*

Aquæ valletrienses. *Eaux de Barege, dans le comté de Bigorre.*

Aquæ vervonenses. *Eaux de Bourbonne, en Champagne.*

Aquæ vesullenses. *Eaux de Vesoul, en Franche-Comté.*

Aquæ Vici Comitris. *Eaux de Vic-le-Comte, dans la basse Auvergne.*

Aquæ vicienses. *Eaux de Vichi, dans le Bourbonnois.*

Aquæ wildungenses. *Eaux de Wildungen, en Allemagne, dans le cercle du haut Rhin.*

Aquæ wisbadenses. *Eaux de Wisbad, dans la Wétéravie.*

Aquæ yfallienses. *Eaux d'Youchet, dans le bas Languedoc.*

AQUEUS serpens. *Arbre d'où se tire le bois néphrétique.*

AQUIFOLIUM, *sive Agrifolium vulgò, J. B. & TOURN. Houx.*

AQUILA, *off. Aquila germana, GESN. Aquila regalis, SCHWENCK. Aquila Gesneri, sive Chrysaëtos Aquila, JONST. Aquila stellaris, chrysaëtos, BELON. Aquila fulva, seu aurea, WILL. Aquila Jovis maxima, vera, seu genuina, generosissima, nobilis. Aigle royal.*

Aquila aquatica cornuta, H. N. F. E. *Anhima, Oiseau de proie du Brésil.*

AQUILÆ lapis, OFFIC. *Pied d'aigle.*

Aquilæ lignum. *Agallochum; Bois d'aloës.*

AQUILEGIA; Aquileia; Aquilina, *off. Aquilegia sylvestris, C. B. Aquilegia nectariis incurvis, LINN. Aquilegia foliis rotundè lobatis, HALL. Ancolie, ou Gants de Notre-Dame.*

Aquisgranenses aquæ, aut thermæ. *Eaux d'Aix-la-Chapelle, dans le cercle de Westphalie.*

AQUOSA medicamenta. *Remedes qui contiennent beaucoup d'eau.*

ARACUS, *seu Craccæ primum genus, DODON. Vesce noire ou commune.*

Aracus aromaticus, OFFICIN. *Vanille.*

Aracus aromaticus, Tlilxochitl, *seu Flos niger Mexicanis dictus, HERM. Plante dont le fruit est la Vanille.*

ARALDA Bononiensibus, GERNER. *Digitale*; *Gants de Notre-Dame*.

ARALIASTRUM quinquefolii folio, majus *Ninjin* vocatum, SARRAZ. & VAILL. *Gins-eng*, ou *Ginseng*.

ARANEA. *Araignée*, insecte.

ARANEUS domesticus; *Ara-neus retarius* in fenestris degens. *Araignée*, insecte.

ARANTIIUM malum. *Orange*.

ARAPABACA quadrifolia fructu testiculato, PLUMM. & BARREL. *Spigelia*.

ARBOR acajou, vulgò cajou, PISON. *Acajou*.

Arbor Aristolochiæ foliis maderaspatanæ, fructu parvæ medicæ ad instar convolutæ, PLUCK. *Arbre qu'on soupçonne donner les coques du Levant*.

Arbor americana, alatis foliis, succo lacteo venenata, PLUCK. *Arbre dont le suc est le vernis de la Chine*.

Arbor americana, foliis pomi, fructu triangulo, C. B. *Ahouai*.

Arbor americana, MEXICANIS *Coatli*, aut *Calti*, aut *Coarhi*; *Aqueus serpens*, HERMAND. *Arbre d'où se tire le bois néphrétique*.

Arbor amoris, NONNULLOR. *Gainier*; *Arbre de Judas* ou de *Judée*; *Arbre d'amour*.

Arbor aquilæ. *Agallochum*; *Bois d'aloës*.

Arbor baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridi, calyculato, racemoso, SLOANE. *Arbre dont l'é-*

corce est la cannelle blanche.

Arbor balsami indici, balsamifera prima, HERNAND. *Arbre d'où découle le baume du Pérou*.

Arbor balsamifera brasiliensis, fructu monospermo, RAI. *L'arbre d'où découle le baume de Copahu*.

Arbor benjoini, GRIM. *Arbor virginiana*, citriæ vel limoniæ folio, COMMEL. *Arbre qui donne le benjoin*.

Arbor brasiliensis aquatica, folio nymphææ, fructu reticulato, pulpâ albâ humidâ; *Arum* de PLUMIER. *Aningaiba*. FIS & MARCQ.

Arbor brasiliensis, gummi elemi simile fundens, foliis pinnatis, flisculis verticillatis, fructu olivæ figurâ & magnitudine, RAI. *Arbre qui porte la résine nommée élémi*.

Arbor cacavifera, HERNAND. *Arbor* cacavifera americana PLUCK. *Le Caraque*, arbre qui produit le cacao.

Arbor camphorifera japonica, foliis laurinis; fructu parvo, globoso, calyce brevissimo, BREYN. *Arbor* fera, Japoniæ incola, WEINM. *Arbre qui donne le camphre ordinaire du Japon*.

Arbor canellifera indica, cortice acerrimo, viscido seu mucilaginoso, BREYN. *Arbre qui fournit la casse en bois*.

Arbor cannellifera zeylanica cortice acerrimo seu præstantissimo,

- Rantissimo**, qui Cinnamomum, off BREYN *Arbre dont la seconde écorce est la cannelle.*
- Arbor cassiam solutivam ferens**; BONT. *Arbre dont le fruit ou la gousse est la casse solutive.*
- Arbor fragorum.** *Arbousier; Fraiser en arbre.*
- Arbor fragrans.** *Agallochum; Bois d'aloës.*
- Arbor indica**, foliis juglandis, fructu nucis magnitudine, C. B.
- Arbor indica**, fructu conoïde, cortice pulvinato, nucleum unicum nullo osticulo tectum claudente, RAIL. *Anacarde.*
- Arbor insanix caranna nuncupata**, HERN. *Arbre par les incisions duquel découle en larmes la gomme de caragne.*
- Arbor Jovis.** *Chêne commun, à larges feuilles.*
- Arbor judaica**, J. B. *Gainier; Arbre de Judas ou de Judée; Arbre d'amour.*
- Arbor Judæ**, DODON. *Arbor Judæ quæ Græcis vulgò coucuchias*, BELON. *Gainier; Arbre de Judas, ou de Judée; Arbre d'Amour.*
- Arbor lentis**, NONNULL. *Gainier; Arbre de Judas ou de Judée; Arbre d'amour.*
- Arbor Liono dicta**, SLADI. *Arbor camphorifera sumatrana, foliis caryophylli aromatici longius mucronatis, fructu majori oblongo, calyce amplissimo tulipæ figuram quodammodo repræsentante*, BREYN. *Arbre qui donne le Camphre de Bornéo ou de Sumatra.*
- Arbor liquidambar**, seu *Styraciflua aceris folio, fructu tribuloïde*, PLUCK. *Arbre d'où coule le storax ou styrax.*
- Arbor liquidambari**, sive *Styracifera aceris folio, fructu tribuloïde, id est, pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens*, PLUCK.
- Arbor liquidambari indici**, seu *Xochiocotzoquahuitl*, HERNAND. *Arbre d'où découle le liquidambar.*
- Arbor malabarica lactescens**, jasmini flore odorato, siliquis oblongis, SYN. *Codaga pala, ou Cropal.*
- Arbor mexicana fructu castaneæ coccifera**, C. B. *Arbor finium regendorum*, SCAL. *Achioil; Urucu; Roucou.*
- Arbor mortis**, QUORUMD. *If.*
- Arbor myrobalanifera**, sorbi foliis, JONST. *Arbre qui porte les myrobolans citrins.*
- Arbor myrobalanifera**, foliis minutim incisiss, JONST. *Arbre qui porte les myrobolans emblics ou embliques.*
- Arbor myrobalanifera persicæ folio**, JONST. *Arbre qui porte les myrobolans chébules.*
- Arbor myrobalanifera salicis folio**, JONST. *Arbre qui porte les myrobolans indiens ou noirs.*
- Arbor nilicamara**, DALE. *Arbre qui porte les myrobolans emblics ou embliques.*

Arbor populo similis resinosa altera, C. B. *Arbre d'où découle la résine tacamahaca.*

Arbor poyson - vood - tree, P. T. *Arbre dont le suc est le vernis de la Chine.*

Arbor quæ'myrobalanus, laurifolio subcinericeo, JONST. *Arbre qui porte les myrobolans bellirics ou belliriques.*

Arbor sanctæ Mariæ, NONNULLOR. *Romarin; Encensier.*

Arbor sanguinis, seu Ezquahuitl, HERNAND. *Troisième espèce d'arbre qui donne le sang-dragon.*

Arbor sassafras ex Floridâ, ficulneo folio, C. B. *Arbre dont le bois se nomme sassafras.*

Arbor filiquosa ex Virginiâ, lobo fusco, scabro, C. B. *Arbor brâulienfis filiquosa & gummifera, gummi anime simili, lobus ex Wingandecaow, J. B. Arbre d'où découle la résine animé.*

Arbor filiquosa virginensis, spinosa, lotus nostratibus dicta, PARCK. *Acacia commun; grand Acacia; Acacia en arbre d'Amérique; faux Acacia.*

Arbor trifolia, anagyridi similis, J. B. *Aubour; Ebene des Alpes; faux Ebene.*

Arbor ursi vel ursæ, NONNULLOR. *Sureau commun ou grand Sureau.*

Arbor vaginalis, NONNUL. *Gainier; Arbre de Judas*

ou de Judée; Arbre d'amour.

Arbor virginiana, vel potius Platanus virginiana styracem fundens, RAIL. *Arbre d'où découle le liquidambar.*

Arbor zagoe amboinensis. SEBA. *Arbre d'où se tire le sagou.*

ARBUTUS, off. Arbutus folio ferrato, C. B. *Arbousier; Fraïsier en arbre.*

Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis, LINN. *Vigne d'ours, ou Boufferolle.*

ARCANUS marina, NONNULL. *Seiche ou Seche; Bouffron.*

ARCHANGELICA flore albo, seu Lamium vulgare album, PARK. *Ortie morte, non puante; Ortie blanche; Ortie qui ne pique point.*

ARCHIDUA, Theophrasti fortè, Papas Peruanorum, CLUSII. *Truffe rouge; Pomme de terre; Artichaut des Indes; Battate commune des jardins.*

ARCTIUM, LINN. *La Bardane, ou Glouteron.*

ARDEA, off. Ardea cinerea, MERRIAN. Ardea & Pella, BELON. Ardea cristâ dependente, LINN. *Héron gris ou cendré; oiseau.*

Ardea alba remigibus nigris, LINN. *Cigogne blanche ou commune.*

Ardea vertice papilloso, LINN. *Grue, oiseau.*

ARDESIA hibernica. I. M. *Pierre d'Hibernie, ou Ardoise d'Irlande.*

ARECA, *sive* Faufel, CLUS.

Areca palmæ foliis, J. B.

Areca frondibus pinnatis,

foliis oppositis, lanceolatis,

plicatis, LINN. *Cachou*;

Catéchu; *Caëchu*; *Cast-*

joe; *Cate*; *Khaath*; &

improprement *Terre du Ja-*
pon.

ARGENTINA, off. *Argentine*,
plante.

ARGENTUM. *Argent*, *métal*.

Argentum aqueum. *Mer-*
cure; *Vif-argent*.

ARGILLA ore liquefcens alba,
LINN. *Bol blanc*.

Argilla ore liquefcens rubra,
LINN. *Bol d'Arménie*.

Ἀργυρὸς. *Argent*, *métal*.

ARIES, Ovis, Vervex, Ag-
nus, KLEIN. *Le Bélier*,
la Brebis, *le Mouton* &
l'Agneau.

Aries laniger, caudâ rotundâ
brevis, BRISSON. *On dési-*
gne par cette phrase, un seul
genre d'animaux qui sont le
Bélier, la Brebis, le Mou-
ton & l'Agneau.

ARILLI Granatorum. *Semen-*
ces de grenades.

ARINGA cimbricorum litto-
rum, JOV. *Hareng*.

ARISTOLOCHIA caulibus in-
firmis, angulosis, foliis
cordato-oblongis planis,
floribus recurvis solitariis,
GRONOV. *Serpentaire de*
Virginie; *Vipérine de Vir-*
ginie.

Aristolochia clematidis recta,
C. B. Aristolochia clem-
atidis vulgaris, J. B. Aristo-
lochia caule erecto simpli-

cissimo, foliis cordatis pe-
tiolatis, floribus lateralibus
confertis, LINN. *Aristo-*
loche clématite.

Aristolochia longa, off. Ἀριστο-
λοχίας μακρὰ δακτυλίτις. DIOS-
CORID. & GALEN. Aristo-
lochia caule infirmo ramo-
so, foliis cordatis, inte-
gerrimis, longè petiolatis,
floribus solitariis, SAUVAG.
Aristolochia foliis cordatis,
petiolatis, integerrimis,
obtusiusculis, caule infir-
mo, floribus solitariis,
LINN. *Aristolochie lon-*
gue.

Aristolochia polyrhizos au-
riculatis foliis, virginiana,
PLUCK. *Serpentaire de Vir-*
ginie vivace.

Aristolochia rotunda, flore ex
purpurâ nigro, C. B. Ἀριστο-
λοχία στρογγύλη DIOSCOR. &
GALEN. Aristolochia foliis
cordatis, subsessilibus ob-
tusis, caule infirmo, flo-
ribus solitariis, LINN. *Aris-*
toloche ronde.

Aristolochia tenuis, *vel* Pisto-
lochia, off. Aristolochia
polyrhizos, PLIN. *Aristo-*
loche (petite).

Aristolochia violæ fruticosæ
foliis virginiana, cujus ra-
dix *Serpentaria* dicitur,
PLUCK. *Serpentaire à feuil-*
les de violette.

ARMENIACA malus, off. Ar-
meniaca fructu majori, nu-
cleo amaro, I. R. H. *Abri-*
cotier.

ARMENUS lapis, off. *Pierre*
d'Arménie.

ARMORACIA multis, J. B. Armoracia, vulgò Rapiſtrum, GESNER. *Raiſort ſauvage; grand Raiſort; Cran; Moutardelle.*

ARNICA, off. Arnica foliis ovatis, integris, conjugatis, HALLER. Arnica, lapſorum panacea, FEHRII. *Doronic ou Arnica.*

ARNOTTO, DALE. *Achiott; Urucu; Roucou.*

AROMATICA medicamenta. *Remedes aromatiques.*

ARTEMISIA ex alis florida, foliis petiolatis, palmatis, planis, ſericeis, HALLER. *Absinthe des Alpes.*

Artemisia foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo. LINN. Artemisia foliis incanis pinnatis, pinnis bilobis latioribus, floribus ex alis pendulis, in spicis heteromallis. HALLER. *Absinthe vulgaire.*

Artemisia foliis compositis multifidis, subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus, receptaculo nudo, LINN. *Absinthe pontique, ou petite Absinthe.*

Artemisia foliis ramosissimis setaceis, caule erecto fruticoso, LINN. *Aurône mâle.*

Artemisia tenuifolia, TABERN. *Matricaire ou Espargoute.*

Artemisia tenuifolia, FUCHS. *Tanaïſie ordinaire; Herbe aux vers.*

Artemisia vulgaris, off. Artemisia mater herbarum,

LOBEL. Artemisia foliis planis, semi-pinnatis, pinnis rariter dentatis, floribus erectis, densè spicatis, HALLER. Artemisia foliis pinnatifidis, planis, lacinia-tis, floribus erectis, LINN. *Armoise; Herbe de la saint Jean.*

Artemisia vulgaris latifolia, C. B. Artemisia chinensis cujus mollugo moxa, PLUCK. Artemisia orientalis, vulgaris facie, A. P. L. *Eſpece d'Armoise qui donne le moxa.*

ARTHANITA, Rapum terræ, & Panis porcinus, LOBEL. *Pain de pourceau.*

ARTHELICA, off. *Ivette ordinaire.*

ARTHRITICA simplex luteo flore, CAMER. *Primevere; Primerole; Fleur de coucou; Braies de cocu; Herbe à la paralysie.*

ARUM vulgare non maculatum, off. & C. B. Arum, TABERN. *Pied de veau ſans taches.*

ARUNDO, off. Arundo vallatoria, GER. Arundo vulgaris palustris, J. B. Arundo vulgaris vallatoria, MERRIAN. Arundo vulgaris, sive phragmites, Dioscoridis, C. B. & TOURN. Arundo calamus, CHABR. Arundo paniculâ laxâ, flosculis quinis, LINN. *Roseau.*

Arundo sacra Indiæ orientalis, sanguinem draconis manans, H. O. Arundo rotang, BONT. Arundo

Tarcta, seu *Palma conifera spinosa*, KÆMPF. *Seconde espece d'arbre qui donne le sang-dragon.*

ARUM maculatum vulgare, off. *Arum maculatum vulgare maculis candidis vel nigris*, C. B. *Pied de veau marqué de taches.*

ARUNDO mambu, PISON. *Arundo*, arbor in quâ humor lacteus gignitur, qui *Tabaxir* AVICENNÆ & *Arabibus* dicitur, C. B. *Bambu; Bambou; Bamboë* ou *Mambu.*

Arundo saccharifera, C. B. & SLOANE. *Arundo saccharina*, J. B. *Arundo & Calamus saccharinus*, TABERN. *Roseau d'où l'on tire le sucre.*

ASARA baccara. *Cabaret; Oreille d'homme; Girard-Roussin; Nard sauvage.*

ASARUM, off. *Asarum foliis petiolatis, subcordatis, floribus trifidis*, LINN. *Cabaret; Oreille d'homme; Oreillette; Rondelle; Girard-Roussin; Nard sauvage.*

Asarum foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis, LINN. *Plante dont le suc desséché & noir se nomme hypociste.*

Asarum virginianum pistolochiæ foliis subrotundis, cyclaminis more maculatis, PLUCK. *Serpentaire grande* ou *noire.*

ASCLEPIAS albo flore, C. B. *Asclepias, sive Vincetoxicum*

multis, floribus albicantibus, J. B. *Asclepias caule erecto, simplici, herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis*, LINN. *Asclepias foliis ex ovato-lanceolatis, glabris, floribus racemosis albis*, HALLER. *Domte-venin.*

ASCYRON, CORDI. *Millepertuis*, ou *Herbe à mille pertuis.*

ASELLUS, off. & ALDROV. *Asellus asininus, sive vulgaris*, RAI. *Cloporte; Pourcelet*, ou *Porcelet de saint Antoine.*

Asellus major, seu Morhua, off. CHARL. *Asellus, Merluccius, Cabéliau*, MERRIAN. *Morue, poisson.*

Asellus marinus, sive Merlangius, I. M. *Merlan.*

ASINUS. *Ane.*

ASPARAGUS sativus, off. *Asparaga sativa*, C. B. *Asperge.*

Asparagus sylvestris, off. *Asparagus sylvestris tenuissimo folio*, C. B. *Asperge sauvage.*

ASPERA Lappago, OFFICIN. *Gratteron; Rieble.*

ASPERGULA, off. *Gratteron; Rieble.*

ASPERUGO, off. *Gratteron; Rieble.*

ASPERULA, off. *Gratteron; Rieble.*

Asperula, sive Rubeola montana odora, C. B. *Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris*, J. B. *Asperula*

- odorata flore albo , DODON. *Asperula* foliis octonis lanceolatis , floribus fasciculatis , pedunculatis , LINN. *Asperula* foliis octonis ex summo caule panniculata , HALLER. *Muguet des bois ; petit Muguet ; Hépatique étoilée.*
- Asperula repens* GESNERI , sive *Saxifraga altera* CECALPINI , PARK. *Asperula* foliis quaternis linearibus , floribus trifidis , LINN. *Petite Garance ; Rubéole ; Herbe à l'esquinancie.*
- ASPHALTION , sive *Oxytriphylon Dioscoridis* , NONNUL. *Trefle odorant ou bitumineux.*
- ASPLENIUM , DODON. *Asplenium* fronde pinnatifidâ , laciniis alternis adnatis , LINN. *Cétérach.*
- Asplenium* frondibus alternatim decompositis foliolis cuneiformibus crenulatis , LINN. *Asplenium* ramis duplicato-ramosis , pinnis serratis , æqualibus & laxè dispositis. *Capillaire à feuilles de rue , ou Sauve-vie.*
- Asplenium* frondibus ensiformibus , integris , basi cordato-inflexis , petiolis hirsutis , LINN. *Scolopendre vulgaire , ou Langue de Cerf.*
- Asplenium* frondibus pinnatis , foliolis subrotundis crenatis , LINN. *Capillaire rouge , ou Polytric.*
- ASSA dulcis , OFFICIN. *Benjoin.*
- ASSA foetida , OFF. *Assa foetida ; Merde au diable des Européens ; Manger des dieux des Asiatiques.*
- ASTACUS fluviatilis , VORM. *Ecrevisse de rivières ou de ruisseaux.*
- ASTARAC & Astorac , AVICEN. *Storax solide.*
- ASTER atticus , CORD. *Œil de bœuf ; fausse Camomille jaune.*
- Aster omnium maximus* , Helenium dictus , I. R. H. *Aster* foliis amplexicaulibus , ex ovatis acuminatis , orâ serratâ , flore amplissimo luteo. HALLER. *Aunée ou Enule campane.*
- Aster peruanus tuberosus* , Flos solis farnesianus , COL. *Topinambour ou Poire de terre.*
- Aster pratensis autumnalis conyzæ folio* , TOURNEF. *Aster* foliis amplexicaulibus , crispis , subtus incanis , luteo flore radiato , HALLER. *Doronic rampant.*
- ASTRAGALUS aculeatus fruticosus massiliensis *Tragacantha* dictus , PLUCK. *Astragalus* caudice arborecente , petiolis spinescens , LINN. *Barbe-renard ou Epine du bouc ; c'est l'arbre qui produit la gomme adragant.*
- ASTRANTIA , DODON. *Impératoire.*
- Astrantia major* , MOR. *Astrantia* major , coronâ floris purpurascens , TOURNEF.

Astrantia nigra, LOBEL.
Astrantia nigra, seu *Vera-*
trum nigrum, GERARD.

ASTRINGENTIA medicamen-
 ta. *Remedes astringents.*

ATAMANTA foliolis lineari-
 bus planis hirsutis, semi-
 nibus oblongis hirsutis,
 LINN.

ATHAMANTA foliolis capilla-
 ribus, seminibus glabris,
 striatis, LINN. *Meu* ou
Méum; *Méum athamanti-*
que.

ATHANASIA vulgaris, LAC.
Tanaïsie ordinaire; *Herbe*
aux vers.

ATRAMENTUM sutorium. *Vi-*
triol.

ATRIplex alba, off. *Atriplex*
hortensis alba, sive pallide
vivens, C. B. *Arroche blan-*
che, ou *Belledame*, ou
Bonnedame, ou *Follette.*

Atriplex foetida, vulvaria,
 off. *Atriplex pusilla*, olida,
hircina, *Vulvaria* vocata,
garum olens, LOBEL. *Ar-*
roche puante.

Atriplex odora seu suaveolens.
Botrys vulgaire, ou *Pi-*
ment.

Atriplex odorata mexicana,
 HERN. *Botrys du Mexi-*
que, ou *Ambrosie.*

Atriplex rubra, off. *Atriplex*
hortensis rubra, C. B. *Attri-*
plex fativa altera, folio &
flore purpureo livens, LO-
 BEL. *Arroche rouge.*

ATROPA caule herbaceo, fo-
 liis ovatis integris, LINN.
Belladonna, *Bonnedame*,
 & non pas *Belledame.*

ATTENUANTIA medicamenta.
Remedes atténuans.

ATTRACTILIS, DIOSC. *At-*
tractilis hirsutior. FUSCH.
Chardon béni.

Attractilis lutea, OFF. *Char-*
don béni des Parisiens.

ATTRAHENTIA medicamenta.
Remedes attirants ou at-
tractifs.

AURANTIA malus, J. B.
Oranger à fruit aigre, ou
Bigarrade.

Aurantia malus dulci medullâ.
 OFF. *Oranger à fruit doux.*

AURANTIUM acri medullâ vul-
 gare. TOURNEF. *Oranger à*
fruit aigre, ou *Bigarrade.*

Aurantium dulci medullâ vul-
gare. TOURNEF. *Oranger*
à fruit doux.

Aurantium malum. *Orange.*

AURATA fluviatilis, NON-
 NUL. *Truite ordinaire*, ou
des rivières.

AUREA mala, DODON. *Au-*
rea mala, odore foetido,
 QUIBUSDAM. *Pomme d'a-*
mour, ou *Pomme dorée.*

AURELIANA canadensis; SI-
 NENSIBUS *Gins-eng*; IRO-
 QUÆIS *Garantoguen*, P. LA-
 FITEAU. *Gins-eng* ou *Gin-*
seng.

AUREUM malum. *Orange.*

AURI COLLA. *Le Borax.*

AURICULA Judæ, OFFICIN.
Oreille de Judas.

Auricula leporis, OFF. *Auri-*
cula leporis, umbellâ lu-
 teâ, J. B. *Auricula leporis*
Monspeliensium, GÉSNER.
Perce feuille vivace; *Oreille*
de lievre.

Auricula muris, LONICERI.
Pied de chat, plante.

Auricula muris, off. Auricula
muris, TABERN *Piloselle*;
Oreille de rat ou de souris.

Auricula muris tertia, CÆ-
SALPIN *Véronique mâle*;
Thé de l'Europe.

Auricula muris quinta, CÆ-
SALP. *Véronique des prés*,
ou *Germandrée bâtarde.*

Auricula muris sexta, CÆ-
SALP. *Véronique de bois ou*
des haies.

AURIPIGMENTUM *Orpin.*

AURUM. *Or, métal.*

AUSTERA medicamenta. *Mé-*
dicaments austers.

AUSTRIACÆ thermæ. *Eaux*
de Bade ou Baden, dans
l'archiduché d'Autriche.

AVANACOE, sive Citavanacu,
H. M. *Arbre qui donne la*
graine de ricin, ou pi-
gnon d'Inde.

AVELLANA lugdunensis ma-
jor, CAMER. *Noisetier ou*
Avelinier.

Avellana mexicana, J. B. Ca-
cao, *fruit.*

Avellana purgatrix novi or-
bis, J. B. Avellana purga-
trix, Nucula cathartica
tertia, J. B. *Graine du mé-*
dicinier d'Espagne, ou Noix
purgative.

AVENA alba, OFFIC. Avena
vulgaris, seu alba, C. B.
Avoine blanche.

Avena nigra, OFF. Avena syl-
vestrior, nigra tenuiorque,
CÆSALP. Avena calycibus
dispermis, seminibus lævi-
bus, LINN. *Avoine noire.*

AVICENNIA, LINN. *Ana-*
carde.

AVIS basilicus, NONNULLOR.
Passereau troglodyte, ou
Roitelet.

Avis junonia, NONNULLOR.
Paon ordinaire ou commun.

Avis medica seu persica, NON-
NULL. *Paon ordinaire ou*
commun.

Avis mortis, QUORUMD. *Fré-*
sate; Effraie ou Orfraie;
Hibou des clochers; pe-
tit Chat-huant plombé;
Chouart; Lucheran.

Avis Palamedis seu palame-
dea. *Grue, oiseau.*

Avis paradisi, sive sanctæ Ma-
riæ, QUORUMD. *Martin-*
pêcheur; Oiseau de saint
Martin, ou simplement
Martin; Alcyon muet; Pi-
verd d'eau; Merle bleu.

Avis persica seu medica, NON-
NULLOR. *Paon ordinaire*
ou commun.

Avis pia. *Grue, oiseau.*

Avis picta vel junonia, NONN.
Paon ordinaire ou commun.

Avis regaliolus, NONNULL.
Passereau troglodyte, ou
Roitelet.

Avis tarda. *Outarde; Otar-*
de; Bitarde.

AXONGIA. *Axonge.*

Axungia lunæ. *Terre sigillée*
blanche d'Allemagne.

Axungia solis. *Terre sigillée*
jaune d'Allemagne.

AZUTUM, sive caruleum fos-
sile, MERRIAN. *Pierre*
d'Arménie.

AZYMUS panis; Αζυμος. *Pain*
sans levain.

B A L

- B**ACCARUS. *Cabaret; Oreille d'homme; Oreillette; Rondelle; Girard-Rouffin; Nard sauvage.*
- BACCHARIS, quibusd. Conyssa major Mattholi, J. B. *Herbe aux mouchérons; Espece de Conyse.*
- BADENSES aquæ aut thermæ. *Eaux de Bade, ou Baden, en Suabe.*
- BADIANIFERA, LINN. *Arbre qui porte l'anis de la Chine.*
- BAGNERIENSES aquæ. *Eaux de Bagnères au comté de Bigorre.*
- BAGOLÆ primum genus, CÆSALP. *Airelle; Myrtille; Raisin de bois; Blueis; Morets; Mûres de ronces.*
- BALA, H. M. *Le Bananier dont le fruit se nomme banane.*
- BALADAR, SERAP. *Anacarde.*
- BALÆNA, OFF. *Balæna vulgò dicta, sive Mysticetus Aristotelis, Musculus Plinii, GESNER. Baleine ordinaire, ou grande Baleine.*
- Balæna macrocephala tripennis, quæ in mandibulâ inferiore dentes habet minùs inflexos, & in planum desinentes, SIBBALD. Baleine dont la tête est fort grosse, & qui se trouve dans le détroit de Davis.*
- Balæna minor. Petite Baleine ou Cachalot.*
- BALÆNÆ decimum genus *Narwal dictum. Narwhal ou Licorne de mer.*
- BALAM pulli, sive Maderam pulli, H. M. *Tamarinier.*
- Βάλανος. *Suppositoire.*
- Βάλανος αἰγυπία, GRÆCOR. *Ben ou Noix de Ben.*
- Βάλανος μυρεψική, DIOSCOR. *Ben ou Noix de Ben.*
- BALANUS myrepfica, OFFIC. *Ben ou Noix de Ben.*
- Balanus myrepfica, H. F. *Arbre qui porte la noix de Ben; le fruit nommé Ben ou Noix de Ben.*
- Balanus myrepfica filiquâ triangulari, seminibus alatis, *Moringeros LUSITANIS, & Katumarungha ZEYLANENSIBUS, H. L. B. Arbre qui produit l'espece de noix de ben appelée Mouringou.*
- BALAUSTIA. *Balaustes, fruits du grenadier balaustier.*
- Balaustia hispanica, J. B. *Balaustia flore pleno majore, C. B. Grenadier balaustier & Paparoi.*
- BALAUSTIUM, TABERN. *Balaustium majus, sive Malus punica sylvestris major, PARK. & RAIL. Grenadier balaustier & Paparoi.*
- BALLOTA foliis cordatis, indivisis, ferratis, LINN. *Marrube noir.*
- BALLOTE, MATTH. & TOURNEF. *Ballote, DIOSCORID. Marrube noir.*

BALNEUM. Bain.

BALSAMA. Baumes ; Résines liquides qui se tirent par incision , ou sans incision , de plusieurs arbres.

BALSAMELÆON , OFF. Baume de Judée ; Baume du Grand-Caire ; Baume de Constantinople ; Baume de la Mecque ; Baume blanc.

BALSAMICA medicamenta. Remedes balsamiques.

BALSAMINA lutea , sive Noli me tangere , C. B. Balsamine jaune ; Balsamine sauvage ou des bois ; Merveille à fleurs jaunes ; Herbe impatiente.

Balsamina major , DODON. Tanaïsie des jardins à feuilles de menthe ; le grand Baume ; la Menthe coq ; la Menthe Notre-Dame ; le Coq ; le Pasté ; l'Herbe du Coq ou au Coq ; le Coq des jardins.

Balsamina mas , OFF. Balsamina rotundifolia repens , sive Mas , C. B. Balsamina mas fructu puniceo , & momordica fructu luteo rubescence , HORT. EYST. Pomme de merveille ; Balsamine mâle ou rampante.

BALSAMITA , OFFIC. Menthe commune ; Baume des jardins ; Herbe du cœur.

Balsamita mas , sive Costus hortorum , RAIL. Tanaïsie des jardins à feuilles de menthe ; le grand Baume ; la Menthe coq ; la Menthe Notre Dame ; le Coq ; le Pasté ; l'Herbe du coq ou

au coq ; le Coq des jardins.

Balsamita minor , DODON. Eupatoire de MÉSUE.

BALSAMUM copaïba , vel brasiliense. Baume de Copahu ou du Brésil.

Balsamum ex Peru , J. B. Balsamum peruvianum , PRISON. L'Arbre d'où coule le baume du Pérou.

Balsamum judaicum ; Balsamum gileadense ; Balsamum syriacum ; Balsamum à Meccâ ; Balsamum constantinopolitanum album , OFF. Baume de Judée ; Baume du Grand-Caire ; Baume de Constantinople ; Baume de la Mecque ; Baume blanc.

Balsamum peruvianum album , OFF. Baume blanc du Pérou.

Balsamum peruvianum fuscum vel nigrum. Baume brun ou noir du Pérou.

Balsamum syriacum , rutæ folio , C. B. Balsamum verum , J. B. Balsamum lentisci folio , ægyptiacum , BELON. Plante qui donne le baume de Judée ou de la Mecque.

Balsamum tolutanum , foliis ceratiæ similibus , quod candidum est , C. B. Balsamum de Tolu , J. B. Balsamum provinciæ Tolu , balsamifera quarta , HERNAND. L'Arbre d'où se tire par incision le baume de Tolu.

Balsamum tolutanum , offic. Balsamum solidum. Baume

de Tolu ; Baume d'Amérique ; Baume de Carthage ; Baume dur ; Baume sec.

BAMIA moschata, off. Bamia moschata ægyptiaca, BREYN. Bamia, Belmuscus, CHAB. Bamia moschata, ALP. *Alcée indienne.*

BARBA capræ floribus compactis, C. B. *Reine des prés ; Petite Barbe de chevre ; Vignette.*

Barba capri quibusdam, CÆSALP. *C'est peut-être l'Herbe de S. Christophe.*

Barba hirci, seu Coma hirci purpurea, NONNULL. *Sercifis ; Cercifis ; Salsifis ; Sarsifis blanc commun des jardins ou d'Italie.*

Barba hirci, CORD. *Sercifis sauvage ou des prés ; Barbe de bouc.*

Barba Jovis, OFF. *Grande Joubarbe.*

Barba senis sive presbyteri, NONNULL. *Sercifis sauvage ou des prés ; Barbe de bouc.*

BARBAREA, off. Barbarea seu Eruca lutea latifolia, C. B. *Herbe de sainte Barbe, ou Herbe aux charpentiers.*

BALBICAPRA & Ulmaria vulgi, LOBEL. *Reine des prés ; Petite Barbe de chevre ; Vignette.*

BARBULA hirci, TRAGI. *Sercifis sauvage ou des prés ; Barbe de bouc.*

Barbula hirci cæruleo purpurea, TABERN. Barbula hirci altera, MATTHIOL.

Sercifis ; Cercifis ; Salsifis ; Sarsifis blanc commun des jardins ou d'Italie.

BARDANA, off. *La Bardane ou Glouteron.*

BAREGIENSES aquæ. *Eaux de Bareges, dans le comté de Bigorre.*

BASILICON vulgare, OFFIC. *Basilic commun ou moyen ; Basilic aux sauces, ou des cuisiniers.*

BASILICUM minimum, OFF. *Petit Basilic.*

Basilicum vulgare, OFF. *Basilic commun ou moyen ; Basilic aux sauces, ou des cuisiniers.*

BASILICUS avis, NONNULL. *Passereau troglodyte, ou Roitelet.*

BATRACHION, APULEI. *Renoncule bulbeuse ; Bacinet ; Pied de Corbin ; Pied de coq à racine ronde, ou à tubercule charnu.*

BATRACHIUM exiguum, NONNULL. *Renoncule bulbeuse ; Bacinet ; Pied de corbin ; Pied de coq à racine ronde, ou à tubercule charnu.*

Batrachium palustre, NONNULL. *Renoncule des marais ; Grenouillette d'eau ou aquatique ; Herbe sardonique.*

Batrachium salutiferum ; Ranunculus dulcis, TABERNÆMONT. *Renoncule des prés ; Bacinet rampant & velu.*

BATTATA canadensis. PARK. *Topinambour ou Poire de terre.*

BATTATA virginiana, GERARD. & PARK. *Truffe rouge ; Pomme de terre ; Artichaut des Indes ; Battate commune des jardins.*

BDELLIUM. *Bdellium dont on distingue deux especes.*

BECCABUNGA major, OFF. *Grand Beccabunga.*

Beccabunga minor, OFFIC. *Petit Beccabunga.*

BECHICA medicamenta; Βηχικά φάρμακα. *Remedes béchiques.*

BECHIUM, sive Farfara, DOD. *Tussilage ; Pas d'âne.*

BEHEN album, offic. Behen, aut Behmen abiad, AVIC. & SERAP. *Behen blanc.*

Behen album, C. B. *Plante dont la racine se nomme behen blanc.*

Behen rubrum ; Behen vel Behmen ackmar, AVIC. & SERAP. *Behen rouge.*

BEHMEN abiad, ARABUM. *Plante dont la racine se nomme behen blanc.*

Behmen abiad, AVIC. & SERAP. *Behen blanc.*

Behmen ackmar, AVIC. & SERAP. *Behen rouge.*

BEID el ossar, *C'est-à-dire Œuf d'ossar. C'est ainsi qu'on nomme en Egypte le fruit de l'ossar, espece d'apocyn d'où se tire le sucre d'Egypte.*

BELEMNITES, off. *Bélemnite ou Pierre de lynx.*

BELION, QUORUMD. *Polion de montagne à fleurs jaunes.*

BELLADONA, CLUS. *Belladonna, J. B. Belladonna,*

Belladone, & non pas Belledame.

BELLILUCANÆ aquæ. *Eaux de Balaruc, en Languedoc.*

BELLIS sylvestris, caule folioso, major, C. B. *Grande Marguerite ; grande Paquerette ; Œil de bœuf.*

Bellis sylvestris minor, C. B. *Bellis minor sylvestris spontanea, J. B. Bellis scapundo unifloro, LINN. Petite Marguerite ; petite Paquerette.*

BELLIUM majus, TABERN. *Grande Marguerite ; grande Paquerette ; Œil de bœuf.*

BELLIVICUS, seu Belliculus marinus, NONNULLOR. *Nombril marin ; Umbilic marin ; Nombril ou Fève de mer ; Limaçon de mer.*

BELMUSCUS, CHABR. *Alcée indienne.*

BELZOE. *Benjoin.*

BELZOÏM. *Benjoin.*

BELZOÏNUM. *Benjoin.*

Belzoïnum, C. B. *Arbre qui donne le benjoin.*

BEN, ARAB. *Ben ou Noix du ben.*

Ben magnum, QUORUMD. *Graine du médicinier d'Espagne, ou Noix purgative.*

BENIVI. *Benjoin.*

BENIVIVUM. *Benjoin.*

BENJOÏNUM. *Benjoin.*

BERBERIS dumetorum, C. B. & TOURNEF. *Berberis vulgò quæ oxyacantha putata DODON. Berberis pedunculis racemosis, LINN. Epinevinette.*

BERULA, off. *Berle* ou *Ache* d'eau.

BESTIA magna. *Elan* ; grand *Quadrupede*.

BETA alba ; Beta candida , off. Beta alba vel pallescens quæ cicla , off. C. B. *Bette blanche*, ou *Poirée blanche*.

Beta rubra radice rapæ ; Beta romana , off. Beta crythrorizos ; Beta rapa , off. Beta radice rubrâ crassâ , J. B. Beta rubra romana, DODON. *Bette-rave*.

Beta rubra vulgaris , C. B. Beta nigra , OFFIC. *Bette rouge* ou *Poirée rouge*.

Beta sylvestris , CORDI. *Pyrole* ; *Verdure d'hiver*.

BETONICA , offic. *Betonica purpurea*, C. B. *Betonica corollarum lacinia intermedia labii inferioris emarginata*, LINN. *Betonica foliis inter verticillos in vertice congestos brevissimis & integris*, HALLER. *Bétoine*.

Betonica Pauli Æginetæ, seu *Teucrium*, TRAGI. *Betonica altera Dioscoridis*, CORN. *Véronique mâle* ; *Thé de l'Europe*.

Betonica aquatica, off. *Betonica aquatilis*, DODON. *Betonica aquatica major*, PARK. *Scrophulaire aquatique* ; *Herbe du siege* ; *Bétoine d'eau* ou *aquatique*.

Betonica coronaria, sive *Caryophyllus major flore vario*, J. B. *Æillet*.

BETULA, off. *Betula foliis acuminatis ferratis*, LINN. *Bouleau*.

Betula pedunculis ramosis, LINN. *Aune*.

BEXUGUILLO, & Raiz de oro, HISPANOR. *Ipécacuanha gris*.

BEZOAR bovis. *Pierre qui se trouve dans la vésicule du fiel chez les bœufs*.

BEZOARDICA medicamenta. *Remedes bézoardiques*.

BEZOARDICUS lapis. *Bézoard*.

Bezoardicus lapis fossilis, J. DE LAET. *Lapis bezoar mineralis fossilis*, BOCONE. *Bézoard fossile*.

BIDENS coronâ seminum retrorsum aculeata, foliis trifidis, LINN. *Chanvre aquatique*, ou *Eupatoire femelle bâtarde*.

Bidens zeylanicum flore luteo, lamii folio, *Acmella distum* BREYN. *Bidens urticae folio*, indica lithontriptica, D. HOTTON. *Acmelle*.

BIFOLIUM majus, sive *Ophris major*, quibusdam, J. B. *Bifolium sylvestre vulgare*, PARK. *Double-feuille* ; *Herbe à deux feuilles* ; *Herbe au charpentier* ou *aux coupures*.

BILIS. *La Bile*.

BINGALLE Indorum, A. P. R. S. L. *Cassumuniar & Casmuniar*.

BIPINELLA, sive *Saxifraga minor*, GERARD. *Petite Saxifrage* ; *petite Pimprenelle saxifrage* ; *petite Bouquetine* ou *Boucage* ; *petit Persil de bouc*.

- BISMALVA**, off. & J. B. *Guimauve*.
- BISMUTHUM**, off. *Bismuth*, *demi-métal*.
- BISTORTA** radice magis intortâ, off. C. B. *Bistorta folio minùs rugoso*, J. B. *Bistorte à racines plus tortues*.
- Bistorta vulgaris*, radice minùs intortâ, off. *Bistorta major*, rugosioribus foliis, J. B. *Bistorte à racines moins tortues*.
- BITUMEN** judaicum. *Bitume de Judée*.
- Bitumen liquidum fuscum*, LINN. *Bitumen liquidum crassius obscurè bruncum*, VALLERIUS. *Huile de pétrole*.
- BIXA**, OVIED. *Achiotl*; *Urucu*; *Roucou*.
- BLATTARIA** lutea, J. B. *Blattaria lutea folio longo laciniato*, C. B. & TOURN. *Blattaria Plinii*, GERARD. *Blattaria annua ramosa*, floribus luteis, staminibus purpureis, H. O. *Herbe aux mites*.
- Blattaria spuria spicata rubra*, NONNULLOR. *Salicaire commune*; *Lysimachie rouge*.
- BLITUM** album, offic. *Blitum album majus*, TOURN. *Blitum pulchrum album*, magnum, D. B. *Blette*.
- Blitum maximum*, seu *Amaranthus major*, semine albo, J. B. *Amaranthe*; *Passe-velours*; *Fleur de jalousie*.
- BOLETI** cervi, OFF. *Truffes de cerf*.
- BOLETUS** abiei laricis dictæ, LINN. *Agaric*.
- Boletus cervinus*, off. *Boletus cervi*, J. B. *Truffe de cerf*.
- Boletus esculentus vulgaris*; *Boletus esculentus*, TOURNEF. *Morilles*.
- BOLUS** alba. *Bol blanc*.
- Bolus armena & rubra*. *Bol d'Arménie*.
- BOMBYX**, off. *Ver à soie*, ou *Chenille filant la soie*.
- BON-TSIAPPO**, BRAM; *Colchicum zeylanicum*, flore violæ, odore & colore ephemeræ, HERMAN. *Plante dont la racine est la zédoaire*.
- BONA**, seu *Phaseolus major*, DODON. *Fève de marais*.
- BONENSES** aquæ. *Eaux de Bones* ou *Bonnes*, en Béarn.
- BONONIENSIS** lapis, MONT. *Pierre lumineuse* ou *Phosphore de Bologne*.
- Bononiensis phosphorus*, MONT. *Pierre lumineuse*, ou *Phosphore de Bologne*.
- BONONIENSES** aquæ. *Eaux de Boulogne sur mer*.
- BONUS** Henricus, OFF. *Bon Henri*.
- BORBONIENSES** anselmieneses aquæ. *Eaux de Bourbon-Lanci*, dans le duché de Bourgogne.
- Borboniensis arcimbaldicæ* aquæ. *Eaux de Bourbon-l'Archambaut*, dans le Bourbonnois.

BORRAGO, off. *Borrigo flore cæruleo*, C. B. *Borrigo foliis omnibus alternis, calycibus patentibus*, LINN. *Bourrache*.

BOS. Sous ce nom est désigné un seul & même genre d'animaux : savoir, le taureau, le Bœuf, la vache, le veau, la genisse.

BOS femina aut lactaria. *Vache, femelle du taureau*.

BOS seu Taurus æthiopicus, QUORUMDAM *Rhinoceros*; & par les Portugais *Moine des Indes*.

BOS marinus, NONNULLOR. *Veau marin ou Phocas*.

BOS quadragesimalis dictus, NONNULLOR. *Morue, poisson*.

BOTRYS ambrosioides americana, off. *Botrys ambrosioides mexicana*, C. B. *Botrys du Mexique*.

BOTRYS ambrosioides vulgaris, C. B. *Botrys vulgaire, ou Piment*.

BOUTOUA, BRASILIENSIB. *Pareira-brava; Butua*.

BOVINUS topus. *Balle ou Concrétion assez solide qui se trouve dans l'estomac ou dans les intestins du bœuf*.

BRANCA leonina, seu *Elaphoboscum erraticum*, TABERN. *Panaïs sauvage; petit Panaïs*.

BRANCA ursina, OFFIC. sive *Acanthus*. *Branc-ursine ou Branche-ursine des Italiens; Acanthe*.

BRASSICA alba vulgaris, olitorum. *Brassica alba vel*

viridis, C. B. *Brassica alba vulgaris*, J. B. *Chou blond ou Chou verd*.

Brassica capitata alba olitorum, C. B. *Brassica capitata albida*, DODON. *Chou pommé blanc*.

Brassica capitata rubra olitorum, C. B. *Brassica rubra capitata*, DODON. *Chou pommé rouge*.

Brassica cauliflora, olitorum, C. B. & TOURN. *Brassica multiflora*, J. B. *Brassica florida botrytis*, LOBEL. *Chou-fleur*.

Brassica foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris, LINN. *Roquette des jardins*.

Brassica marina, sive Soldanella, J. B. *Brassica seu Crambe marina antiquorum*, QUORUMD. *Soldanelle; Chou de mer; Chou marin*.

Brassica radice caulescente fusiformi, LINN. *Navet sauvage; Navette*.

Brassica radice caulescente, orbiculari, depressâ, carnosâ, LINN. *Rave mâle ou ronde; Rave ordinaire; vraie Rave*.

Brassica rubra vulgaris, olitorum. *Brassica rubra*, C. B. & TOURN. *Brassica rubra vulgaris*, J. B. *Chou rouge*.

Brâdu, seu Brâdus, GRÆCOR. *Sabine ou Sabinier à feuilles du tamarisc; Sabinier*.

BRITANNICA, GESNER. *Cochlearia ou Herbe aux cuillers*.

Britannica antiquorum vera ;
vel Hydrolapathum ni-
grum Muntingii , vel La-
pathum longifolium ni-
grum palustre , RAII. *Pa-
tience aquatique* , ou *Pa-
relle de marais*.

BRUNELLA , off. Brunella ma-
jor , folio non disfecto ,
C. B. Brunella bracteis cor-
datis , LINN. Brunella fo-
liis dentatis , spica folio
minore , HALLER. *Bru-
nelle*.

BRUSCUS , off. *Houx frêlon* ;
petit Houx ; *Housson* ; *Fra-
gon* ; *Myrte sauvage* ou
épineux ; *Brusc* ; *Buis pi-
quant*.

Βρύον θαλάσσιον , DIOSCORID.
& GALEN. *Coralline*.

BRYONIA alba , off. Bryonia
aspera sive alba , baccis ru-
bris , C. B. Bryonia foliis
palmatis , utrinque callo-
so scabris , LINN. Bryonia
foliis quinquangulis sca-
bris , HALLER. *Bryone* ou
*Vigne blanche à baies rou-
ges* , ou *Couleuvrée*.

Bryonia alba baccis nigris ,
C. B. Bryonia nigra , DO-
DON. *Bryone blanche à
baies noires*.

Bryonia , mechoacana alba ,
C. B. Bryonia alba pemana ,
sive mechoacan , PARK.
*Plante dont la racine est le
méchoacan* ou *rhubarbe
blanche*.

Bryonia nigra baccifera ;
Tamnus baccifera flore
majore albo , TOURNEF.
Bryonia lævis sive nigra

baccifera , C. B. *Sceau de
Notre-Dame* , femelle

Bryonia nigra vulgaris seu ra-
cemosa ; Bryonia lævis ,
sive nigra racemosa , C. B.
Sceau de Notre-Dame , ou
Racine-vierge mâle.

BUBON foliis rhomboïdeo-
ovatis , crenatis , umbellis
numerofissimis , LINN. *Per-
fil de Macédoine* ; *Ache*
ou *Perfil des rochers*.

Bubon foliis rhombeis serratis
glabris , umbellis paucis ,
LINN. *Arbre d'où découle
la gomme-résine nommée
galbanum*.

BUFO , off. Bufo sive Rubeta ,
RAII. *Crapaud*.

BUGLOSSA , off. *Buglose*.
Buglossa sylvestris , BRUNSF.
Vipérine ou *Herbe aux vi-
peres*.

BUGLOSSUM & Buglossa , off.
Buglossum angustifolium
majus , flore caruleo , C. B.
Buglossum floribus longè
spicatis , HALLER. *Bu-
glose*.

Buglossum antarcticum , aliis
Tabacum , MONARD. *Ta-
bac mâle* , ou *vrai Nico-
tiane à larges feuilles*.

Buglossum latifolium , Bor-
rago flore caruleo , C. B.
Bourrache.

Buglossum radice rubrà , sive
Anchusa vulgatior , TOUR-
NEF. Buglossum perenne
minus puniceis floribus ,
H. O. *Orcanette*.

Buglossum sylvestre , LOBEL.
Vipérine ou *Herbe aux vi-
peres*.

BUGULA ,

BUGULA, off. Bugula foliis ovatis, inter flores stipatis, flagellis repens, HALLERII. Bugle ou petite Consoude.

Bugula foliis trifidis, floribus sparsis in alis foliorum, HALLER. Ivette ordinaire.

BULAPATHUM seu Bistorta QUORUMDAM. Bistorte à racines moins tortues.

BULBUS litoralis, fortè Theophrasti, BELLON. Scille rouge; grande Scille; Oignon marin.

BULITHUS. Pierre ou Concrétion solide qui se trouve dans l'estomac ou les intestins du bœuf.

BUNIAS seu Bunium, OFF. Bunias sylvestris, Napus flore luteo, LOBEL. Navet sauvage; Navette.

Bunias sive Napus, LOBEL. Navet cultivé; Naveau; Navet domestique ou commun.

BUNIAM seu Bunias, OFFIC. Navet sauvage; Navette.

BUPHTHALMUM creticum, cotulae facie, flore luteo & albo, BREYN. Buphthalmum caulibus simplicissimis, unifloris, foliis pinnato-multifidis, LINN. Pyrethre, première espèce.

Buphthalmum majus, LONIC. Grande Marguerite; grande Paquerette; Œil de bœuf.

Buphthalmum minus, CORD. Camomille puante; Marouite.

Tome VIII.

Buphthalmum tanacetum minoris foliis, C. B. Buphthalmum caule ramoso, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis serratis, floribus pedunculatis, LINNÆI. Buphthalmum. Œil de bœuf, LOBEL. Buphthalmum floribus nudis, foliis subtus incanis, pinnatis, pinnis argutè serratis, HALLER. Buphthalmum vulgare chrysanthemo congener, CLUS. Œil de bœuf; fausse Camomille jaune.

BUPLEURON folio subrotundo, sive vulgatissimum, C. B. Perce-feuille vivace; Oreille de lièvre.

BUPLEURUM, off. Bupleurum angustifolium, TABERN. Perce-feuille vivace; Oreille de lièvre.

Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum, TOURNEF. Bupleurum involucro universali nullo, foliis perforatis, LINN. Perce-feuille annuelle; vraie Perce-feuille.

BURSA pastoris, OFF. Bursa pastoris major, folio sinuato, C. B. & TOURNEF. Bursa pastoria, J. B. & DODON. Bursa pastoris major, capsulâ cordatâ, foliis laciniatis, MORIS. Tabouret; Bourse; Bourslette ou Mallette à berger.

BURSERIA (quod est nomen insignis botanici, BURSERI.) Simarouba, arbre de l'Amérique.

BUTOMOS *Damocratis*, AN-
GUILL. *Tribule aquatique* ;
Macre ou *Macle* ; *Cor-*
nouelle, *Cornuelle*, *Cor-*
niole ou *Corniche* ; *Châtai-*
gne d'eau, ou *Châtaigne*
cornue ; *Truffe d'eau* ; *Sal-*
igot ou *Echarbot*.

BUTUA, off. *Pareira-brava* ;
Butua.

BUXUS & BUXUM, off. *Buxus*
arborescens, C. B. *Buis*.

BYSSUS *gelatinosus fugax*,
terrestris, LINN. *Mousse*
membraneuse ; *Nostoch des*
Allemands.



C A L

- C**AAPEBA, BRASILIENSIS. Caapeba folio orbiculati & umbilicato levi, PLUM. Plante dont la racine se nomme pareira-brava.
- C**ABUI iba, MARCGRAV. Arbre d'où découle le baume du Pérou.
- C**ABUREIBA, aut Capureiba, seu Balsamum peruvianum, PISON. Arbre d'où découle le baume du Pérou.
- C**ACAHUALD, vulgò Cacao, PISON. Cacao, fruit.
- C**ACAO; off. Cacao Americæ, seu Avellana mexicana, J. B. Cacao, fruit.
- C**ACAO, CLUS. Caraque, arbre qui produit le cacao.
- C**ADEL avenacu, H. M. Arbrisseau qui produit ce qu'on appelle graine du ricin indien, ou Pignon d'Inde, ou Pignon de Barbarie, ou Grains des Tilli ou des Moluques.
- C**ADMIA fornacum, AGRICOL. Tutie.
- C**ÆSALPINA aculeis recurvis, foliolis emarginatis, flamentis lanatis, LINN. Arbre qui donne le bois de Campêche ou de Fernambouc.
- C**AFÉ & Coffe, OFFIC. Le Café.
- C**AJUM, PARK. Acajou.
- C**ALAMBAC, INDORUM. Première espece de bois d'aloës ou d'agallochum, suivant G. BAUHIN.
- C**ALAMBOUR, vel Calambouc, OFFIC. Troisième Espece de bois d'aloës, ou d'agallochum, suivant G. BAUHIN.
- C**ALAMINARIS lapis, OFF. Pierre calaminaire.
- C**ALAMINTHA aquatica, TABERN. Menthe aquatique; Menthe rouge; Baume d'eau à feuilles rondes.
- C**alamintha arvensis, OFF. Calament des champs; Pouliot-Thym.
- C**alamintha humillior, folio rotundiore; TOURNEF. Lierre terrestre; Terrette; Herbe de S. Jean; Gondolle; Rondotte; Rondelle; Rondette.
- C**alamintha magno flore, off. C. B. Calamintha montana, flore magno ex calyce longo, J. B. Calamintha montana præstantior, LOBEL. Calament de montagne.
- C**alamintha montana, LONICER. Herbe à chat, ou au chat; Cataire.
- C**alamintha ocymoides, TABERN. Menthe commune; Baume des jardins; Herbe du cœur.
- C**alamintha pulegii odore, OFF. Calamintha flore minore pulegii odore, sive Nepeta, C. B. TOURN. Calamintha altera, DODON. Calament à odeur de pouliot.

- Calamintha vulgaris**, OFF. *Calamintha vulgaris*, off. Germaniæ, C. B. & TOURNEF. *Calamintha flore magno vulgaris*, J. B. *Calamintha foliis ex ovato acuminatis caule erecto, paniculâ spicatâ terminato*, HALLER. *Calament ordinaire*.
- CALAMITA**, RHASIS. *Aimant*.
- CALAMUS aromaticus**, GERARD. *Calamus aromaticus vulgaris*; multis *Acorum*, J. B. *Le vrai Acorus*.
- Calamus aromaticus verus**, OFF. *Calamus alexandrinus*, C. CELS. *Calamus vrai*.
- Calamus saccharinus radice tenuiore**, HERM. *Calamus aromaticus* GARZ. *Acorus des Indes ou d'Asie*; *Glaieul aromatique d'Asie*.
- Calamus aromaticus**, TABERN. *Roseau d'où l'on tire le sucre*.
- CALCABOTTO**, ITALOR. *Tette-chevre*, ou *Crapaud volant*, oiseau.
- CALCANTHUM**. *Vitriol*.
- CALCARIUS lapis**; *Calcarius* particulis scintillantibus, WALL. *Pierre à chaux*.
- CALCITRAPA**, off. *Calcitraba*, offic. flore purpurascence, VAILLANT. *Calcitraba foliis laxè pinnatis, molli-bus, capitulis ad latera caulis sessilibus*, HALLER. *Chardon étoilé*; *Chausse-trape*.
- Calcitraba**, NONNULL. *Tri-bule commun ou terrestre*; *Herse, croix de Malte ou de Chevalier*; *Saligot terrestre*.
- CALCULI animalium concharum**, WALL. *Perles*.
- CALCULUS testæ concharum**, LINN. *Perle*.
- CALEFACIENTIA medicamentata**. *Remedes échauffants*.
- CALENDULA hortensis**, *Caltha vulgaris*, OFF. *Calendula*, DOD. *Calendula seminibus radii cymbiformibus echinatis, disci bicornibus*, LINN. *Souci de jardin*.
- Calendula sylvestris**, off. *Calendula arvensis*, LOBEL. *Souci sauvage*, ou de vigne.
- CALIDÆ aquæ**. *Eaux thermales ou chaudes*.
- CALLIONYMUS**, *Chamæcistus*, GESNER. *Muguet*; *Lis des vallées*.
- CALTHA arvensis**, C. B. & TOURNEF. *Caltha minima*, J. B. *Souci sauvage*, ou de vigne.
- Caltha vulgaris**, off. *Caltha vulgaris*, flore pallido, C. B. & TOURN. *Caltha flore simplici*, J. B. *Caltha poetarum*, LOBEL. *Souci de jardin*.
- CALTI**, MEXICANIS. *Arbre d'où se tire le bois néphrétique*.
- CALVILÆA**, seu *Passipoma*. *Pommes de calvilles*.
- CALX**. *Chaux*.
- CAMBODIUM**, vel *Cambogium*. *Gomme gutte*.

CAMELINA, off. *Cameline* ;
Sesame d'Allemagne, ou
bâtard.

CAMELUS. *Chameau*.

CAMPANA alba sylvestris,
sive Convolvulus major,
SCHWENCK. *Grand Lise-*
ron ou *Liset*.

CAMPANULA maritima, *seu*
marina, QUORUMD. *Sol-*
danelle; *Chou de mer*; *Chou*
marin.

Campanula radice esculentâ,
flore cæruleo, H. L. B.
Campanula foliis radicali-
bus lanceolato-ovalibus,
caule ramosissimo patulo,
LINN. *Raiponce*; *Campa-*
nule-Raiponce; *petite Rai-*
ponce de carême.

Campanula serpillifolia, C. B.
Campanule à fleurs de ser-
polet.

Campanula sylvestris, TRAGI.
Digitale; *Gants de Notre-*
Dame.

Campanula vulgator, foliis
urticæ, *vel* major & aspe-
rior, C. B. & TOURNEF.
Campanula major & aspe-
rior, folio *urticæ*, J. B.
Campanula foliis radicali-
bus cordatis, calycibus ci-
liatis, LINN. *Gantelée*, ou
Gants de Notre-Dame;
Campanule à feuilles d'or-
tie; *Ortie bleue*.

CAMPHORA, OFFIC. *Cam-*
phre.

CAMPHORATA, off. *Cam-*
phorata hirsuta, C. B.
Camphorata Monspeliën-
sum, J. B. *Camphrée*,
plante.

CAMPHOROSMA foliis hir-
sutis linearibus, LINNÆI.
Camphrée, *plante*.

CANCER, off. *Cancer bra-*
chyurus, manuum digitis
atris, LINN. *Crabe*; *Can-*
cre de mer; *Cancre marin*.

Cancer fluviatilis, off. *Can-*
cer macrourus, rostro su-
prâ ferrato, basi utrimque
dente simplici, LINN. *Ecre-*
visse de rivieres ou de ruis-
seaux.

CANCRI marini maximi api-
cibus chelarum nigricanti-
bus, I. M. S. *Crabe*; *Can-*
cre de mer; *Cancre marin*.

CANDELA, *seu* *Virga cerata*.
Bougie qu'on insere dans
l'urethre.

Candela regia, LOBEL. *Bouil-*
lon blanc; *Molene*; *Bon-*
homme.

CANELLA alba, quorumd.
J. B. *Canella cubana*,
JONST. *Arbre dont l'écorce*
est la canelle blanche.

Canella alba & *Cortex win-*
teranus spurius, OFF. *Ca-*
nelle blanche.

CANELLA malabarica & java-
nenfis, C. B. *Arbre qui*
fournit la canelle en bois.

Canella quæ Courdo, PISON.
Canella zeylanica, C. B.
Arbre dont la seconde écorce
est la canelle.

Canella sylvestris malabarica,
RAII. *Canella arbor syl-*
vestris, MUNT. *L'Arbre*
qui porte la feuille indienne,
ou *malabathrum*.

Canella vulgaris, OFF. *Ca-*
nelle.

- CANICULA fluviatilis, QUORUMDAM. *Loutre.*
- CANINGA, HERNAND. *Arbre dont l'écorce se nomme casse, & qui sent le clou de girofle.*
- CANIRAM, H. M. *Arbre qui porte la noix vomique.*
- CANIS, off. Canis caudâ recurvâ, LINN. *Chien.*
- Canis carcharias, off. Canis carcharias, seu Lamia, GESNER. *Requin; Requien; Requiem; grand Chien de mer ou marin; Poisson à deux cents dents; Lamie ou Poisson anthropophage; Tiburon.*
- Canis caudâ rectâ, longitudine corporis, LINN. Canis fulvus, pilis cinereis intermixtis, BRISSON. Canis sylvestris caudâ rectâ, extremitate albâ, NONNULL. *Renard.*
- Canis caudâ incurvâ, LINN. Canis sylvestris seu nocturnus, QUORUMDAM. *Loup.*
- Canis, sive Canicula fluviatilis, QUORUMDAM. *Loutre.*
- Canis galeus, SALVIAN. *Requin; Requien; Requiem; grand Chien de mer ou marin; Poisson à deux cents dents; Lamie, ou Poisson anthropophage; Tiburon.*
- Canis marinus, NONNULL. *Veau marin, ou Phocas.*
- Canis ponticus seu fluviatilis. *Castor ou Bievre.*
- CANNA mellea, CÆSALP. *Roseau d'où l'on tire le sucre.*

- CANNABINA, aut Bidens cortice folio, indica, lithontriptica, D. HOTTON. *Ac-melle.*
- Cannabina aquatica, sive Eupatorium mas, LOBEL. *Eupatoire d'AVICENNE, ou ordinaire.*
- Cannabina aquatica flore minus pulchro, elatior & magis frequens, J. B. *Chanvre aquatique, ou Eupatoire femelle bâtarde.*
- CANNABIS fructifera, OFF. Cannabis mas, J. B. Cannabis fœcunda, DODON. *Chanvre à fruit.*
- Cannabis florigera, OFFIC. Cannabis femina, J. B. Cannabis sterilis, DODON. *Chanvre à fleur.*
- Cannabis sativa, C. B. Cannabis foliis digitatis, LINN. *Chanvre ou Chenevi.*
- CANNACORUS radice croceâ, TOURN. *Plante dont la racine s'appelle curcuma long; Souchet des Indes; Safran des Indes.*
- CANNELLA peruana, SLOAN. & CATESBY. *Arbre qui donne la cannelle blanche, ou Ecorce de Winter.*
- CANTABRICA, TURNER. *Œillet.*
- CANTARA & Catalongay, G. CAMELLI. *Plante qui donne la fève de S. Ignace.*
- CANTHARIS vulgaris, OFF. Cantharis cœruleo-viridis, thorace teretiusculo, LINN. *Cantharide; Mouche cantharide; Mouche d'Espagne.*

CAPPELLA & Parrus, BELON.

Capella, *seu* Vanellus, ALDROV. & JONST. & WIL-
LUGH. Capella *seu* Capra
cœlestis, QUORUMD. *Vanneau*, oiseau.

CAPENDUA mala *aut* poma.

Pommes de bardin; Pommes de court-pendu ou de capendu.

CAPER montanus, ALBERT.

Chevre des Alpes, nommée ordinairement chamois ou yfard.

CAPHUR, ARAB. *Camphre*.

CAPHURA; officin. *Camphre*.

CAPILLUS Veneris verus; Capillus Veneris monspeliensis, OFFIC. *Capillaire de Montpellier*, ou *vrai Capillaire*.

CAPISTRUM auri. *Le Borax*.

CAPITATINGA; aliis Jacarecatinga acori species, PRISON. *Acorus des Indes* ou *d'Asie*; *Glaïeul aromatique d'Asie*.

CAPNOS, Fumaria, LOBEL. *Fumeterre*, ou *Fiel de terre*.

CAPPARIS, off. Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo, C. B. Capparis retuso folio, LOBEL. Capparis aculeata, LINN. *Caprier*, arbre.

CAPRA, off. Capra domestica, RAI. Capra cornibus carinatis, LINN. *Chevre commune*, domestique, ou *privée*; *Bique*.

Capra alpina, off. Capra alpina, *sive* Rupicapra,

SCHROD. Capra cornibus surrectis uncinatis, LINN. *Chevre des Alpes*, nommée ordinairement chamois ou yfard.

Capra cornibus erectis uncinatis, LINNÆI. *Chevre sauvage du Pérou*, dans l'estomac de laquelle se trouve le bézoard occidental.

Capra cornibus nodosis, in dorsum reclinatis; LINN. *Chevre sauvage*, ou *Bouquetin*, ou *Bouc-estain*, ou *Bouffin*, ou *Bouffine*.

Capra cornibus teretibus rectissimis, longissimis, basi annulatis, LINN. *Gazelle des Indes*, dans le quatrième estomac de laquelle se trouve le vrai bézoard oriental.

Capra *sive* Gazella bezoardica orientalis, off. Capra, Hircus bezardicus, ALDROV. Capra cornibus teretibus rectissimis, longissimis, basi annulatis, LINN. *Chevre* ou *Gazelle du bézoard oriental*.

Capra moschi, ALDROV. Capra mosch, aliis Cervus odoratus, CHARLET. Capra cornibus teretibus, dimidiato-annulatis, arcuatis, LINN. *Chevre d'Afrique*, ou *Gazelle*, ou *Chevre qui donne le musc*.

Capra, *seu* Capella cœlestis, QUORUMD. *Vanneau*.

CAPREOLUS moschi, SCHRODER. *Chevre d'Afrique*, ou *Gazelle*; *Chevre qui donne le musc*.

- CAPRICERVA** occidentalis ,
off. SCHRODER. *Chevre du*
bézoard occidental.
- CAPRICERVUS** americanus
sive occidentalis , NON-
NULL. *Chevre du bézoard*
occidental.
- CAPRIFOLIUM** & *Matrisylva* ,
off. *Caprifolium germani-*
cum , DODON. *Caprifo-*
lium foliis racemosis , HAL-
LER. *Chevre feuille.*
- Caprifolium italicum* , DO-
DON. *Caprifolium floribus*
geminis , *foliis ovatis* , *la-*
nuginosis , *integerrimis* ,
HALLER *Chevre-feuille qui*
se cultive dans les jardins.
- CAPRIMULGUS** , BELON.
Fresaie ; Effraie ou Or-
fraie ; Hibou des clochers ;
petit Chat-huant plombé ;
Chouart ; Lucheran.
- Caprimulgus* , LATINOR.
Tette-chevre ou Crapaud-
volant , oiseau.
- CAPSELLA** , NONNULLOR.
Thlaspi ou Tharaspi des
champs à larges filiques.
- CAPSICUM** Actuarii , *sive ca-*
ninum Zinziber , AVICEN-
NÆ , *sive Piper indicum*
longioribus filiquis , LO-
BEL. *Capsicum filiquis lon-*
gis propendentibus , TOUR-
NEF. *Capsicum annuum* ,
LINN. *Poivre d'Inde , de*
Guinée , ou du Brésil ; Pi-
ment , ou Poivre d'Espa-
gne , ou de Portugal , en
gouffes ; Corail de jardin.
- CAPUREIBA** aut *Cabureiba*.
Arbre d'où découle le baume
du Pérou.

- CAPUT** gallinaceum Belga-
rum , LOBEL. *Sain-foin ;*
gros Sain foin.
- CARABACCIUM** lignum , BA-
GLIVI. *Bois carabacci.*
- CARAGUATA** Brasiliensibus ,
MARCG. *CARAGUATA ter-*
tia , PISON. *Plante qui*
fournit le suc nommé aloës
hépatique.
- CARANNA** , off. MONARD.
Caragne ou Caregne ; Gom-
me de Caragne.
- CARCAPULLI** , ACOSTA. *Ar-*
bre d'où découle la gomme-
gutte.
- CARDAMINE** , GALENI. *Cres-*
son d'eau ou aquatique ;
Cresson de fontaine ou des
ruisseaux.
- CARDAMINDUM** ampliori fo-
lio & majori flore , TOUR-
NEF. *Grande Capucine ;*
grand Cresson des Indes ou
du Pérou.
- Cardamindum minus* & vul-
gare , TOURNEF. *Petite*
Capucine ; petit Cresson
d'Inde.
- CARDAMOMUM** minus , MAT-
TH. *Cardamomum veterum*
Græcorum. *Cardamomum*
simpliciter in officinis dic-
tum , C. B. *Cardamome ,*
fruit de l'Elettari , H. M.
- Cardamomum piperatum* ,
CORDI. *Graine de Paradis ,*
nommée aussi Méléguette &
Maniguette.
- Cardamomum siberiense* ,
P. AMMAN. *Anis de la*
Chine ; Anis de Sibérie ;
Anis étoilé ; Semence de
Badian.

CARDAMUM, off. *Capucine grande; grand Cresson d'Inde, ou du Pérou.*

Cardamum minus, off. *Petite Capucine; petit Cresson d'Inde.*

Cardamum, sive Nasturtium hortenfe, off. *Cresson des jardins; Cresson alénois ou cultivé; Nasitort.*

CARDIACA, off. *Cardiaca lycopus, RUEL. CHABR. Cardiaca foliis trilobatis, HALLER. Agripaume.*

Cardiaca, seu Mentha romana angustifolia, PARK. *Menthe à épi & à feuille étroite; Menthe de Notre-Dame; Menthe romaine.*

Cardiaca medicamenta. *Remedes cordiaux.*

CARDONES, CÆSALP. *Artichauts épineux, ou Cardons.*

CARDUELIS, off. *Chardonneret, oiseau.*

CARDUNCELLUS, qui omnium mensium flos vulgò, NONNULL. *Senecón ou Senesson.*

CARDUUS, sive Scolymus sativus non spinosus, J. B. *Artichaut.*

Carduus acanthus, sive Branca ursina, J. B. *Branc-ursine, ou Branche-ursine des Italiens; Acanthe.*

Carduus benedictus & Carduus sanctus, off. *Carduus benedictus, C. B. Chardon bénit.*

Carduus criocephalus, off. *Carduus capite rotundo, tomentoso, C. B. &*

TOURNEF. *Carduus tomentosus, Corona Fratrum dictus, PARK. & RAIL. Chardon à grosse tête; Pet d'âne des Parisiens.*

Carduus fullonum, OFFIC. *Chardon à bonnetier ou à foulon.*

Carduus inermis, foliis imis ovatis, superioribus ad basim pinnatis, HALLER. *Serrette ou Sarrette.*

Carduus lepusculus, & Carduus volutans rusticorum. *Chardon roland; Chardon à cent têtes; Panicaut.*

Carduus Mariæ; Carduus marianus; Carduus lacteus, off. *Carduus albis maculis notatus vulgaris, C. B. Carduus marianus sive lacteis maculis notatus, J. B. Carduus leucographus, DOD. Spina alba hortenfe, FUSCH. Carduus squamis calycinis, margine apiceque spinosis, LINN. Chardon-Marie; Chardon de Notre-Dame; Artichaut sauvage.*

Carduus sanctus, off. *Carduus sanctus, attractilis, DIOSCOR. CÆSALP. Chardon bénit.*

Carduus stellatus, off. *Carduus stellatus foliis papaveris erratici, C. B. Chardon étoilé, ou Chauffe-trape.*

Carduus tomentosus, acanthi folio vulgaris, TOURNEF. *Carduus leucanthemus, SCHROD. Chardon commun; grand Chardon aux ânes; Artichaut*

*sauvage ou des champs ;
Présure.*

CAREUM, FUSCH. *Carvi.*

CARLINA, off. *Carlina acaulos*, J. B. *Carlina acaulos*, magno flore albo, C. B. *Carlina caule uniflora*, LINN. *Carlina* ou *Charde-ronnette.*

Carlina acaulos gummifera, C. B. *Carlina gommeuse*, ou *Chaméléon blanc.*

CARMINANTIA medicamenta. *Remedes carminatifs.*

CAROPA, OFF. *Carouge* ou *Caroubier.*

CAROLINÆ thermæ. *Eaux de Carlsbad*, en Bohême, ou *Eaux carolines.*

CAROS, J. B. *Carvi.*

CAROTTA lutea vel alba, J. B. *Carotte des jardins.*

CARPIO, OFF. *Carpe*, poisson.

CARPOBALSAMUM. *Le fruit du baumier.*

CARTAMUM sylvestre, CÆSALP. *Chardon bénit des Parisiens.*

CARTHAMUS officin. flore croceo, TOURN. *Carthamus foliis ovatis integris, serrato-aculeatis*, LINN. *Carthame*; *Safran bâtard*, ou *d'Allemagne*; *Graine de perroquet.*

CARUM, LINN. & DODON. *Carvi.*

CARUNFEL, SERAP. *Girofle* ou *Clous de girofle.*

CARVI, off. C. B. *Carvi.*

CARYOPHYLLATA, off. *Caryophyllata vulgaris*, C. B. *Caryophyllata vulgaris*, flore parvo luteo, J. B. Ca-

ryophyllata pinnis paucioribus rhomboïdeis, tubarum fine uncinato, HALLER. *Benoîte*; *Herbe de S. Benoît*; *Galiot*; *Gariot*; *Récife.*

Caryophyllata sylvestris americana; *Caryophyllata virginiana*, albo flore minore, radice inodorâ, HERM. *Benoîte sauvage.*

CARYOPHYLLEA, TRAGI. *Æillet.*

CARYOPHYLLEUS flos aphyllocalaules, vel junceus major, C. B. *Statice*; *Gazon d'Olympe* ou *de montagne*; *Æillet de Paris*; *Herbe à sept tiges.*

CARYOPHYLLI aromatici, OFF. *Girofle* ou *Clous de girofle.*

CARYOPHYLLOIDES. *Ecorce de culilawan.*

CARYOPHYLLUM vel Amomum PLINII. *Baies rondes du caninga*, lesquelles ont une odeur & une saveur de girofle.

CARYOPHYLLUS altilis major, C. B. *Caryophyllus hortensis*, flore pleno (& simplici) rubro, J. B. *Caryophyllus major*, flore vario, J. B. *Caryophyllus multiplex*, LOBEL. *Æillet.*

Caryophyllus aromaticus americanus, lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari, PLUCK. *Arbre qui porte le poivre de la Jamaïque.*

Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo, C. B. *Caryophyllus aromaticus*,

- fructu clavato monopyreno, PLUCK. *Arbre qui porte les clous de girofle.*
- Caryophyllus aromaticus, fructu rotundo, Caryophyllon PLINII, C. B. *Poivre de la Jamaïque; Poivre de Thevet; Amomi; Toutes-épices.*
- Caryophyllus aromaticus Indiae occidentalis, foliis & fructu rotundis, dipylene, PLUCK. *Arbre dont l'écorce qui sent le clou de girofle, se nomme casse.*
- Caryophyllus montanus major flore globoso, C. B. Caryophyllus mediterraneus, GERARD. *Statice; Gazon d'Olympe ou de Montagne; Cillet de Paris; Herbe à sept tiges.*
- Caryophyllus ramosus vel dentatus, J. BODÆI A STAPPEL. Caryophyllus spicatus, INDIS Tshinkapoua, PISON. Caryophyllus regius, VORMII. *Girofle royal, ou Clou de girofle royal.*
- CASAB aldhaira, ARABUM. *Calamus vrai.*
- CASCARILLA. *Cascarille ou Chacril.*
- CASIA alba, THEOPHRASTI. *Lavande mâle; Spic; Aspic; Nard commun.*
- Casia nigra Theophrasti, DALECH. *Romarin; Encensier.*
- CASIAR. *Œufs d'esturgeon salés.*
- CASSAB eldereira, PALAD. Cassab eldarrira, PROSP.
- ALPIN. *Plante de laquelle vient le vrai calamus.*
- CASSIA brasiliensis. *Casse du Brésil.*
- Cassia cinnamomea, H. L. B. *Arbre dont la seconde écorce est la cannelle.*
- Cassia caryophyllata, off. PISON. *Casse qui sent le clou de girofle; c'est une écorce.*
- Cassia fistula alexandrina, C. B. Cassia purgatrix, J. B. Cassia foliolis quinquepinis, ovatis, acuminatis, glabris, petiolatis, LINN. *Arbre dont le fruit, ou la gousse, est la casse solutive.*
- Cassia fistula brasiliensis, C. B. Cassia fistula brasiliensis, flore incarnato, BREYN. *Arbre qui produit la casse du Brésil.*
- Cassia foliolis tripinnibus quadripinnibusque subovatis, LINN. *Arbrisseau dont les follicules sont connues sous le nom de séné.*
- Cassia lignea, off. *Casse en bois; c'est une substance ligneuse.*
- Cassia lignea jamaicensis, cortice acri, candicante, PLUCK. *Arbre dont l'écorce est la cannelle blanche.*
- Cassia solutiva; Cassia nigra, off. Cassia fistula. *Casse solutive.*
- Cassia vulgaris, Calihacha dicta, PISON. Cassia malabarica, BURM. *Arbre qui donne la casse en bois.*
- CASSIANA herba famem stimulare retardans, J. B. *Alaterne, seconde espece.*

CASSIDA palustris vulgarior, flore cæruleo, **TOURNEF.** *Centaurée bleue ; Tertiaire ou Herbe aux fièvres.*

CASSINA, off. C. B. *Alaterne, seconde espece.*

CASSINE vera Floiidanorum, arbuscula baccifera alaterni formæ facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene, **PLUCK.** *Alaterne, seconde espece.*

Cassine vera perquam similis arbusculæ phillyrea foliis antagonists ex provinciâ Carolinensi, **PLUCK.** *Alaterne, troisieme espece.*

CASSUTA, sive *Cuscuta*, J. B. *Cuscute ; Goute de lin ; Herbe infernale.*

Cassuta minor, *Epithymum*, off. *Epithym.*

Cassuta major, off. *Cuscute ; Goute de lin ; Herbe infernale.*

CASSYTA, **TABERN.** *Cuscute ; Goute de lin ; Herbe infernale.*

CASSYTHA, off. *Cuscute ; Goute de lin ; Herbe infernale.*

CASTANEA, off. *Castanea sylvestris* quæ peculiariter *Castanea*, C. B. *Châtaignier.*

Castanea equina, folio multifido, J. B. *Marronnier d'Inde.*

Castanea ferrariensis seu palustris ; *Castanea lacustris*, seu *Cornuta*, **NONNULL.** *Tribule aquatique ; Macre ou Maelc ; Cornouelle,*

Cornuelle, Corniole, ou Corniche ; Châtaigne d'eau ou Châtaigne cornue ; Truffe d'eau ; Saligot ou Echarbot.

Castanea sativa, off. C. B. *Marronnier.*

CASTINIA mala aut poma. *Pommes de châtaignier ou de Martrange.*

CASTOR, off. *Castor, sive Fiber*, **RAH.** *Castor caudâ ovatâ, planâ*, **LINN.** *Castor ou Bievre.*

CASTOREUM *Substance qu'on tire du castor, & qu'on nomme en françois castoreum.*

CATAGMATICA medicamenta. *Remedes catagmatiques, ou contre les fractures.*

CATALONGAY & *Cantara*, **G. CAMELLI.** *Plante qui donne la feve de saint Ignace.*

CATAPASMA. *Catapasme ; on donne ce nom à des poudres odorantes.*

CATAPLASMA. *Cataplasme.*

CATAPUTIA major, off. *Graine de ricin, ou Pignon d'Inde.*

Cataputia minor, off. *Cataputia minor, Lathyrus major hortensis*, **PARK.** *Tithymale à larges feuilles ; Epurge ; Catapuce ordinaire.*

CATARIA major vulgaris, **TOURN.** *Herbe à chat ou au chat ; Cataire.*

CATBALOGAN, **HISPANOR.** *Fève de S. Ignace.*

CATEVALA, H. M. *La Plante qui répand l'aloës hépatique.*

CATHÆRETICA medicamenta. *Remedes cathérétiques ou rongeurs.*

CATHARCTICA medicamenta. *Remedes cathartiques ou purgatifs.*

CATODON fistula in cervice, ARTEDI. *Baleine ordinaire ou grande Baleine.*

Catodon fistula in cervice, Balæna minor, ARTEDI. *Petite Baleine ou Cachalot.*

CATTA gamma. *Gomme-gutte.*

Catta gemu. *Gomme-gutte.*

CATTU-TIRPALI, RHEED. *Poivre long.*

CATUS seu Feles. GESNER. *Chat.*

Catus aquæ seu paludis, QUORUMD. *Loutre.*

Catus zibethicus, SCHROD. *Civette.*

CAUCALIS minor pulchro semine, J. B. *Seseli de Candie.*

CAUDA equina, TABERN. *Grande Préle.*

Cauda muris vulgò, QUORUMD. *Petite Joubarbe; Trique-madame ou Tripe-madame.*

Cauda porcina, Marathrophyllum, NONNULLOR. *Queue de pourceau; Fenouil de porc; Peucedane.*

Cauda vulpina Turcarum, BELLON. *Lilas ou Lilac; Syringa à fleur bleuâtre; Queue de renard des jardins.*

CAUNGA, H. M. *Cachou; Catéchu; Caetchu; Cast-joe; Cate; Khaath; & improprement Terre du Japon.*

CAUSTICA medicamenta. *Remedes caustiques.*

CAUTERIENSES aquæ. *Eaux de Caunteretx, dans le Bigorre.*

CAUTERIUM. *Cautere ou Fongicule.*

CAVIA; Caviar; Caviari. *Œufs d'esturgeon salés.*

CEBUR, ARABUM. *Aloës, suc concret, résineux, gommeux.*

CEDRUS hispanica procerior, fructu maximo nigro, TOURN. *Plante d'où découle l'encens.*

CENTAUREA, off. *Petite Centaurée.*

Centaurea calycibus ferratis, foliis linearibus, infimis dentatis, superioribus integerrimis, LINN. Bleuet ou Bluet; Blavéole; Aubifoin; Péroole; Barbeau; Casse-lunette.

Centaurea calycibus squamatis, foliis radicalibus lyratis, pinnulis oppositis, caulinis amplicaulibus, LINN. Plante dont la racine se nomme béhen blanc.

Centaurea calycibus tubulato-spinosis, sessilibus, foliis linearibus, pinnatifidis, LINN. Chardon étoilé; Chauffe-trape.

Centaurea major. Grande Centaurée; Rhapontic vulgaire.

CENTAURIUM majus, OFF.
Centaurium majus, folio
in plures lacinias diviso,
C. B. Centaurium majus
juglandis folio, J. B.
Grande Centaurée; Rha-
pontic vulgaire.

Centaurium majus sylvestre
germanicum, seu Centau-
roïdes, THAL. *Serrette* ou
Sarrette.

Centaurium minus, officin.
Centaurium flore purpu-
reo, J. B. *Petite Cen-*
taurée.

CENTAUROÏDES, seu Cen-
taurium majus sylvestre
germanicum, THAL. *Ser-*
rette ou *Sarrette.*

Centauroïdes, sive Limne-
sium, CORDI. *Gratiolle;*
Herbe à pauvre homme.

CENTERIA, THEOPHR. *Tou-*
te-saine.

CENTIMORBIA, seu Num-
mularia, J. B. *Nummu-*
laire; Herbe aux écus;
Monnoyere; Herbe à cent
maux; Herbe qui tue les
moutons.

CENTINODIA, off. Centino-
dia, sive Polygonum, J. B.
Centinodia, seu Sangu-
naria, LOBEL. *Renouée;*
Traînasse; Centinode; Cor-
rigiole.

CENTRUM galli, NONNULL.
Orvale; Toute-bonne.

Centrum gallinæ, aut Galli
centrum, RUEL. *Orvale;*
Toute-bonne des prés, ou
sauvage; Sclarée.

CENTUMNODIA, seu Sangu-
naria, LOBEL. *Renouée;*

Traînasse; Centinode; Cor-
rigiole.

CEPA ascalonica & ascalonia,
obsoniorum. Cepa ascalo-
nica, MATTH. Cepa asca-
lonica sive sessilis, J. B.
Echalotte.

Cepa fissilis, *obsoniorum &*
MATTH. *Ciboule.*

Cepa vulgaris candida vel ru-
bra, off. Cepa vulgaris,
floribus & tunicis candidis,
vel purpurascens, C. B.
Cepa (seu Cepe) rotunda
alba vel rubra, J. B. *Oi-*
gnon ordinaire, blanc ou
rouge.

CEPE, sive Cepa rotunda alba
vel rubra, J. B. *Oignon*
ordinaire, blanc ou rouge.

CEPHALICA remedia. *Reme-*
des céphaliques.

CEPULA & Cepa fissilis, OB-
SONIORUM. *Ciboule.*

CERA di Cardo, *Rusticorum*
Apuliæ, FAB. COLUMN.
Larme qui découle de la
Carline gommeuse, ou Cha-
méléon.

CERASA acida & vulgaris.
Cerises ordinaires.

Cerasa carne tenerâ & aquosâ;
Cerasa aquea. *Guignes.*

Cerasa duracina oblonga;
Cerasa crassa, carne durâ;
Cerasa pliniana. *Bigar-*
reaux.

Cerasa hispanica. *Griottes.*

Cerasa nigra. *Cerises noires,*
ou Merises.

Cerasa sativa majora, Agriot-
ta. *Griottes.*

CERASIOLA, CÆSALP.
Bryone ou Vigne blanche à

- baies rouges , ou Couleuvrée.*
- CERASUS fructu aquoso , I. R. H. *Guignier.*
- Cerasus major , fructu magno cordato , RAIL. *Bigarreaudier.*
- Cerasus major ac sylvestris , fructu subdulci nigro colore inficiente , C. B. Cerasus sylvestris fructu nigro , J. B. *Merisier.*
- Cerasus marina Calabris. *Arbousier ; Fraiser en arbre.*
- Cerasus sativa fructu majore , TOURNEF. *Griottier.*
- Cerasus sativa , fructu rotundo , rubro & acido , TOURNEF. *Cerisier.*
- CERATIA agrestis , seu Fabago , GESNER. Ceratia sylvestris , NONNULLOR. *Gainier ; Arbre de Judas ou de Judée ; Arbre d'amour.*
- CERATOCEPHALUS ballotes foliis , *Acmella dictus , A. R. P. Acmelle.*
- Cerato-Cephalus vulgaris tripteris & pentapteris , folio , caule rubente , VAILLANT. *Chanvre aquatique , ou Eupatoire femelle.*
- CERATONIA , LINN. *Carouge ou Caroubier.*
- CERATUM. *Cérat.*
- CERAUNIA filiqua , THEOPHR. *Carouge ou Caroubier.*
- CERBERA. *Ahouai.*
- CERBERUS chymicus , CHYMICOR. *Nitre.*
- CERCIS Theophrasti , NONNULLOR. *Gainier ; Arbre de Judas ou de Judée ; Arbre d'amour.*
- CEREFOLIUM , off. *Cerfeuil.*
- Cerrefolium felinum aut columbinum , nonnull. CORBEI. *Fumeterre ou Fiel de terre.*
- Cerrefolium hispanicum , sive Myrrhis , OFFIC. *Cerfeuil musqué ou anisé ; Cerfeuil d'Espagne ; Cicutaire odorante ; Persil d'âne de Lobel.*
- CEREVISIA. *Biere , liqueur fermentée.*
- CEROPISSUS. *Dropacisme.*
- CERRETA vel Serreta , CASALPIN. *Serrette ou Sarrette.*
- CERVARIA nigra QUORUMD. *Grand Persil de montagne , ou sauvage.*
- CERVI boletus , OFF. *Truffe de cerf.*
- Cervi rubus , seu Rubus cervinus , QUORUMD. *Framboisier ; Ronce du mont Ida.*
- CERVICARIA maxima foliis urticæ majoris , caule sæpè tricubitali , floribus magnis cæruleis , quandoque etiam albis , THAL. *Gantelée , ou Gants de Notre-Dame ; Campanule à fleur d'ortie ; Ortie bleue.*
- CERVUS , LATINOR. Cervus cornibus ramosis teretibus incurvatis , LINN. *Le Cerf.*
- Cervus cornibus acaulibus palmatis , LINNÆI. *Elan , Elant , Elend ou Ellend ; grand quadrupede.*
- Cervus fugitivus. *Mercure ; Vif-argent.*

Cervus minor americanus bezoarticus, DALE. *Chevre du bézoard occidental.*

Cervus odoratus, QUORUMD. *Chevre d'Afrique, ou Gazelle, chevre qui donne le musc.*

Cervus palmatus, ALDROV.
Cervus mirabilis, JONST.
Cervus rangifer, RAI.
Cervus cornuum summitatibus omnibus palmatis, . . . Rangifer, BRISSON.
Cervus cornibus ramosis teretibus, summitatibus palmatis, LINN. *Renne; & en vieux françois, Rangier ou Ranglier.*

Cervus volans, ALDROV.
Cerf volant; grand Escarbot; Scarabée cornu.

CESTIANA mala aut poma.
Pommes de bardin; Pommes de courtpendu ou de capendu.

CETE, CLUSII. *Baleine ordinaire, ou grande Baleine.*

Cete, JONSTON. *Petite Baleine ou Cachalot.*

CETERACH, off. C. B. *Cété-rach.*

CETUS, off. Cetus dentatus, CHARLET. *Petite Baleine, ou Cachalot.*

Cetus marinus Narwal dictus. *Narhwal, ou Licorne de mer.*

CHAA herba in Japoniâ, C. B. *Arbrisseau dont les feuilles sont connues sous le nom de thé.*

CHÆREFOLIUM, off. *Cerfeuil.*

CHÆROPHYLLON, off. *Cerfeuil.*

CHÆROPHYLLUM, off. *Chærophyllum sativum, C. B. Chærophyllum feminibus lævibus, umbellis ad nodos sessilibus, BOEHM. Cerfeuil.*

CHAMÆACTE, DIOSC. *Ieble.*

CHAMÆCISSUS, sive Hedera terrestris, J. B. *Lierre terrestre; Terrette; Herbe de S. Jean; Gondole; Rondotte; Rondelle; Rondette.*

CHAMÆCISTUS vulgaris, flore luteo, C. B. *Hyssope des Gariques; Herbe d'or; Hé-lianthème.*

CHAMÆCITINUS, Callionymus, GESNER. *Muguet; Lis des vallées.*

CHAMÆCLEMA, CORDI. Chamæclema caulibus procumbentibus, radicatis, foliis cordiformibus, petiolatis, HALLER. *Lierre terrestre; Terrette; Herbe de S. Jean; Gondole; Rondotte; Rondelle; Rondette.*

CHAMÆCYPARISSUS, officin. *Aurône femelle; Santoline; petit Cyprès; Garderobe.*

CHAMÆDAPHNE, sive Laurus pusilla, LOBEL. *Lauréole, femelle; Bois gentil; Thymelée femelle des pays froids.*

Chamædaphne altera Dioscoridis, BRUNSF. *Pervenche commune à feuilles étroites; petite Pervenche; petit Pucelage; Violette des sorciers.*

CHAMÆDRYS,

CHAMÆDRYS, *off.* Chamædrys minor repens, C. B. Chamædrys procumbens, foliis solidis ovatis, rotundè crenatis, HALLER. *Petit Chêne ; Chénette ; Germandrée.*

Chamædrys fruticosa sylvestris, melissæ folio, Tourn. *Chamaras ou faux Scordium ; Sauge des bois ou sauvage.*

Chamædrys maritima incana, frutescens, foliis lanceolatis, Tourn. *Vrai Marum.*

Chamædrys palustris canescens, *feu Scordium*, *off.* Chamædrys palustris alium redolens, MORIS. Chamædrys foliis ellipticis, serratis, mollibus, verticillis inter folia paucifloris, HALLER. *Chamaras ou vrai Scordium ; Germandrée d'eau ou aquatique.*

Chamædrys spuria major angustifolia, C. B. Chamædrys spuria angustifolia, J. B. Chamædrys vulgaris mas, FUSCH. Chamædrys falsa insipida, floribus cæruleis, GESNER. *Véronique des prés, ou Germandrée bâtarde.*

Chamædrys spuria minor rotundifolia, C. B. Chamædrys spuria latifolia, J. B. Chamædrys sylvestris, GERARD & RAIL. Chamædrys sylvestris, PARK. *Véronique des bois, ou des haies.*

Tome VIII.

CHAMÆLEA, *off.* Chamælea germanica, DODON *Lauréole femelle ; Bois gentil ; Thymélée femelle des pays froids.*

Chamælea tricoccus, C. B. *Camélée, ou Chamélée ; Garoupe ; Olivier nain ou bâtard.*

CHAMÆLÆAGNUS, DODON. *Myrte du Brabant ; Myrte bâtard des pays froids ; Piment royal ; Galé.*

CHAMÆLEO albus, apulus, purpureo flore gummifer, FAB COLUMN. *Carline gommeuse.*

CHAMÆLEON albus, *OFF. & MATTH.* *Carline ou Chardeyronnette.*

Chamæleon albus, qui & *Ixia* PLIN *Carline gommeuse, ou Chamaléon blanc.*

CHAMÆLEUCE, PLINII. *Tussilage ; Pas d'âne.*

CHAMÆLINUM CLUSII, flore albo, *sive* Linum sylvestre catharticum, PARK. *Lin sauvage purgatif.*

CHAMÆMELON aureum, FUSCH *Œil de bœuf ; fausse Camomille jaune.*

CHAMÆMELUM canariense, ceratophyllum fruticosum, glauco folio crassiore, sapore fervido, *Magala* ab incolis nominatum, MORIS. *Pyrethre, seconde espece.*

CHAMÆMELUM foetidum, *off.* **CHAMÆMELUM** foliis penè glabris, pinnis pinnatis, pinnulis latiusculis, HALLER. *Camomille puante ; Maroute.*

R

Chamæmelum nobile, flore multiplici, C. B. *Camomille romaine à fleurs doubles.*

Chamæmelum odoratum, vel romanum, vel nobile, off. Chamæmelum nobile, sive Leucanthemum odoratius, C. B. Chamæmelum odoratissimum repens, flore simplici, J. B. *Camomille romaine.*

Chamæmelum specioso flore, radice longâ, fervidâ, D. SHAW. *Pyrethre, premiere espece.*

Chamæmelum vulgare, off. Chamæmelum vulgare, Leucanthemum DIOSCORIDIS, C. B. Chamæmelum vulgare amarum, J. B. Chamæmelum parthenii tertia species, BRUNF. *Camomille ordinaire.*

CHAMÆMYRSINE. *Airelle; Myrille; Raisin de bois; Bluets; Morets; Mûres de ronces.*

CHAMÆNERION latifolium vulgare, Tourn. *Herbe de S. Antoine.*

CHAMÆPITYS lutea vulgaris, off. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido, C. B. & Tourn. Chamæpitys vulgaris odorata, flore luteo, J. B. Chamæpitys mas *Dioscoridis*, LOBEL. *Ivette ordinaire.*

Chamæpitys moschata, foliis ferratis, an prima *Dioscoridis*, C. B. Chamæpitys, sive Iva moschata Monspeliensium, J. B. Chamæpitys

spuria prior, sive Anthyllis altera, DODON. *Ivette musquée.*

CHAMOMILLA, off. *Camomille ordinaire.*

Chamomilla romana odorata, off. *Camomille romaine.*

CHASERADARVA, seu Chaulengian, AVICENN. *Petit Galanga; Galanga de la Chine; Souchet babylonique.*

CHAULENGIAN & Chasera-darva, AVICENN. *Petit Galanga; Galanga de la Chine; Souchet babylonique.*

CHEIRANTHUS foliis lanceolatis, acutis, glabris, LINN. Cheiranthus foliis ellipticis, glabris, integerrimis, HALLER. *Giroflier jaune; Violier jaune.*

CHEIRI, offic. *Giroflier; Violier jaune.*

CHELÆ cancrorum. *Pinces du crabe, ou Pattes d'écrevisses.*

CHELIDONIA major, OFFIC. *Grande Chelidoine; Eclairre; Felougne.*

Chelidonia rotundifolia minor, C. B. *Petite Chelidoine; petite Scrophulaire.*

CHELIDONIUM majus, off. Chelidonium majus vulgare, C. B. Chelidonium pedunculis multifloris, LINN. Chelidonium lobis subrotundis, HALLERII. *Grande Chelidoine; Eclairre; Felougne.*

Chelidonium minus, OFFIC.
Petite Chélidoine, ou *petite Scrophulaire*.
CHENE, ARAB. *Galbanum*,
concret gommeux-résineux.
CHENOPODIUM ambrosioides
folio sinuato, TOURNEF.
Chenopodium foliis oblon-
gis dentato-sinuatis, *racem-*
is nudis multifidis, LINN.
Botrys vulgaire, ou *Pi-*
ment.
Chenopodium ambrosioides
mexicanum, TOURNEF.
Chenopodium suave olens,
foliis longioribus mexica-
num, RUPP. *Botrys du*
Mexique, ou *Ambroisie*.
Chenopodium foetidum, I. R.
H. Chenopodium foliis in-
tegerrimis rhombeo-ovatis,
 LINN. *Chenopodium fœ-*
tidum, *foliis farinosis*,
glaucis obtusè rhomboï-
deis, HALLER. *Arroche*
puante.
Chenopodium folio triangu-
lo, TOURNEF. *Chenopo-*
dium foliis triangulari-fa-
gittatis, *integerrimis*, LIN-
 NÆI. *Bon Henri*.
CHERMÈS, off. *Kermès*;
Graine de kermès; *Graine*
d'écarlate; *Vermillon*; *Ker-*
mès animal.
CHERSYDRUS, sive *Enhydri-*
minor, NONNULLOR. *Ser-*
pent à collier.
CHERVA major, OFF. *Graine*
de ricin, ou *Pignon d'Inde*.
CHERVILLUM, NONNULLOR.
Chervi ou *Girole*.
CHIAPÆ piper, RHEDI.
Poivre de la Jamaïque;

Poivre de Thevet; *Amo-*
mi; *Toutes épices*.
CHIBUR, ARABUM. *Soufre*
citrin.
CHILLI Indiæ orientalis, seu
Zingiber femina, HER-
 NAND. *Plante dont la ra-*
cine est le gingembre.
CHINA, offic. *Squine*, *ra-*
cine.
China occidentalis, off. *China*
spuria nodosa, C. B. *Squine*
d'Occident.
China orientalis, seu *Smilax*
aspera chinensis, *Lam-*
patam dicta, HERMAN.
Plante dont la racine se
nomme squine.
CHINA-CHINA falsa, DALE.
Cascarille ou *Chacril*.
China Chinæ, RAIL. *Arbre*
dont l'écorce est le quin-
quina.
CHOCOLATA. *Chocolat*.
CHOLAGOGA medicamenta.
Remedes cholagogues.
CHORACA Cingalensibus dic-
ta, HERMAN. *Arbre d'où*
découle la gomme gutte.
CHRITOPHORIANA DOD. &
 CLUS. *Christophoriana vul-*
garis nostras & ramosa,
 TOURN. *Herbe de saint*
Christophe, *différente peut-*
être de la suivante.
Christophoriana americana
procerior & longius spi-
cata, H. E. *Herbe de saint*
Christophe.
CHRYSAETOS, ALDROV. *Ai-*
gle royal.
CHRYSANTHEMUM & *Caltha*
poëtarum, LOBEL. *Souci*
de jardin.

Chrysanthemum QUORUMD.

Chysanthemum perenne ,
brevioribus & incanis fo-
liis , tenaceti instar alatis ,
H. O. *Œil de bœuf ; fausse*
Camomille jaune.

Chrysanthemum alpinum &
scherianum jacobææ affine,
J. B. Chrysanthemum al-
pinum incanum , foliis
abrotani multifidis , C. B.
Achillée.

Chrysanthemum bidens zey-
lanicum *Acmella* dictum ,
BREYN. Chrysanthemum
bidens , seu Bidens zeyla-
nicum , flore luteo , lamii
folio , *Acmella* dictum ,
BREYN *Acmelle.*

Chrysanthemum foliis am-
plexicaulibus , supernè la-
ciniatis , infernè dentato-
ferratis , LINN. *Grande*
Marguerite ; grande Pa-
querette ; Œil de bœuf.

Chrysanthemum fruticosum ,
foliis linearibus , dentato-
trifidis , LINN. *Pyrethre ,*
seconde espece.

Chrysanthemum peruvianum ,
sive Flos solis , P A R C K.
Chrysanthemum indicum
maximum annuum , non
ramosum , H. O. Chry-
santhemum indicum , flore
& semine maximis , an-
nuum , PLUCK. *Soleil.*

CHRYSIGENUM malum.
Orange.

CHRISOCOLLA , GRÆC. *Le*
Borax.

CHRYSOLACHANUM *Plinii.*
RUEL. *Lampfane ; Herbe*
aux mammelles.

CHRY SOPUM. Gomme-gutté.

CHRY SOS PLENIUM, TA-
BERN. Chrysofplenium fo-
liis amplioribus auricula-
tis , TOURN. Chrysofple-
nium foliis alternis , LINN.
Saxifrage dorée , ou Hépa-
tique dorée.

CICATRISANTIA medicamen-
ta. *Remedes cicatrisants.*

CICER arietinum , TRAGI.
Pois commun des jardins ;
petit pois cultivé.

Cicer pedunculis bifloris , fo-
liolis integerrimis , stipulis
indivisis , LINN. *Petite Len-*
tille.

Cicer rubrum , off. Cicer flo-
ribus & seminibus ex pur-
purâ rubescentibus , C. B.
Pois ciches rouges , ou Pois
bécus.

Cicer sativum , sive arietinum
nigrum , rubrum vel al-
bum , off. Cicer sativum
flore candido , C. B. &
TOURN. Cicer arietinum ,
J. B. Cicer foliis ferratis ,
LINN. *Pois ciches à fleurs*
blanches.

Cicer sativum , sive Mochus ,
DODON. Cicer pistillorum
germinibus undato-plica-
tis , LINN. *Orobe ; Eris ou*
Eres ; Pois de pigeon.

CICHORIUM angusti-fo-
lium , sive Endivia vulga-
ris , TOURN. *Chicorée à*
feuilles étroites , ou petite
Endive.

Cichorium caule simplici , fo-
liis integris crenatis , LINN.
Chicorée sauvage , ou En-
dive commune.

Cichorium crispum, TOURNEF. *Chicorée frisée*, ou *Endive frisée*.

Cichorium sylvestre *sive officinarum*, C. B. **Cichorium** caule simplici, foliis dentato-sinuatis, LINN. *Chicorée sauvage*.

CICILIANA, aliis *Siciliana*, vel *Androsæmon*, J. B. *Toute saine*.

CICLA & Sicla, OFF. *Bette blanche*, ou *Potrée blanche*.

CICONIA, off. *Ciconia alba*, WILLUGB. *Cicogne blanche* ou *commune*.

CICUTA major, off. *Cicuta*, C. B. *Cicuta major vulgaris*, PARK. *Cicuta veia*, GESN. *Ciguë*.

Cicuta minor, offic. *Cicuta minor petroselino similis*, C. B. *Petite Ciguë*.

CICUTARIA apii folio, J. B. *Cicutaria fatua*, LOBEL. *Petite Ciguë*.

Cicutaria odorata, C. B. *Cerfeuil musqué* ou *anisé*; *Cerfeuil d'Espagne*; *Cicutaire odorante*; *Perfil d'âne de Lobel*.

CIDROMELA, LOBEL. *Citronnier*.

CIMEX, off. *Cimex domesticus*, MOUFF. *Cimex apterus*, LINN. *Cimex lectuarius*, *sive lectorum*, NONNULL. *Punaise domestique* ou *commune*.

CIMICES domestici *impenes*, MERRIAN. *Cimices lectuarii*, MATTH. *Cimices qui in cubilibus nascuntur*,

NONNULL. *Punaises domestiques* ou *communes*.

CINARA hortiensis, off. *Cinara hortensis* foliis non aculeatis, C. B. *Artichaut*.

Cinara spinosa *cujus pediculi esitantur*, C. B. *Artichauts épineux*, ou *Cardons*.

CINCHONA, LINN. *Quinaquina*; *Poudre de la comtesse*; *Poudre des peres*; *Poudre du cardinal de Lugo*; *Ecorce du Pérou*.

CINGULARIA, off. *Mousse rampante à massue*; *Mousse des bois*; *Pied ou Paite de loup*.

CINIS clavellatus. *Cendre gravelée*.

CINNAMOMUM, *sive Canella vulgaris*, OFF. *Canelle*.

Cinnamomum, *seu Canella malabarica & javanensis*, C. B. *Arbre qui fournit la canelle en bois*.

Cinnamomum, *sive Canella zeylanica*, C. B. *Cinnamomum foliis latis, ovatis, frugiferum*, BURMAN. *Arbre dont la seconde écorce est la canelle*.

CIRCÆA, LOBEL. *Morelle*; *Douce-amère*.

Circæa lutetiana, LOBEL. *Herbe de S. Etienne*, ou *Herbe enchanteresse*.

CIRSIIUM italicum, FUSCH. *Buglose*.

CISSAMPELOS foliis peltatis, cordatis, emarginatis, LINNÆI. *Plante dont la racine se nomme pareira-brava*.

Cissampelos multis, *sive Convolvulus minor*, C. B. *Petit*

- Liseron* ou *Liset* ; *Campanette* ou *Clochette* ; *Vrillée commune*.
- CISSION. *Dompte-venin*.
- CISSOPHYLLON. *Dompte-venin*.
- CISTUS humilis palustris, hederæ folio, perfoliata nostras, PLUCH. *Parnassia* ; *Hépatique blanche*.
- Cistus ladanifera cretica, flore purpureo, TOURN. *Arbrisseau duquel découle le labdanum*.
- Cistus ladanifera orientalis, flore purpureo majore, TOURN. (Cor. inst.) *Arbrisseau qui croît dans le Pont, & d'où découle aussi du labdanum*.
- CITAVANACU, sive Avana-coc, H. M. *Arbre qui donne la graine de ricin ou Pignon d'Inde*.
- CITRAGO, seu Citronella, OFF. *Mélisse cultivée, ou des jardins* ; *Mélisse citronnée* ; *Herbe de citron* ; *Citronnade* ou *Citronnelle* ; *Poncirade* ; *Piment des ruches* ou *des mouches à miel*.
- CITRANGULUM malum. *Orange*.
- CITREUM vulgare, TOURN. *Citronnier*.
- CITRULLUS & Anguria, off. Citrullus folio colocynthis secto, semine nigro, quibusdam Anguria, J. B. *Citrouille*.
- CITRUS petiolis alatis, LINN. *Orange à fruit aigre, ou Bigarrade*.

- Citrus petiolis linearibus, LINN. *Citronnier*.
- CLAVILÆ echinorum lapideæ, WALLER. *Pierre de Judée*.
- CLEMATIS baccifera glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio, PLUM. & SLOANE. *Plante dont la racine se nomme pareira-brava*.
- Clematis daphnoïdes major, C. B. Clematis daphnoïdes major, flore cæruleo & albo, TOURNEF. *Grande Pervenche* ; *Pervenche à larges feuilles* ; *grand Pucelage*.
- Clematis daphnoïdes minor, flore cæruleo vel candido, C. B. Clematis daphnoïdes minor, flore cæruleo, purpureo, violaceo & albo, simplici ac pleno, J. B. *Pervenche commune à feuilles étroites* ; *petite Pervenche* ; *petit Pucelage* ; *Violette des sorciers*.
- Clematis passionis, sive Granadillæ affinis, DALE. *Plante dont la racine est nommée contrayerva*.
- CLEMATITIS, off. Clematitis sylvestris latifolia, C. B. Clematitis foliis pinnatis, foliolis cordatis, inæqualiter inciso-crenatis, LINN. *Clématite* ; *Herbe aux gueux* ; *Barbe à Dieu* ; *Viorne des gens la campagne*.
- Clematitis indica spinosa foliis luteis, C. B. *Arbre d'où on tire le bois de couleuvre*.

CLINOPODIUM, *quibusdam*,
Mastichina Gallorum, J. B.
Marum mastich.

Clinopodium montis sancti
Juliani, CÆSALP. *Sar-*
riette vivace, ou *Herbe de*
S. Julien.

CLUPEA, *seu Alofa*, BELON.
Clupea apice maxillæ su-
perioris bifido, maculis
nigris utrinque, ARTEDI.
Alose, *poisson.*

Clupea maxillâ inferiore lon-
giore, maculis nigris ca-
rens, ARTEDI. *Hareng.*

CLUSIA foliis lanceolatis acu-
tis integerrimis petiolatis,
LINN. *Arbre dont l'écorce se*
nomme cascarille ou chactil.

CLYMENUM Italarum, GE-
RARD. *Toute-saine.*

Clymenum mas, GESNER.
Grande Scrophulaire com-
mune.

Clymenum minus, DALE-
CAMP. *Petite Ortie puante.*

CLYSTER. *Lavement; Cly-*
stere.

CNICUS attractilis lutea dicta,
H. L. B. & TOURN. *Char-*
don bénit des Parisiens.

Cnicus sativus, *seu Cartha-*
mus, off. C. B. *Carthame;*
Safran bâtard ou *d'Alle-*
magne; Graine de perro-
quet.

Cnicus sylvestris hirsutior,
sive Carduus benedictus,
C. B. Cnicus caule diffuso,
foliis dentato-sinuatis, LIN-
NÆI. *Chardon bénit.*

CNIPOLOGUS, BELON. *Ho-*
chequeue commun; Lavan-
diere.

COARTHI, MEXICANIS. *Ar-*
bre d'où se tire le bois né-
phrétique.

COATI caudâ brevi, KLEIN.
Blaireau ou *Blereau; Tais-*
son ou *Tesson; Grisard;*
Bédouault, ou *Bédouau*,
ou *Bédou.*

COATLI, *aut Calti*, *aut*
Coarthi, MEXICANIS;
Aqueus serpens, HER-
NAND *Arbre qui donne le*
bois néphrétique.

COCCI orientales, TABERN.
Coques du Levant.

COCCINELLA, offic. *Coche-*
nille.

COCCULÆ, off. *Coques du*
Levant.

COCCULI indici aromatici,
M. R. S. L. *Poivre de la*
Jamaïque; Poivre de The-
vet; Amomi; Toutes-
épices.

COCCUM baphicum; Cóc-
cum infectorium, OFFIC.
Kermès; Graine de ker-
mès; Graine d'écarlate;
Vermillon; Kermès ani-
mal.

COCCUS querci-ilicis, LINN.
Kermès; Graine de ker-
mès; Graine d'écarlate;
Vermillon; Kermès ani-
mal.

COCHINEAL, A. P. L. *Co-*
chenille.

COCHINILLA, offic. *Cochi-*
nilla, Hispanis, BREYN.
Cochenille.

COCHINILLE, *sive Fici in-*
dici grana, C. B. *Cochenille.*

COCHLEA, *seu Limax ter-*
restris, off. *Cochlea cinerea*

- maxima, edulis, cujus os operculo crasso, velut gypseo, per hyemem clauditur, LISTER. Cochlea terrestris gypso observata, ALDROV. Cochlea pomatia edulis, GESNER. Cochlea testa ovata quinque spirarum, pomatia dicta, LINN. Cochlea domiporta vulgarior, NONNULL. *Limaçon; Colimaçon ordinaire des jardins; Escargot commun; Limas à coquille.*
- Cochlea cœlata, ALDROV. & JONST. & GESN. & RONDEL. Cochlea cœlata antonomastice dicta, BONANN. Cochlea trochiformis, striata, rugosa, papillosa, LONG. Cochlea marina umbilicata, NONNULL. *Nombril marin; Ombrilic marin; Nombril ou Feve de mer; Limaçon de mer.*
- COCHLEARIA, off. Cochlearia folio subrotundo, C. B. Cochlearia major batavia, subrotundo folio, MORIS. Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulibus oblongis sinuatis, LINN. *Cochléaria ou Herbe aux cuillers.*
- CODAGA-PALA, H. M. *Codaga pala, ou Cropal.*
- CODDAM-PULLI, H. M. *Arbre d'où découle la gomme gutte.*
- CÆANOETHUS spina, THEOPHR. *Grofeiller blanc épineux.*
- CÆLIFOLIUM Paracelsitarum. *Mousse membraneuse; Nesch des Allemands.*
- CÆRULEUM fossile, sive Azutum, MERRIAN. *Pierre d'Arménie.*
- CÆRULEUM nativum, SCHW. *Pierre d'azur.*
- CÆRULEUS lapis, MATTH. *Pierre d'azur.*
- COFFEE, off. *Le Café.*
- COLCHICUM vulgare, off. Colchicum commune, C. B. Colchicum anglicum purpureum & anglicum album, PARK & GERARD. Colchicum foliis planis resectis, LINN. *Colchique; Tue-chien; Mort au chien.*
- Colchicum radice siccata albâ, C. B. Colchicum minus malignum, sive Hermodactylus, OFFIC. *Plante dont la racine se nomme hermodacte.*
- Colchicum zeylanicum flore violæ, odore & colore ephemeris, Bontsiappo, HERMAN. *Plante dont la racine est la zédoaire.*
- COLLYRIA. Collyres, médicaments pour les maladies des yeux.
- COLOCYNTHIS fructu rotundo minor, C. B. *Coloquinthe.*
- COLUBER aquaticus, vel stagnorum incola, NONNULL. *Serpent à collier.*
- COLUBRINA & Dracunculus major, BRUNSF. *Bistorte à racines moins tortues.*
- Colubrina virginea, OFFIC. *Serpentaire de Virginie; Vipérine de Virginie.*
- COLUBRINI ligni tertium genus in Malabar, vasta

arboris magnitudine, ACOSTÆ. *Arbre qui porte la noix vomique.*

COLUBRINUM lignum. *Bois de couleuvre.*

Colubrinum lignum, CLUSII; *Pao de cobra* dictum, fortè tertium ACOSTÆ. *Arbre qui donne la noix vomique.*

COLUMBA, offic. Columba sive Columbus, I. M. Columba domestica livia, CHARLET. Columba cærulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante, LINN. *Pignon ordinaire ou commun.*

COLUMBINA, QUORUM D. *Verveine.*

COLUTEA lutea sive tertia, DODON. *Œil de bœuf; fausse Camomille jaune.*

Colutea vesicaria, C. B. Colutea foliis obversè cordatis, caule arboreo, LINN. *Baguenaudier, ou Séné bâtard.*

COMA hirci purpurea, sive Barba hirci, NONNULLOR. *Sercifis; Cercifis; Salsifis; Sarsifis blanc commun des jardins ou d'Italie.*

COMARUS Theophrasti, J. B. *Arbousier; Fraïsier en arbre.*

CONCHA margaritifera, BELLON. Concha mater unionum, RONDEL. Concha mater unionum dicta, aut margaritifera, BONAN. Concha margaritifera plerisque, *Berberis antiquis Indis* dicta, LISTER. Concha

valvis æqualibus, inæqualiter, mediocriter, vel leviter umbonata, LANG. Concha quæ margaritas fert, QUORUM D. *Nacre de perle; Mere de perle; Mereperle; Huître à l'écaille nacrée.*

Concha satis nota in cœnis, ostrea Latinis dicta, non ostreum, BONANN. Concha testâ subrotundâ, rugosâ, substriatâ, valvis inæqualibus, cardine oblitterato, LINN. *Huître.*

Concha soleniformis lævis, LANG. *Moule ou Moucle de mer.*

Concha testâ oblongâ levi subviolaceâ, LINN. *Moule ou Moucle de mer.*

Concha venerca, NONNULLOR. *Nombril marin; Omblie marin; Nombril ou Feve de mer; Limaçon de mer.*

CONDER, ARABUM. *Oliban ou Encens.*

CONDITA. *Condits.*

CONFECTIONES. *Confections.*

CONIUM maculatum, seu Conium seminibus striatis, LINN. *Ciguë.*

CONNA, H. M. *Arbre dont le fruit ou la gouffe est la casse solutive.*

CONSOLIDA aurea, TABERN. *Verge d'or à feuilles étroites; petite Verge dorée.*

Consolida major. *Grande Consoude.*

Consolida media, offic. Consolida media pratensis

- cærulea*, C. B. *Bugle* ou *petite Consoude*.
- Consolida media vulnerariorum*, LOBEL. *Grande Marguerite* ; *grande Paquerette* ; *Œil de bœuf*.
- Consolida minor*. *Brunelle*.
- Consolida minor*, HERBARIOR. *Petite Marguerite* ; *petite Paquerette*.
- Consolida rubra*, TABERN. *Tormentille*.
- Consolida sarracenica major*, L. H. *Verge d'or à larges feuilles* ; *grande Verge dorée*.
- CONTRAYERVA & Drakena, off. *Contrayerva*, HISPANORUM. *Contrayerva*.
- CONVALLARIA foliis alternis, pedunculis axillaribus unifloris, LINN. *Sceau de Salomon* ; *Signet* ; *Genouillette*.
- Convallaria scapo nudo*, LINNÆI. *Muguet* ; *Lis des vallées*.
- CONVOLVULUS americanus *jalapium* dictus, RAII. *Plante dont la racine est le jalap*.
- Convolvulus americanus*, *mechoacan* dictus, RAII & TOURN. *Plante dont la racine est le méchoacan*, ou *Rhubarbe blanche*.
- Convolvulus catharticus americanus*, sive *Scammonia americana*. *Liane à médecine*, de Minguet.
- Convolvulus indicus alatus maximus*, foliis ibisco nonnihil similibus, angulosis, *turbith officinarum*.

- Convolvulus zeylanicus alatus maximus*, HERM.
- Convolvulus foliis cordatis angulatis*, caule membranoso-quadrangulati, LINNÆI. *Plante dont la racine est le turbith*.
- Convolvulus major albus*, C. B. *Convolvulus major*, sive *campana alba sylvestris*, SCHWENCK. *Convolvulus foliis sagittatis*, posticè truncatis, LINNÆI. *Grand Liseron* ou *Liset*.
- Convolvulus maritimus nostras rotundi-folius*, MOR.
- Convolvulus seu Volubilis marinus*, QUORUMD. *Soldanelle* ; *Chou de mer* ; *Chou marin*.
- Convolvulus minor arvensis*, C. B. *Convolvulus minor*, seu *Helxine*, *cissampelos multis*, C. *Convolvulus foliis sagittatis utrimque arctis*, LINN. *Petit Liseron* ou *Liset* ; *Campanette* ou *Clochette* ; *Vrillée commune*.
- Convolvulus perennis heteroclitus*, floribus herbaceis, capsulis foliaceis, strobili instar, MORIS. *Houblon*.
- Convolvulus*, *scammonia monspeliaca* dictus, NONNULLOR. *Scammonée de Montpellier* ; *Apocyn à larges feuilles*.
- Convolvulus syriacus* & *Scammonia syriaca*, MORIS.
- Convolvulus foliis sagittatis posticè truncatis*, pedunculis ramosis bifloris,

- ROY.** *Plante dont le suc se nomme scammonée.*
- CONYZA** major vulgaris , C. B. & **TOURN.** Conyza major **MATTHIOLI**, *Baccharis quibusdam*, J. B. *Herbe aux mouchérons , espece de conyse.*
- Conyza media asteris flore , C. B. Doronic rampant.*
- COPAIBA**, **PISON.** & **MARCG.** *L'Arbre d'où découle le baume de Copahu.*
- COPALLIQUAHUILT**, *Copallifera prima*, **HERNAND.** *Arbre qui donne la résine appelée copal.*
- CORALLACHATES.** *Agate.*
- CORALLINA**, *off. & J. B. Coralline.*
- CORALLIUM.** *Corail.*
- Corallium album oculatum , officin. J. B. Corail blanc.*
- Corallium album oculatum , off. C. B. Madrepore.*
- Corallium rubrum , C. B. Corail rouge.*
- CORALLO-BIANCO** fistuloso, **IMPER.** *Madrepore.*
- CORALLO-DENDRON.** *Arbre de corail.*
- CORDIAR** foliis subovatis serrato-dentatis , **LINNÆI.** *Arbre qui produit les sébestes.*
- CORDULUS** Bellonis, *scincus aquaticus quibusdam*, **NON-NULL.** *Salamandre aquatique.*
- CORIANDRUM**, *off. Coriandrum majus*, C. B. *Coriandrum fructibus globosis*, **LINN.** *Coriandre.*
- Coriandrum minus testiculatum**, C. B. *Coriandre d'Italie.*
- CORNICULA.** *Corneille , oiseau.*
- CORNIX.** *Corneille , oiseau.*
- CORNU** cervi alterum repens, **DODON.** *Cresson sauvage ; Corne de cerf d'eau ; Ambroisie sauvage rampante ; Pied de corneille de RUEL.*
- CORNUS**, *off. Cornus hortensis mas*, C. B. *Cornus fativa*, J. B. *Cornier ou Cornouiller.*
- Cornus mas odorata , folio trifido , margine plano , sassafras dicta*, **PLUCK. & CATESBI.** *Arbre dont le bois est le sassafras.*
- CORONA** fratrum. *Chardon à grosse tête ; Pet d'âne des Parisiens.*
- Corona solis**, **TABERN. & TOURN.** *Soleil.*
- Corona solis parvo flore tuberosâ radice**, **TOURNEF.** *Topinambour ou Poire de terre.*
- Corona terræ**, *humilis hiedera*, **LOBEL.** *Lierre terrestre ; Terrette ; Herbe de S. Jean ; Gondolle ; Rondotte ; Rondelle ; Rondette.*
- CORONOPUS**, **RUELLII.** *Coronopus repens vel recta*, **RUELLII**, **PARK.** *Cresson sauvage ; Corne de cerf d'eau ; Ambroisie sauvage rampante ; Pied de Corneille de RUEL.*
- CORROBORANTIA** *medicamenta. Remedes corroboratifs ou fortifiants*

Corroborantia medicamenta.
Remedes corrosifs.
CORROSIVA medicamenta.
Remedes corrosifs.
CORTEX culilawan. *Ecorce de culilawan.*
CORTEX eleuterii, JOAN. AND. STISSER. & DALE. *Cascarille ou Chacril.*
Cortex peruvianus; **Cortex** febrifugus, OFF. *Quinquina; Poudre de la comtesse; Poudre des peres; Poudre du cardinal de Lugo; Ecorce du Pérou.*
Cortex peruvianus griseus. *Cascarille ou Chacril.*
Cortex pocgereba. *Ecorce nommée pocgereba.*
Cortex winteranus. *Ecorce de Winter; ou Cannelle blanche.*
Cortex winteranus spurius, OFF. *Canelle blanche.*
CORVUS, OFF. **CORVUS** ater, dorso cærulecente, LINN. *Corbeau.*
CORYLUS sativa fructu albo minore, *sive vulgaris*, C. B. **Corylus** sativa, J. B. **Corylus** stipulis ovatis obtusis, LINN. *Noisetier ou Coudrier.*
Corylus sativa fructu rotundo maximo, C. B. *Noisetier ou Avelinier.*
COSTA bovis, OFF. *Percefeuille vivace; Oreille de lievre.*
COSTUS corticosus. *Canelle blanche.*
Costus hortorum, OFF. **Costus** hortensis, *sive Mentha corymbifera*, J. B. **Costus**

hortorum dictus, *sive Balsamita mas*, R A I I. *Tanaïsie des jardins à feuilles de menthe; le grand Baume; la Menthe-coq; la Menthe Notre-Dame; le Coq; le Pasté; l'Herbe du coq ou au coq; le Coq des jardins.*
COTONEA major sylvestris, OFF. *Cotonea sylvestris, C. B. Coignassier sauvage.*
Cotonea malus fructu majori, OFF. *Coignassier femelle à gros fruit.*
Cotonea malus fructu minori, OFF. *Coignassier femelle à petit fruit.*
COTTERMIA, TURCARUM. *Storax liquide, ou Styrax.*
COTULA foetida, OFF. B. C. *Camomille puante; Maroute.*
COTURNIX, OFF. *Caille, oiseau.*
COTYLEDON aquatica, J. B. *Cotyledon aquatica acris septentrionalium, LOBEL. Hydrocotyle, ou Ecuelle d'eau.*
Cotyledon major, C. B. *Cotyledon major, radice tuberosâ, J. B. Nombril de Venus; grand Cotyledon; Escudes ou Ecuelles communes.*
Cotyledon radice tuberosâ longâ repente, MER. & TOURN. *Cotyledon flore luteo, radice tuberosâ repente, A. A. R. P. Cotyledon flore luteo maxima, HERMAN. Cotyledon foliis cucullatis serrato-dentatis*

- alternis, caule ramoso, erectis, LINN. *Nombril de Vénus à fleurs jaunes; Cottyledon à fleurs jaunes.*
- COURBARIL bifolia, flore pyramidato, PLUMM. *Arbre d'où découle la gomme animé.*
- COURDO. *Arbre dont la seconde écorce est la canelle.*
- CRACCÆ primum genus, seu Aracus, DODON. *Vesce noire ou commune.*
- CRAMBE, seu Brassica marina antiquorum, QUORUMD. *Soldanelle; Chou de mer; Chou marin.*
- CRANENSES aquæ. *Eaux de Cransac, dans le bas Rouergue.*
- CRASSULA major, off. Crassula, sive Telephium alterum, DODON. *Orpin; Reprise; Grassette; Joubarbe des vignes.*
- CRATÆGUS Theophrasti, J. B. Cratægus folio laciniato, I. R. H. Cratægus foliis ovatis inæqualiter serratis, LINN. *Alisier ou Sorbier torminal; Tormigne; Anier ou Aigrettier.*
- Cratægus foliis obtusis bis trifidis, LINN. *Epine blanche; Aubépin; Aubépine; Noble-epine.*
- Cratægus inermis, foliis ellipticis, serratis, sinuatis, subtus villosis, LINN. *Sorbier; Cormier domestique ou cultivé.*
- CREMORES. *Crêmes de riz, par exemple; d'orge, &c.*
- CREPIS, DALECAMP. *Petit Laitron ou Laceron doux.*
- CREPITUS lupi, OFFIC. & TRAGI. *Vesse de loup.*
- CRETA subrupestris alba, LINN. *Creta cohærens solida, WALLER. Craie blanche, ou Terre de Crete.*
- CRIAS, APULEI. *Grassette; Herbe grasse ou huileuse.*
- CRISPINA vera, CORDI. *Groseiller blanc épineux.*
- CRISTA gallinacea, seu Glaux, QUIBUSDAM. *Sainfoin; gros Sainfoin.*
- CRITHMUM, off. Crithmum, sive Fœniculum maritimum minus, C. B. & TOURN. *Passe-pierre; Perce-pierre; Fenouil marin; Bacile; Herbe de S. Pierre; Criste marine.*
- CROCUS indicus, ARABIBUS Curcum, officinis nostris radix curcumæ dictus, BONTII. *Curcuma long; Souchet des Indes; Safran des Indes.*
- Crocus sativus, C. B. Crocus floribus fructui impositis, tubo longissimo, LINN. *Safran.*
- CROTON foliis ovatis acuminatis, serratis, caule arboreo, LINN. *Arbrisseau qui produit ce qu'on appelle Graine de ricin indien, ou Pignon d'Inde, ou Pignon de Barbarie, ou Grains de Tilli ou des Moluques.*
- CRUCIALIS, off. *Croissette.*
- CRUCIATA, officin. DODON. *Cruciata hirsuta, C. B.*

- Cruciata quibusdam*, flore luteo, J. B. *Croisette*.
- CRUCIS sanctæ herba femina, CAST. *Tabac mâle ou vrai; Nicotiane à larges feuilles*.
- Crucis sanctæ lignum *Agalochum; Bois d'aloës*.
- CRUS galli, BRUNSF. *Renoncule bulbeuse; Bacinet; Pied de corbin; Pied de coq à racine ronde ou à tubercule charnu*.
- CRYSTALLUS rupea; Crystallus hexagona non colorata, WALLER. *Crystal de Roche*.
- CUBEBA, LINN. *Cubebes*.
- CUBEBE vulgaris, C. B. *Cubebes*.
- CUBEBAE vulgares, off. *Cubebæ, vel Quabebæ*, ARABUM. *Cubebes*.
- CUCULI fructus solani furiosi in Ægypto, CORD. *Coques du Levant*.
- CUCULLATA quibusdam, Crias *Apulei*, L. H. *Grasfette; Herbe grasse ou huileuse*.
- CUCULLUS monachi, *Aconit bleu; Tue-loup; Napel; Coqueluchon; Capuchon; Capuce des moines; Mardriettes*.
- CUCULUS, off. *Cuculus rectricibus nigricantibus punctis albis*, LINN. *Coucou, oiseau*.
- CUCUMER, vel Cucumis Citrullus, FUSCH. *Citrouille*.
- Cucumer elaterii, sylvestris, LOBEL. *Concombresauvage*.
- Cucumer sativus. *Concombre cultivé*.
- CUCUMIS, vel Cucumer, & Cucumis sativus seu esculentus, off. *Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu subluteo*, C. B. *Cucumis foliorum angulis rotundis*, LINN. *Concombre cultivé*.
- Cucumis, GALENI; Cucumis foliorum angulis rectis, LINN. *Melon commun*.
- Cucumis asininus; Cucumis sylvestris, off. *Cucumis sylvestris asininus dictus*, C. B. *Concombre sauvage*.
- Cucumis citrullus, DODON. & FUSCH. *Citrouille*.
- Cucumis foliis multifidis, pomosis, globosis, glabris, LINN. *Coloquinte*.
- CUCUPHÆ. *Cucuphes, especes de bonnets piqués remplis de poudres céphaliques & aromatiques*.
- CUCURBITA, off. *Cucurbita longa folio molli, flore albo*, J. B. *Cucurbita oblonga flore albo, folio molli*, C. B. *Cucurbita, sive Zuccha omnium maxima, Anguina*, LOBEL. *Cucurbita feminibus, obsolete bicornibus*, LINN. *Courge ou Calebasse*.
- CUGUACU-ÉTÉ, & Cuguacu-apara *Brasiliensibus*, PISON. *Chevre du bœzard occidental*.
- CUCURBITIFERA malabariensis, ænopliæ foliis rotundis, fructu orbiculari rubro, cujus grana sunt nuces vomicæ, PLUCK. *Arbre qui porte la noix vomique*.

Cucurbitifera malabathri foliis scandens, *Catalongay* & *Cantara* Philippinis orientalibus dicta, cujus nuclei *Pepitas de Bisayas* aut *Catbatogan* & *Faba sancti Ignatii* ab Hispanis; *Igasur* & *Mananaog* Insularis nuncupati, **PLUCK.** *Plante qui donne la fève de S. Ignace.*

CUCURBITULA. *Ventouse.*

CULILAWAN cortex. *Ecorce de culilawan.*

CUMINUM, off. *Cuminum* semine longiore, C. B. *Cuminum*, sive *Cyminum sativum*, J. B. *Cumin.*

Cuminum dulce, **QUORUMD.** *Anis.*

Cuminum leporis **NONNULL.** *Fetit Trefle des champs; Pied de lievre.*

Cuminum pratense, officin. C. B.

CUNICULUS, off. *Lapin.*

CUNILA bubula, **PLIN.** *Origan commun*, ou *grand Origan*; *Marjolaine sauvage* ou *bâtarde*; *Marjolaine d'Angleterre.*

Cunila fativa, **PLINII**, C. B. *Sarriette*; *Sadrée*, ou *Savourée commune* & *annuelle des jardins.*

CUPRESSUS femina, off. *Cupressus metâ in fastigium convolutâ*, quæ femina **Plinii**, **TOURN.** *Cyprès femelle.*

Cupressus foliis imbricatis erectis, **LINN.** *Cyprès.*

Cupressus mas, off. *Cupressus ramos extra se spargens*,

quæ mas **Plinii**, **TOURN.** *Cyprès mâle.*

CUPRUM, **LATINOR.** *Cuivre*; *Airain.*

CURCUM, **ARABIB.** *Curcuma long*; *Souchet des Indes*; *Safran des Indes.*

CURCUMA longa, seu *Terra merita*, **OFFIC.** *Curcuma long*; *Souchet des Indes*; *Safran des Indes.*

Curcuma radice longâ, **H. L. B.** *Curcuma foliis longioribus & acutioribus*, **BREYN.** *Curcuma foliis lanceolatis*, utrinque acuminatis, nervis lateralibus numerosissimis, **LINNÆI.** *Plante dont la racine s'appelle Curcuma long*; *Souchet des Indes*; *Safran des Indes.*

Curcuma radice rotundâ, **P. B.** *Plante dont la racine est nommée curcuma rond.*

CUREAS, off. *Fève purgative*: à *Saint-Domingue*, *Noix de médecine*; *Amande du ricin d'Amérique*, ou *ricinoïde*, nommée aussi *Médecinier* ou *Pignon de Barbarie.*

CURTIPENDIA, seu *Curtipenda*, seu *Curtipendula mala* aut *poma*. *Pommes de bardin*; *Pommes de court-pendu* ou *de capendu.*

CUSCUTA major, **OFFIC.** & C. B. *Cuscuta*; *Goutte de lin*; *Herbe infernale*

Cuscuta minor, **TOURN.** & C. B. *Epithym.*

Cuscuta nuda repens, filiformis, **LINN.** *Cuscuta.*

CYANUS, off. Cyanus segetum flore cæruleo, C. B. Cyanus flosculis radicalibus latissimis, septifidis, HALLER. *Bleuet* ou *Bluet*; *Blavéole*; *Aubifoin*; *Péroole*; *Barbeau*; *Casse-lunette*.

Cyanus, PLINII. *Saphir*, pierre précieuse.

Cyanus, sive Lazuli lapis, ALDROV. *Pierre d'azur*.

CYCAS frondibus pinnatis circinnalibus foliolis planis, LINN. *Arbre d'où l'on croit que se tire le sagou*.

CYGNUS, off. Cygne, oiseau.

CYCLAMEN orbiculato folio infernè purpurascence, C. B. Cyclamen foliis cordatis, corollâ reflexâ, LINN. *Pain de pourceau*.

CYCLAMINUS folio rotundiore, vulgatiore, J. B. Cyclaminus orbicularis rotundifolius, DODON. Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, TRAGI. *Pain de pourceau*.

CYDONIA angustifolia vulgaris, I. R. H. *Coignassier sauvage*.

Cydonia fructu brevior & rotundior, TOURNEF. *Coignassier femelle à petit fruit*.

Cydonia fructu oblongo leviori, TOURN. *Coignassier femelle à gros fruit*.

CYMINUM, off. Cyminum sativum, J. B. *Cumin*.

CYNOGLOSSA major, BRUNSE. *Cynoglosse*, ou *Langue de chien*.

CYNOGLOSSUM, off. Cynoglossum majus vulgare, C. B. Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis tomentosis, corollis calycem æquantibus, LINN. Cynoglossum foliis amplexicaulibus, lingulatis, mollibus, hirsutis, HALLER. *Cynoglosse*, ou *Langue de chien*.

Cynoglossum, QUORUMD. *Plantain moyen*; *Plantain blanc*.

CYNORRHODOS, off. *Rose sauvage*; *Rose de chien*; *Eglantier*, ou *Gratte-cul*.

CYNOS, CHARLET. *Hérisson terrestre* ou commun.

Cynos, DALE. *Mulet*.

Cynos, DALE & BELON, & GESNER, & ALDROV. *Cheval marin*, ou *Cheval de rivière*; *Hippopotame*; *Bœuf du Nil*; *Bœuf de rivière*; *Bœuf marin*.

CYNOSBATUS, off. Cynosbatus, & sentis canis, BRUNSE. *Rose sauvage*; *Rose de chien*; *Eglantier* ou *Gratte-cul*.

CYNOSORCHIS militaris major, J. B. *Orchis*; *Satyriion à larges feuilles*; *grand Testicule de chien*.

Cynosorchis, MORIO mas, TABERN. *Orchis*; *Satyriion*; *Testicule* ou *Couillon de chien mâle*, à feuilles étroites.

CYPERUS americanus, P. DU TERRE. *Cyperus americanus*, seu *Apoyomatli*, seu *Phatzisiranda*, HERNAND. *Souchet d'Amérique*.

Cyperus

Cyperus indicus zingiberis facie, DIOSCOR. *Curcuma long* ; *Souchet des Indes* ; *Safran des Indes*.

Cyperus longus, OFF. *Souchet long*, racine.

Cyperus longus odoratus peruvianus, C. B. *Plante dont la racine se nomme contrayerva*.

Cyperus odoratus radice longâ, seu *Cyperus officin*. C. B. *Cyperus longus odoratior*, habilior, LOBEL. *Cyperus paniculâ sparsâ*, J. B. *Cyperus culmo triquetro folioso*, umbellâ foliosâ, suprâ decompositâ, pedunculis nudis, spicis alternis, ROY. *Plante dont la racine est le souchet long des boutiques*.

Cyperus rotundus orientalis, OFF. *Souchet rond du Levant*, racine.

Cyperus rotundus orientalis major, C. B. *Cyperus*, HODUEG *Ægyptiis*, PROSP. ALPIN. *Cyperus rotundus orientalis major vel babilonicus*, RAUVOLF. *Cyperus orientalis*, radice olivarii, spicis longis è spadiceo purpurascens, SCHEUCH. *Cyperus culmo*

triquetro subnudo, umbellâ decompositâ, spicis alternis linearibus, LINN. *Plante dont la racine est le souchet rond du Levant*.

CYPIRA, PLINII. *Curcuma long* ; *Souchet des Indes* ; *Safran des Indes*.

CYPRINUS, RONDEL. *Cyprinus cirrhis quatuor, officulo tertio pinnarum dorsanisque uncinatis*, ARTEDI. *Carpe* ; poisson.

Cyprinus mucosus totus nigrescens extremitate caudæ æquali, ARTEDI *Cyprinus pinnâ ani officulis undecim*, caudâ integrâ, LINN. *Tanche ou Tenche*, poisson.

CYPRUS latiore folio, DODON. *Filaria ou Philaria*.

CYTISO-GENISTA, Scaparia vulgaris flore luteo, TOURNEF. *Genêt commun*.

CYTISUS foliolis ovato-oblongis, racemis simplicibus pendulis, LINN. *Aubour* ; *Ebene des Alpes* ; faux *Ebene*.

Cytisus incanus filiquis falcatis, C. B. *On croit que c'est cet arbre qui donne le bois de Rhodes ou de rose*.



D E N

DABURI, CLUS. *Achiotl ;*
Urucu ; Roucou.

DACTYLIOBATANON alterum
Tragi, THAL. *Petite Sa-*
xifrage rouge.

DACTYLUS idæus, OFF. *Bé-*
lemnite ou Pierre de lynx.

Δακρύδιον, TRALL. & QUO-
RUMDAM GRÆCORUM re-
centior. *Scammonée.*

DANIEL aquæ. *Eaux de Da-*
niel, dans le diocèse de
Lodeve.

Δαφνὴ πλάτυπτερά. DIOSCORID.
Laurier royal.

DAPHNE floribus sessilibus,
infra folia elliptico-lanceo-
lata, LINNÆI. *Lauréole*
femelle ; Bois gentil ;
Thymélée femelle des pays
froids.

DAPHNE racemis lateralibus,
foliis lanceolatis integris,
LINNÆI. *Lauréole mâle ;*
Thymélée mâle des pays
froids.

DAPHNOIDES, off. *Daphnoï-*
des, sive *Laureola*, LO-
BEL. *Lauréole mâle ; Thy-*
mélée mâle des pays froids.

DAPHNOIDES crocea, & *Lau-*
reola femina, H. L. *Lau-*
réole femelle ; Bois gentil ;
Thymélée femelle des pays
froids.

DATURA pericarpis spinosis
erectis ovatis, LINNÆI.
Pomme épineuse ; Noix
mételle ; Herbe aux sor-
ciers ; Herbe des magiciens

ou des démoniaques ; Herbe
du diable ; Herbe à la
taupe.

DAUCUS creticus, off. *Dau-*
cus foliis fœniculi tenuissi-
mis, C. B. *Daucus creti-*
cus semine hirsuto, J. B.
Daucus de Candie.

DAUCUS sativus, radice luteâ,
vel albâ, TOURN. *Daucus*
feminibus hispidis, LINN.
Carotte des jardins.

DAUCUS secundus *Dioscoridis*,
COL. *Perfil de Macédoine ;*
Ache ou Perfil des rochers.

DAUCUS montanus apii folio
major, C. B. *Daucus se-*
cundus selinoïdes major,
PARK. *Grand Perfil de*
montagne ou sauvage.

DAUCUS selinoïdes, CORDI.
Petite Saxifrage ; petite
Pimprenelle saxifrage ; pe-
tite Bouquetine ou Bouca-
ge ; petit Perfil de bouc.

DAUCUS vulgaris, OFF. *Dau-*
cus vulgaire ; Chirouis ;
Carotte sauvage.

DECCOCTUM. *Décoction.*

DELPHINIUM platani folio,
staphisagria dictum, TOUR-
NEF. *Delphinium nectariis*
diphyllis, foliis palmatis,
laciniis integerrimis, LINN.
Staphisaigre ; Herbe aux
poux ; Herbe à la pituite.

DELTOIDES, QUORUMDAM.
Moule ou Moucle de mer.

DENDRACHATES. *Agate qui*
représente un arbre.

DENS caballinus, QUORUM.
Jusquiamè ; Hannebane.

DENS leonis, off. Dens leonis
latiore folio, C. B. Dens
leonis *Fuschii*, sive He-
dypnois, J. B. *Pissenlit* ;
Dent de lion.

DENS leonis qui pilosella, off.
TOURN. *Piloselle* ; *Oreille*
de rat ou de souris.

DENTALE læve album, alterâ
extremitate rufescens, LIST.
Dentale arcuatum. *Den-*
tale, ou *Dent de chien.*

DENTALES, GESNER. Den-
tales alii ejusdem formæ
minores, BONAN. *Den-*
tale, ou *Dent de chien.*

DENTALIUM, off. Dentalium
testâ subcylindraccâ lævi
obliquâ vel arcuatâ, hinc
angustiore, LINN. *Den-*
tale, ou *Dent de chien.*

DENTIFRICIA. *Dentifriques.*

DEOBSSTRUENTIA medica-
menta. *Remedes désobs-*
truants ou apéritifs.

DEPILATORIUM. *Dépi-*
latoire.

DESCUREA, GUETTARD. *Tha-*
litron ou *Thalictron* ; *Scien-*
ce des chirurgiens.

DESSICCANTIA medica-
menta. *Remedes dessiccatifs.*

DESQUAMATORIA medica-
menta. *Remedes exfoliants*
ou exfoliatifs.

DETELSE, quæ Tamarin-
dus, PROSP. ALPIN. *Ta-*
marinier.

DETERGENTIA medicamenta.
Remedes détersifs.

DHARIRA, AVIC. *Calamus*
vrai.

DIACRYDIUM, CÆLII AU-
RELIIANI. *Scammonée.*

DIABOLUS metallorum.
Etain.

DIÆTA. *Diete.*

Διαιτα. *Diete.*

DIANTHUS floribus subsoli-
tariis, corollis crenatis,
squamis calycinis subovatis
brevissimis, LINN. *Æillet.*

DIAPENSIA, seu Sanicula
mas *Fuschii*, J. B. *Sanicle*
commune ou *mâle.*

DIAPHORETICA medica-
menta. *Remedes diaphoréti-*
ques.

DICTAMNUS albus vulgò, seu
Fraxinella, C. B. *Plante*
dont la racine est le dictame
blanc.

Dictamnus albus. *Dictame*
blanc ; Diptame ou *Ra-*
cine de fraxinelle.

DICTAMNUS creticus, C. B.
Plante dont les feuilles sont
le dictame de Crete.

Dictamnus creticus. Dictam-
nus Cretæ, OFF. *Dictame*
de Crete.

DICTAMNUM album, OFFIC.
Dictame blanc ; Diptame,
ou Racine de fraxinelle.

DIGERENTIA medicamenta.
Remedes digestifs.

DIGITALIS, off. Digitalis
purpurea, J. B. Digitalis
purpurea folio aspero, C. B.
Digitalis foliis calycinis,
ovatis acuminatis, ROYEN.
Digitale ; Gants de Notre-
Dame.

Digitalis minima, *Gratiola*
dicta, MORIS. *Gratiolle ;*
Herbe à pauvre homme.

Digitalis orientalis sesamum dicta, TOURN. *Sésame*.
Δίχλαμος, DIOSC. *Dictame de Crete*.

DILUENTIA medicamenta.
Remedes délayants.

DINIENSES aquæ. *Eaux de Digne en Provence*.

Διοσκύρεος, (id est) Jovis faba. *Jusquiame noire; Hannebane*.

DIPSACUS sativus, OFF. & C. B. *Chardon à bonnetier ou à foulon*.

DIPTAMUS. *Dictame blanc; Diptame ou Racine de fraixinelle*.

DIRINGUO, MALAIS, GARZ. *Vrai Calamus*.

DISCUTIENTIA medicamenta.
Remedes discussifs.

DIURETICA medicamenta.
Remedes diurétiques.

DODECATHEON, PLINII. *Grassette; Herbe grasse ou huileuse*.

DOLICHOS Theophrasti, ANGUIL. *Fève; Féverolle; Haricot; Phaséole ou Phasiole; Fève peinte ou à visage; Fève ou Pois de mer*.

DORCAS, sive Rupicapra, ALDROV. *Chevre des Alpes nommée ordinairement Chamois ou Ysard*.

DORONICUM plantaginis folio alterum, C. B. *Doronicum germanicum, foliis semper ex adverso nascentibus villosis, J. B. Doronicum foliis caulinis oppositis, LINN. Doronic ou Arnica*.

Doronicum radice dulci, C. B. Doronicum folio subrotundo serrato, J. B. Doronicum brachiatâ radice, PARK. Doronicum radice repente, GESN. Doronic rampant.

Doronicum radice scorpii, C. B. Doronicum latifolium, CLUS. Doronicum romanum, off. DALE. Doronicum foliis cordatis obtusis, radicalibus petiolatis, caulibus amplexicaulibus, LINN. Doronic.

DORSTENIA dentariæ radice, sphondylii folio, placentâ ovali, HOUSTON. *Dorstenia sphondylii folio, dentariæ radice, PLUM. Dorstenia scapis radicatis, LINN. Plante dont la racine est nommée contrayerva*.

DRACO arbor, CLUS. & C. B. *Première espèce d'arbre qui produit la résine nommée sandaraque*.

Draco arbor indica filiquosa, populi folio, Angsana vel Angsava Javanensibus, COMMEL. Quatrième espèce d'arbre qui donne le sang-dragon.

Draco herba, DOD. Estragon.

Draco sylvestris, sive Ptarmice, DODON. Herbe à éternuer.

DRACUNCULUS esculentus, sive Tarchon, off. *Dracunculus hortensis, C. B. Estragon*.

Dracunculus major, BRUNF. Bistorte à racines moins tortues.

- Dracunculus pratenfis**, off. **Dracunculus pratenfis**, serrato folio, C. B. *Herbe à éternuer.*
- DRAKENA**, off. **Drakena radix**, CLUS. & PARK. *Contrayerva.*
Δράκηνα φάρμακα. Remedes drastiques ou actifs.
- DRASTICA medicamenta.** *Remedes drastiques ou actifs.*
- DROPAX.** *Dropacisme.*
- DROSERA scapis radicatis**, foliis orbicularibus seu oblongis, LINN. *Rosée du soleil; Rossolis; Herbe de la rosée; Herbe de la goutte.*
Δρὶς, GRÆCORUM. Chêne commun à larges feuilles.
- DRYOPTERIS**, MATTH. *Fougere mâle.*
- Dryopteris candida**, DODON. *Capillaire blanc.*
- Dryopteris nigra**, DODON. *Capillaire commun ou noir.*
- DRYPIS**, sive **Scorpius**, THEOPHRASTI. *Soude épineuse; Salicote épineuse; Marie épineuse.*
- DSINDSOM** sinicè. *Ninjin.*
- DULCAMARA**, seu **Solanum scandens**, C. B. *Dulcamara, seu Solanum lignosum*, PARK. & RAIL. *Morrelle; Douce-amere.*
- DULCIS radix**, OFFIC. *Réglisse.*



E L E

EBENI lignum, *Bois d'ébene.*

EBULUS, *sive Sambucus humilis*, C. B. *Ebulus, sive Sambucus herbacea*, J. B. *Ebulus*, DODON. *Ieble.*

EBUR fossile, *seu Unicornu fossile*, OFFICINARUM GERMANIÆ. *Unicorne fossile.*

ECBOLICA medicamenta. *Remedes ecboliques.*

ECHINORUM claviculæ lapideæ, WALL. *Pierre de Judée.*

ECHINUS terrestris, ALDROV. *Hérisson terrestre ou commun.*

ECHION, CÆSALP. *Vipérine ou Herbe aux vipères.*

ECHIUM, off. *Echium vulgare*, C. B. & TOURNEF. *Echium caule simplici, foliis caulinis lanceolatis, floribus spicatis lateralibus*, LINN. *Vipérine, ou Herbe aux vipères.*

ECLEGMA. *Looch, ou Eclegme.*

EGRANÆ aquæ. *Eaux d'Egra, en Bohême.*

Εγγελος. GRÆCIS. *Anguille, poisson.*

Εκβολικά φάρμακα. *Remedes ecboliques.*

ELÆAGNUS, CORDI. *Myrte du Brabant; Myrte bâtard des pays froids; Piment royal; Galé.*

ELAPHOBOSCUM erraticum, *seu Branca leonina,*

TABERN. *Panais sauvage; petit Panais.*

Elaphoboscum sativum, TABERN. *Panais ordinaire des jardins; Panais domestique ou cultivé; Pastenade ou Pastenaille blanche; grand Chervi cultivé.*

Ε'λαφος, GRÆCOR. *Cerf.*

Ε'λάτη θήλεια, *sive Abies femina*, J. B. *Arbre d'où découle la térébenthine du sapin, ou de Strasbourg.*

ELATINE, OFF. & DODON. *Elatine folio subrotundo*, C. B. *Elatine mas folio subrotundo*, J. B. *Velvete; Véronique femelle.*

Elatine, BRUNSF. *Lierre terrestre; Terrette; Herbe de S. Jean; Gondolle; Rondotte; Rondelle; Rondette.*

ELEAGNON, THEOPHRASTI. *Agnus castus.*

Η'λεκτρον πτερυγοφόρον. Η'λεκτρον χρυσοφόρον. *Succin, ou Karabé.*

ELECTRON. *Succin, ou Karabé.*

ELECTRUM. *Succin, ou Karabé.*

ELECTUARIA. *Electuaires.*

ELEEMOSYNARIA. *Tabac mâle ou vrai; Nicotiane à larges feuilles.*

ELEMI gummi. *Gomme élémi; dénomination impropre, car c'est une résine.*

ELEOSELINUM, DODON. *Ache.*

Ελέφας, GRÆCORUM. *Éléphant.*

ELEPHAS, LATIN. Elephas naso cylindraceo-elongato, LINN. *Éléphant.*

ELICHRYSUM, seu Stœchas citrina angustifolia & latifolia, C. B. *Stœchas citrin.*

Ελκτικά φάρμακα. *Remedes attirants ou attractifs.*

Ελλέβορος aut Ελλέβορον. GRÆCOR. *Ellébore.*

ELLEBORUS niger aliis, Sanicula femina quibusdam, J. B. *Sanicle femelle ou de montagne.*

ELYCHRYSUM montanum flore majore purpurascete, TOURN. *Pied de chat, plante.*

ELYMUS, NONNULLOR. *Panis, ou Panix, ou Panic.*

EMBSENSES aquæ. *Eaux d'Embs dans la Wétéravie.*

EMETICA medicamenta. *Remedes émétiques, ou Vomitifs.*

EMETO-CATHARTICA medicamenta. *Remedes émétocathartiques.*

EMLEGI, seu Amlegi, ARABUM. *Myrobolans emblics ou embliques.*

Εμμεναγωγὰ φάρμακα. *Remedes emménagogues.*

EMMENAGOGA medicamenta. *Remedes emménagogues.*

EMOLLIENTIA medicamenta. *Remedes émollients.*

EMPETRUM, TRAGI. *Turquette lisse; Herbe du Turc; Herniole.*

Empetrum, seu Saxifraga, FUSCH. *Capillaire blanc à feuille de rue, ou Sauvevie.*

EMPLASTRUM. *Emplâtre.*

EMULSIO. *Emulsion.*

ENDIVIA angustifolia seu minor, off. *Endivia vulgaris, TOURN. Chicoree à feuilles étroites, ou petite Endive.*

Endivia crispa, seu romana, off. *Chicorée frisée, ou Endive frisée.*

Endivia latifolia, off. *Endivia vulgaris, OFF. & C. B. & TOURN. Chicorée blanche; Endive commune.*

Endivia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso, sive Lactuca sylvestris, J. B. *Endivia officinis, QUORUMD. Laitue sauvage.*

Endivia sylvestris, LONIC. *Laitron, ou Laceron doux; Palais de lievre.*

ENDIVIOLA, off. *Chicorée à feuilles étroites, ou petite Endive.*

ENEMA. *Clystere; Lavement.*

ENHYDRIS minor, seu Chersydrus, NONNULLOR. *Serpent à collier.*

ENULA campana, off. *Aunée, ou Enule campane.*

Ηπατικά φάρμακα. *Remedes hépatiques.*

EPHEMERUM non lethale, FUSCH. *Muguet; Lis des vallées.*

EPIDENDRON foliis ovato-oblongis, nervosis sessilibus, caulinis, cirrhis spiralis, ROYEN. *Plante dont le fruit est la vanille.*

- EPIMELIS**, THEOPHR. & DIOSCOR. *Nefflier*; *Mesplier*; *Neslier*; ou *Meslier*.
EPIPACTIS, ANGUILL. *Turquette lisse*; *Herbe du Turc*; *Herniole*.
Επισπαστικά φάρμακα. *Remedes attirants ou attractifs.*
Επίδημα. *Epithême.*
EPITHEMA. *Epithême.*
EPITHYMUM, off. C. B. & TABERN. *Epithym.*
Επυλωτικά φάρμακα. *Remedes cicatrisants.*
Επυλωτικά φάρμακα. *Remedes épulotiques.*
EPULOTICA medicamenta. *Remedes cicatrisants.*
Epulotica medicamenta. *Remedes épulotiques.*
EQUISETUM majus, off. *Equisetum palustre longioribus setis*, C. B. *Equisetum majus aquaticum*, J. B. *Grande Préle*.
Equisetum minus, off. *Equisetum arvense longioribus setis*, C. B. *Equisetum minus terrestre*, J. B. *Equisetum segetale*, GERARD. *Equisetum scapo fructificante nudo, caule sterili, ramis compositis*, LINN. *Equisetum caulibus floriferis, à foliosis diversis*, HALLER. *Petite Préle*.
EQUUS, off. *Equus caudâ undique setosâ*, LINNÆI. *Equus auriculis brevibus erectis, jubâ longâ*, BRISSON. *Cheval*.
Equus caudâ extremo setosâ, LINN. *L'Ane*.
Equus caudâ extremo setosâ, sive *Mulus*. *Mulet*.
ERICA, vel *Ærica*, GAZ. *Hareng*.
Erica vulgaris glabra, C. B. *Erica vulgaris humilis semper virens, flore purpureo & albo*, J. B. *Erica folio myricæ vulgaris glabra*, JONST. *Erica foliis quadrifariam imbricatis, triquetris, glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus*, LINN. *Erica antheris bicornibus inclusis corollis inæqualibus, campanulatis, mediocribus, foliis oppositis sagittatis*, LINNÆI. *Erica foliis intricatis glabris*, HALLER. *Bruyere*.
ERIGERON, GERARD. *Erigeron, sive Senecio vulgaris*, J. B. *Erigeron minus*, NONNULL. *Senecion*, ou *Senesson*.
ERIOX, vel **EROX**, QUORUMD. *Saumon*.
Ερμοδάκτυλος. *Hermodacte, racine.*
Ερμοδάκτυλος ἔρσθρος, ACTUAR. & MYREPS. *Béhen rouge*.
Ερμοδάκτυλος λευκός, ACTUAR. & MYREPS, &c..... *Béhen blanc*.
EROX, vel **Eriox**, QUORUMD. *Saumon*.
Ερρίνα φάρμακα. *Remedes sternutatoires.*
ERRHINA medicamenta. *Errhines*, ou *Remedes sternutatoires*.
ERUCA alba & purpurea, L. H. *Julienne*, ou *Julianne*;

*Violette giroflée des dames ;
Giroflée musquée.*

ERUCA , Bombyx in officinis dicta; Eruca bombycivoma, QUORUMD. *Ver à soie ; Chenille filant la soie.*

Eruca hirsuta , filiquâ cauli appressâ , erysimum dicta , RAIL. *Tortelle, ou Vêlar.*

Eruca lutea latifolia , sive Barbarea , C. B. *Herbe de sainte Barbe, ou Herbe aux charpentiers.*

Eruca palustris , offic. Eruca palustris nasturtii folio , filiquâ oblongâ , C. B. Eruca quibusdam sylvestris repens nasturtii folio , TOURN. *Petit Cresson sauvage à fleurs jaunes ; faux Cresson.*

Eruca peregrina , italica , vel cantabrica , BELGIS ; seu Reseda PLINII neotericorum *Herbe maure ; Résèda.*

ERUCA sativa , offic. Eruca latifolia alba sativa Dioscoridis , C. B. & TOURNEF. Eruca major sativa , annua , flore albo striato , J. B. *Roquette des jardins.*

Eruca sylvestris , offic. Eruca tenuifolia perennis flore luteo , J. B. & TOURNEF. Eruca sylvestris vulgatio , PARK. *Roquette sauvage.*

ERVUM , BRUNSE. *Vesce noire ou commune.*

Ervm candidum , vel Faba veterum , TRAGI. *Vesce blanche.*

Ervm multis , seu Orobus , J. B. Ervm verum , CAMER. Ervm leguminibus pendulis ,

LINN. *Orobe ; Ers , ou Eres ; Pois de pigeon.*

ERYNACEUS , OFF. & MERIAN. Erynaceus spinosus auriculatus , LINNÆI. *Hérisson terrestre ou commun.*

ERYNGIUM , offic. Eryngium vulgare , C. B. Eryngium foliis radicalibus pinnato-tripartitis dentatis , LINN. Eryngium ramosissimum , pinnis foliorum alatis pinnatifide , HALLER. *Charodon roland ; Chardon à cent têtes ; Panicaut.*

Eryngium maritimum , C. B. Eryngium marinum , J. B. *Panicaut de mer.*

ERYSIMUM foliis basi pinnato-dentatis , apice subrotundis , LINN. *Herbe de sainte Barbe, ou Herbe aux charpentiers.*

Erysimum foliis cordatis , LINN. *Alliaire.*

Erysimum , sophia dictum , QUORUMD. *Thalitron, ou Thaliatron ; Science des chirurgiens.*

Erysimum Theophrasti , folio hederaceo , C. B. *Sarrazin , ou Blé sarrazin , ou Blé noir.*

Erysimum vulgare , C. B. Erysimum Tragi , flosculis luteis , juxta muros proveniens , J. B. Erysimum Irioprimum , TABERN. Erysimum filiquis cauli appressis , LINN. *Tortelle , ou Vêlar.*

ERYTHRODANUM , THEOPHRASTI & DIOSCORIDIS. *Garance ordinaire ou*

cultivée; Garance des teinturiers.

ERYTHROMELON magnum parisiacum, J. B. *Pommes de calvilles rouges.*

Εχαρτονα φάρμακα. *Remedes escharotiques.*

ESCHAROTICA, seu crustas inducentia medicamenta. *Remedes escharotiques.*

ESCORÇONERA Hispanorum. *Scorfonere; Cercifis ou Sericifis noir ou d'Espagne.*

ESOX rostro plagioplateo, ARTEDI. *Brochet, poisson.*

ESPAZOTL, seu Atriplex odorata mexicana, HERNAND. *Botrys du Mexique, ou Ambrosie.*

ESULA major, OFF. *Tithymale à feuilles de pin; grande Esule.*

Esula major, OFF. & DODON. *Esula major germanica, GERARD. & PARK. Esula major recentiorum, LOBEL. Esula major, sive Tithymalus magnus multicaulis, J. B. Esula magna; Esula dendrodes sive arborescens, QUORUMD. Tithymale des marais; grande Esule; Turbith noir ou bâtard.*

Esula, vel Esula minor, OFF. & CÆSALP. *Tithymale à feuilles de cyprès; Esule; petite Esule.*

Esula minor altera; Tithymalus linariæ affinis, NONNULLOR. *Petit Tithymale à feuilles d'amandier.*

EUFORBION & Forbion, ARABUM. *Euphorbe.*

EVONYMUS, off. *Evonymus vulgaris granis rubentibus, C. B. Evonymus multis, aliis Tetragonia, J. B. Evonymus foliis oblongo-ovatis, LINN. Fusain; Bonnet de prêtre; Bois à faire des lardoires.*

EVONYMO adfinis arbor orientalis nucifera flore roseo, PLUCK. *Euonymo mediæ & styiaci affinis, Thee, KÆMPF. Arbrisseau dont les feuilles sont connues sous le nom de thé.*

Evonymo affinis arbor, folio alato, buxco, subrotundo; flore pentapetalo, cæruleo, racemoso, fructu aceris cordato, cujus cortex luteus, corrugatus, semen unicum, majusculum, nigricans, nullo ossiculo tectum operit, SLOANE. *Gaiac à fleurs bleues dont le fruit est arrondi.*

Evonymo affinis Philippinarum insularum, anisum spirans, nucas in capsulis stelliformiter congestis proferens, PLUCK. *Arbre qui porte l'anis de la Chine.*

EUPATORIUM, OFF. & J. B. *Eupatorium verum, C. B. Eupatorium, GRÆCOR. Eupatorium vulgare, TRAGI. Eupatoire vrai.*

Eupatorium cannabinum, C. B. & TOURN. *Eupatorium vulgare, DODON. Eupatorium Avicennæ creditum, GESNER. Eupatorium mas, LOBEL. Eupatorium foliis digitatis,*

LINN. *Eupatoire d'AVI-
CENNE*, ou *ordinaire*.

Eupatorium cannabinum femina septentrionalium, stellato & odore flore Lobelio, SCHWENCK. *Chanvre aquatique*, ou *Eupatoire femelle bâtarde*.

Eupatorium MESUÆ quorundam; Ageratum foliis serratis, C. B. *Eupatoire de MÉSUE*.

Eupatorium montanum verbasci folio, vulgatius *Baccharis* dictum, H. O. *Herbe aux mouchérons*, espece de conyse.

EUPHORBIA aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis, LINN. *Plante qui produit la gomme résine appelée euphorbe*.

Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantibus, caule erecto, LINN. *Plante dont la racine est l'ipécacuanha brun*.

Euphorbia foliis lanceolatis, umbellâ universali multifidâ polyphyllâ, partialibus trifidis triphyllis, propriis dichotomis, LINN. *Tithymale des marais*; grande *Esule*; *Turbith noir* ou *bâtard*.

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis, umbellâ

universali polyphyllâ, partialibus triphyllis, reliquis diphyllis, LINN. *Tithymale à larges feuilles*; *Epurge*; *Catapuce ordinaire*.

Euphorbia, DIOSCORIDIS. *Euphorbe*.

EUPHORBIVM, offic. *Euphorbe*.

Euphorbium antiquorum verum, COMMEL. *Euphorbium cerei* effigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum, COMMEL. *Euphorbium polygonum spinosum cerei* effigie, ISNARD. *Plante qui donne la gomme résine appelée Euphorbe*.

EUPHRASIA, off. C. B. & Tourn. *Euphrasia* foliis ovatis acutè dentatis, LINNÆI. *Euphrase*.

EVACUANTIA medicamenta. *Remedes évacuants*.

EXFOLIANTIA, seu *Exfoliativa* medicamenta. *Remedes exfoliants* ou *exfoliatifs*.

EXPECTORANTIA medicamenta. *Remedes expectorants*.

EXSICCANTIA medicamenta. *Remedes dessiccatifs*.

EZQUA-HUITL, seu *Sanguinis arbor*, HERNAND. *Troisième espece d'arbre qui donne le sang-dragon*.

F A R

- F**ABA bengallensis, myrobalani species à nonnullis credita, SAM. DALE. *Fève de Bengale.*
- Faba crassa, off. Faba crassa vulgò, seu Anacamperos, J. B. Orpin ; Reprise ; Grassette ; Joubarbe des vignes.
- Faba febrifuga ; Faba sancti Ignatii, OFF. *Fève de saint Ignace.*
- Faba inversa, OFF. Orpin ; Reprise ; Grassette ; Joubarbe des vignes.
- Faba major hortensis, off. Faba flore candido, lituris nigris conspicuo, C. B. & Tourn. Faba cyamos, J. B. *Fève de marais.*
- Faba marina, NONNULLOR. *Nombril marin ; Ombril marin ; Nombril ou Fève de mer ; Limaçon de mer.*
- Faba purgatrix Indiæ occiduæ, OFF. *Fève purgative : à Saint-Domingue, Noix de médecine ; Amande du ricin d'Amérique, ou Ricinoïde nommé aussi Médecinier ou Pignon de Barbarie.*
- Faba suilla, OFF. *Jusquiame noire ; Hannebane.*
- Faba turcica multicolor, QUORUMDAM. *Fève ; FEVEROLE ; Phaséole ou Phasiole ; Fève peinte ou à visage ; Fève ou Pois de mer.*
- Faba veterum, seu Ervum candidum, TRAGI. *Vesce blanche.*
- FABAGO, sive Ceratia agrestis, GESNER. *Gainier ; Arbre de Judas ou de Judée ; Arbre d'amour.*
- FABARIA, off. & MATTH. Orpin ; Reprise ; Grassette ; Joubarbe des vignes.
- FABULUM, QUORUMD. *Jusquiame noire ; Hannebane.*
- FAGOPYRUM, off. *Fagopyrum vulgare erectum, Tourn. Sarrazin, ou Blé sarrazin, ou Blé noir.*
- FAGOTRITICUM, off. *Sarrazin, ou Blé sarrazin, ou Blé noir.*
- FALCO cerâ viridi, pedibus flavis, pectore albo, undulis transversis fuscis, caudâ fuscâ fasciis nigricantibus, LINN. *Epervier, oiseau de proie.*
- Falco ceratura, pedibus lanatis, corpore rufo, LINN. *Aigle royal.*
- FARFARA, sive Bechium, DODON. *Farfara, Tussilage, Ungula caballina, CÆSALP. Tussilage ; Pas d'âne.*
- FARFARELLA, LAC. *Tussilage ; Pas d'âne.*
- FARFARUS antiquorum, BELLON. *Peuplier blanc ; Peuplier à larges feuilles ; Obeau ; Aubel ou Obel ; Orme blanc des Parisiens.*

FARRAGO, FUSCH. & LOBEL.
& TABERN. *Seigle ou Seigle.*

FAUFEL, *sive* Areca palmæ
foliis, J. B. *Cachou*; *Ca-
téchu*; *Caetchu*; *Castjoe*;
Cate; *Khaath*; & im-
proprement *Terre du Ja-
pon.*

FEBRIFUGA medicamenta.
Remedes fébrifuges.

FEL terræ, OFF. *Petite Cen-
taurée.*

FEL terræ, QUORUMD. *Colo-
quinte.*

FELES zibethi, GESNER. *Ci-
vette.*

FELIS, *seu* Catus, OFF. *Felis*
caudâ elongatâ, auribus
æqualibus, LINN. *Chat.*

Felis caudâ elongatâ, floc-
cosâ, thorace jubato, LIN-
NÆI. *Felis* caudâ in floc-
cum desinente, BRISSON.
Lion.

Felis pilis ex fusco flavicante
& albedo variegatis vestita,
caudâ annulis alternatim
nigris & ex sordidè albo fla-
vicantibus cinctâ, BRISS-
ON. *Chat sauvage.*

Felis zibethi, GESNER. *Zibet,*
animal quadrupede.

FELIUM uva, QUORUMDAM.
Joubarbe âcre; *Vermicu-
laire âcre*; *Pain d'oiseau*;
Poivre des murailles.

FENICULA mala, *aut* poma.
Pommes d'anis, ou *Fe-
nouillettes.*

FENICULUM porcinum, LO-
BEL. *Queue de pourceau*;
Fenouil de porc; *Peuce-
dane.*

FENUM græcum sylvestre,
Ruta capraria, TABERN.
Galéga.

Fenum & Pastus camelorum.
Jonc odorant.

FERBENTHINA. *Térébenthine*
de Chio.

FEREBENTHINA. *Térébenthine*
de Chio.

FERMENTINA. *Térébenthine*
de Chio.

FERRI lignum. *Bois de fer.*

FERRUM, LATINOR. *Fer*,
métal.

Ferrum attractorium, LINN.

Ferrum mineralisatum,
minerâ ferrum trahente ac
repellente & polos mundi
ostendente, VALL. *Ai-
mant.*

Ferrum intractabile squamo-
so-striatum, LINN. Ferrum
mineralisatum, minera du-
rissima, rapaci solida, mag-
neti refractaria, colore
fusco vel ferreo, VALLER.
Emeril.

Ferrum mineralisatum, mi-
nera figurata rubra *aut* tri-
tura rubente, WALL. Fer-
rum intractabile, fibris
centralibus rubris, LINN.
Pierre hématite.

FERULA africana galbanifera
ligustici foliis & facie,
P. B. *Arbre d'où découle*
*la gomme-résine appllée gal-
banum.*

Ferula foliis alternatim sinua-
tis obtusis, LINN. *La*
*Plante qui donne l'assa-fœ-
tida.*

FESTUCH & Pustech, ARA-
BUM. *Pistaches.*

FIBA, RAII. *Castor*, ou *Bievre*.

FICARIA, off. *Petite Chélidoïne*; *petite Scrophulaire*.

FICI indici grana, C. B. *Cochenille*.

FICUS indica racemosa, foliis & fructu amplissimis, *Musa* ARABIBUS dicta, PLUCK. *Bananier dont le fruit se nomme banane*.

Ficus sativa, TOURN. Ficus communis, C. B. Ficus foliis palmatis, LINN. *Figuier*.

FILAGO, off. *Filago seu Impia*, DODON. *Herbe à coton*.

FILFEL & FUFEL, AVIC. *Cachou*; *Catéchu*; *Caëchu*; *Castjoe*; *Cate*; *Khaath*; & improprement *Terre du Japon*.

FILICULA fontana major, sive *Adiantum album* folio filicis, C. B. & TOURNEF. *Capillaire blanc*.

Filicula, *Herba radioli Apulei*, Polypodium, LOBEL. Filicula dulcis sive quercina, QUORUMD. *Polypode de chêne*.

Filicula petrææ rutæ facie, MORIS. *Capillaire blanc à feuille de rue*, ou *Sauvievie*.

Filicula quæ *Adiantum nigrum* offic. pinnulis obtusioribus, TOURN. *Capillaire commun ou noir*.

FILIPENDULA, off. *Filipendula vulgaris*, an *Molon* PLINII? C. B. *Filipendula*

foliis pinnatis, foliolis uniformibus, LINN. *Filipendula* foliis longis, angustis, extremo trilobato, minimis pinnatis intermixtis, HALLER. *Filipendule*.

Filipendula foliis pinnatis, foliolo impari, trifido, LINN. *Reine des prés*; *petite Barbe de chevre*; *Vignette*.

Filipendula monspessulana, folio apii, sive *Ænanthe*, J. B. *Filipendula tenuifolia*, TABERN. *Ænanthe*; *Filipendule aquatique*; *Perfil de marais*.

FILIUS ante patrem, NON-NULLOR. *Tussilage*; *Pas d'âne*.

FILIX florida, seu *Osmunda vulgaris*, PARK. *Filix floribus insignis*, J. B. *Filix ramosa*, non dentata, florida, C. B. *Fougere fleurie*, ou *Osmonde*.

Filix ramosa major, pinnulis obtutis, non dentatis, C. B. *Filix major & prior*, TRAGO, sive *ramosa repens*, J. B. *Filix femina*, MATTH. & DODON. & GERARD. *Filix pinnis ramorum pinnatis*, pinnulis non dentatis, HALLER. *Fougere commune ou femelle*.

Filix non ramosa dentata, C. B. *Filix vulgò mas dicta*, sive non ramosa, J. B. *Filix mas non ramosa*, pinnulis latis, densis, minutim dentatis, GERARD. *Fougere mâle*.

- FLOS amoris**, off. **TOURN.** *Amaranthe; Passe-velours; Fleur de jalousie.*
- FLOS caryophylleus aphyllorcaulos**, vel *juncus major*, C. B. *Statice; Gazon d'Olympe ou de montagne; Œillet de Paris; Herbe à sept tiges.*
- FLOS cœli**, **PARACELSITARUM.** *Mousse membraneuse; Nostoch des Allemands.*
- FLOS frumenti**, **BRUNF.** *Bleuet ou Bluet; Blavéole; Aubifoin; Péroole; Barbeau; Cassé-lunette.*
- FLOS mexicanus multis**, J. B. *Belle de nuit.*
- FLOS niger**, **TLILXOCHITL**, *Mexicanis dictus, seu Aracus aromaticus*, **HERNAND.** *Plante dont le fruit est la vanille.*
- FLOS philadelphus**, **NONNUL-LOR.** *Syringa, ou Seringa commun.*
- FLOS sancti Jacobi**, sive *Senecio major*, **MATTH.** *Jacobée; Fleur de S. Jacques; Herbe de S. Jacques.*
- FLOS sanguineus verus**, **QUORUMD.** *Petite Capucine; petit Cresson d'Inde.*
- FLOS sanguineus**, **MONARD.** *Grande Capucine; grand Cresson des Indes ou du Pérou.*
- FLOS solis**, **DOD.** *Flos solis, vel Panax chironium*, **MATTH.** *Flos solis, sive Helianthos*, **LOBEL.** *Hyssope des Garriques; Herbe d'or; Héliantheme.*
- FLOS solis farnesianus**, *After peruanus tuberosus*, **COL.** *Flos solis pyramidalis, parvo flore, tuberosâ radice*, **QUORUMD.** *Topinambour, ou Poire de terre.*
- FLOS solis major**, **GER.** *Flos solis, sive Chrysanthemum peruvianum*, **PARK.** *Soleil.*
- FLORES stœchados**, **OFFIC.** *Stœchas arabique.*
- FLOS terræ**, **PARACELSITARUM.** *Mousse membraneuse; Nostoch des Allemands.*
- FLOS tinctorius**, J. B. *Genêt d'Allemagne.*
- FLOS Trinitatis**, vel *Heptachrum, vel Jacea*, **GESNER.** *Flos Trinitatis, sive Jacea tricolor*, J. B. & **RAII.** *Violette de trois couleurs; Herbe de trois couleurs; Herbe de la Trinité; Pensée.*
- FÆNICULUM alpinum perenne** capillaceo folio, odore medicato, quod *Meum officinarum*, **TOURN.** *Meu ou Méum; Méum athaman-tique.*
- Fœniculum ammi** origani odore, **TOURN.** *Ammi de Crete; Cumin d'Ethiopie.*
- Fœniculum annuum**, umbellâ contractâ oblongâ, **TOURNEF.** *Fenouil annuel; Vifnage; Cure-dent d'Espagne.*
- Fœniculum dulce**, majore & albo semine, J. B. *Fœniculum dulce*, C. B. *Fœniculum, sive Marathrum vulgatius dulce*, **LOBEL.** *Fenouil doux.*

Fœniculum erraticum, QUORUMD. *Saxifrage des Anglois ou des prés.*

Fœniculum marinum, offic.

Fœniculum maritimum minus, seu Crithmum, C. B. & TOURN. *Passe-pierre; Perce-pierre; Fenouil marin; Bacile; Herbe de saint Pierre; Criste marine.*

Fœniculum orientale Cuminum dictum, TOURN. *Cumin.*

Fœniculum sinense, F. RHED. *Anis de la Chine; Anis de Sibérie; Anis étoilé; Semence de badian.*

Fœniculum vulgare minus, acriori & nigriori semine, J. B. & TOURN. Fœniculum vulgare italicum, semine oblongo, gustu acuto, C. B. Fœniculum, sive Marathrum vulgatius, LOBEL. Fœniculum vulgare germanicum, C. B. *Fenouil commun.*

FœNU græcum, J. B. *Fénugrec.*

FœNUM græcum sativum, C. B. & TOURN. *Fénugrec.*

FOLIUM indicum, OFFICIN. *Feuille indienne, ou Malabathrum.*

Folium indicum, seu Tamalapatrum, C. B. *L'Arbre qui porte la feuille indienne ou malabathrum.*

Foliolum orientale, OFFICIN. *Senné ou Séné d'Alexandrie.*

FONTANELLA. *Cautere, ou Fonticule.*

FONTICULUS. *Cautere, ou Fonticule.*

FORBION & Euforbion. *Euphorbe.*

FORDA, seu Horda. *La Vache, femelle du taureau.*

FORGIENSES aquæ. *Eaux de Forges, en Normandie.*

FORINA & Forio, Trutta vulgò, SCH. *Truite ordinaire, ou des rivières.*

FORMICA. *Fourmi.*

FOSFORO, o Pietra lucida di Bologna, BOCCONE. *Pierre lumineuse, ou Phosphore de Bologne.*

FOSSILE cæruleum, seu Azutum, MERRIAN. *Pierre d'Arménie.*

FOYNA. *Fouine.*

FRAGARIA vulgaris, C. B. *Fragaria ferens fraga rubra, J. B. Fragaria flagellis reptans, LINN. Fraïsier.*

FRAGORUM arbor. *Arbousier; Fraïsier en arbre.*

FRAGULA, CORDI. *Fraïsier.*

FRAGUM & Trifolium fagiferum, TABERN. *Fraïsier.*

Fragum arboreum. *Arbousier; Fraïsier en arbre.*

FRAMBÆSIA, QUORUMDAM. *Framboisier; Ronce du mont Ida.*

FRANCATURA mala aut poma. *Pommes de Francatu.*

FRANGULA, DODON. *Frangula orâ folii integrâ, HALLER. Bourgène, ou Aune noir.*

FRASSINELLA, seu Fraxinella, CÆSALP. & ANGUILL. *Sceau de Salomon; Signet; Genouillet.*

FRAXINELLA,

FRAXINELLA, seu *Fraxinella*, CÆSALP. & ANGUILL. *Sceau de Salomon*; *Signet*; *Genouillet*.

Fraxinella, CLUSII & TOURNEF. *Plante dont la racine est le dictame blanc*.

FRAXINUS, off. *Fraxinus excelsior*, C. B. & TOURN. *Fraxinus floribus nudis*, LINN. *Frêne*.

Fraxinus bubula, sive *Sorbus sylvestris*, GERARD. *Fraxinus sylvestris*, sive *Ornus*, PARK. *Sorbier*, ou *Cormier sauvage*.

Fraxinus humilior, sive *altera*, THEOPHRASTI, *minore & tenuiore folio*, C. B. *Fraxinus floribus completis*, LINN. *Première espèce de frêne qui donne la manne*.

Fraxinus rotundior folio, C. B. *Seconde espèce de frêne qui donne la manne*.

FREBINTHINA. *Térébenthine de Chio*.

FREGATELLA, CÆSALP. *Hépatique commune*.

FREMINTHINA. *Térébenthine de Chio*.

FRIGIDÆ aquæ. *Eaux acides ou froides*.

FRINGILLA *remigibus antrorsum luteis*, *extima immaculata*, *rectricibus duabus extimis toto reliquisque apice albis*, LINN. *Char-donneret*, oiseau.

FRINGILLA *remigibus rectricibus fuscis*, *gula nigrâ*, *temporibus ferrugineis*, LINN. *Passereau*; *Moi-*
Tome VIII.

neau franc, domestique ou commun.

FRINGILLAGO & *Parorum maxima*, BELON. *Grande ou grosse Mésange*.

FRINGILLARIUS, BELON. *Fringillarius accipiter*, vulgò *Nisus dictus*, ALDROV. *Epervier*, oiseau de proie.

FRONTALE. *Frontal*, topique qu'on applique sur le front.

FRUMENTUM *indicum* *Mays dictum*, C. B. *Frumentum turcicum*, DODON. *Maïs*; *Blé de Turquie*.

Frumentum sarracenicum, OFF. *Sarrazin*, ou *Blé sarrazin*, ou *Blé noir*.

FRUTEX *coronarius*, CLUSII. *Syringa*, ou *Seringa commune*.

Frutex pusillus aculeatus, QUORUMD. *Soude épineuse*; *Salicote épineuse*; *Marie épineuse*.

Frutex sensibilis, *Herba mimosa dicta*, PARK. *Sensitive*; *Herbe mimeuse*; *Herbe sensible*.

Frutex theæ, BONT. *Arbrisseau dont les feuilles sont connues sous le nom de thé*.

FUCUS *edulis*; *Fucus saccharinus*. *Algue*; *Porte-sucre*.

Fucus folliculaceus, serrato folio, C. B. & TOURN. *Fucus folliculaceus serratus*, Sargazo, MONTI. *Herbe flottante*, ou *Lentille de mer*.

Fucus marinus, sive *Alga marina graminea*, PARK. *Fucus marinus primus*, ANGUILL. *Algue commune*.

FUFEL & Filfel, AVIC. *Ca-chou; Catéchu; Caetchu, Casijoe; Cate, Khaath; & improprement Terre du Japon.*

FUGA dæmonum, QUORUMD. *Millepertuis, ou Herbe à millepertuis.*

FULFUL & Fulfel, ARABUM. *Poivre.*

FULIGO alba philosophorum. *Les chymistes ont ainsi nommé le sel ammoniac.*

FUMARIA, off. & DIOSCORIDIS, flore purpureo, C. B. & TOURN. *Fumaria vulgaris, J. B. Fumeterre ou Fiel de terre.*

Fumaria bulbosa minima, TABERN. Moscatelline; Herbe du musc; Herbe musquée.

FUMUS terræ, BRUNSE. *Fumeterre ou Fiel de terre.*

FUNGI arborei ad ellychnia, J. B. *Amadouvier; Agaric.*

FUNGI terreni præcoces, spongiolæ, nonnullis, DOD. *Fungi favaginosi, sive Fungi rugosi favis mellis similes, LOBEL. Morilles.*

Fungi verni *Moucerous* dicti, odori & esculenti, J. B. *Mousseron, espece de champignon.*

FUNGUS campestris esculentus vulgatissimus; Fungus sativus equinus, *Parisien-sum; Fungus pileolo lato & rotundo, C. B. &*

TOURN. *Fungus campestris, albus supernè, infernè rubens, J. B. Champignon ordinaire.*

Fungus durus, sive igniarius, PARK. Fungus in caudicibus nascens, unguis equini figurâ, C. B. Amadouvier; Agaric.

Fungus laricis, C. B. Agaric. Fungus maximus rotundus, pulverulentus, dictus Germanis Pfofist, J. B. Autre espece de visse de loup.

Fungus porosus, C. B. Fungus rugosus vel cavernosus, sive Merulius niger & albus, J. B. Fungus spongiosus, DALEC. Morilles.

Fungus pulverulentus; Crepitus lupi, Lycoperdon, off. Fungus rotundus orbicularis, C. B. Fungus ovatus, Crepitus lupi, TRAGI. Vesse de loup.

Fungus sambucinus, sive Auricula Judæ, off. Fungus membranaceus auriculam referens, sive Fungus sambucinus, C. B. Oreille de Judas.

Fungus vernus & esculentus; Fungus pileolo rotundiori, Mouceron dictus, TOURN. Mousseron.

FUR nocturnus, BELON. *Fré-saie; Effraie ou Orsaie; Hibou des clochers; petit Chat-huant plombé; Chouart; Lucheron.*

G A L

GADUS dorso tripterygio , ore cirrato , caudâ subæquali , radio primo spinoso ,
ARTEDI , *Morue , poisson.*

Gadus dorso tripterygio , ore imberbi , corpore albo , maxillâ superiore longiore ,
ARTEDI. *Merlan.*

GAGATES lapis. *Jais , ou Jayet.*

GAIIACUM flore cæruleo , fructu subrotundo , PLUM.
Gaiacum tetraphyllum , fructu singulari , EIUSD.
Gaiac à fleurs bleues dont le fruit est arrondi.

GAINUS. *Fouine.*

Γαλακτοφόρα φάρμακα. *Remedes galactophores.*

GALACTOPHORA medica-
menta. *Remedes galactophores.*

GALANGA major ; **Galanga** javanensis , OFF. *Le grand Galanga.*

Galanga minor & **Galanga** sinensis , OFF. *Petit Galanga ; Galanga de la Chine ; Souchet babylonique.*

Γαλαγγας & Γαλαγκας , PAUL. & AETII. *Petit Galanga ; Galanga de la Chine ; Souchet babylonique.*

GALBANUM , off. *Galbanum concret , gommeux-résineux.*

GALBULI. *Fruits du cyprès.*

Γαλή , GRÆCORUM. *Belette.*

GALE , frutex odoratus , septentrionalium , J. B. *Gale florifera & fructifera , VAILLANT. Myrte du Brabant ; Myrte bâtard des pays froids ; Piment royal ; Galé.*

GALEGA vulgaris , floribus cæruleis , C. B. *Galéga.*

GALEGÆ affinis , RAIL. *Arbre des battus ; Gajati ; Æschynomene à grande fleur.*

GALEOPSIS , FUCSH. *Grande Scrophulaire commune.*

Galeopsis , sive **Urtica** iners folio & flore minore , J. B. *Ortie morte puante.*

Galeopsis , sive **Urtica** iners , flore purpurascente majore , folio non maculato , J. B. *Ortie morte non puante , à fleurs purpurines.*

Galeopsis , sive **Urtica** iners , floribus albis , J. B. *Ortie morte non puante ; Ortie blanche ; Ortie qui ne pique point.*

Galeopsis , sive **Urtica** iners , flore luteo , off. J. B. *Ortie morte à fleurs jaunes.*

Galeopsis , sive **Urtica** iners , magna foetidissima , J. B. **Galeopsis** procerior foetida , spicata , TOURN. **Galeopsis** legitima , *Dioscoridis* , PARK. & RAIL. **Galeopsis** vera , GERARD. *Grande Ortie puante.*

. T ij

Galeopsis angustifolia foetida,
off. J. B. *Galeopsis palus-*
tris, *betonica folio*, *flore*
variegato, *TOURN. Petite*
Ortie puante.

GALLÆ, officin. *Noix de*
galle.

GALLI centrum, NONNULL.
Orvale; *Toute-bonne.*

Galli centrum, aut *Centrum*
gallinæ, RUELL. *Orvale*;
Toute bonne des prés ou
sauvage; *Sclarée.*

GALLINA. *Poule dom stique.*

GALLITRICHUM sativum,
Orvale; *Toute-bonne.*

Gallitrichum sylvestre vulgò,
sive Sclarea sylvestris flore
purpureo cæruleove mag-
no, J. B. *Orvale*; *Toute-*
bonne des prés ou sauvage;
Sclarée.

GALLIUM album, officin.
Gallium album vulgare,
TOURN. Gallium album
latifolium, C. B. *Caille-*
lait à fleurs blanches.

Gallium caulis angulis, fo-
liisque orâ & nervo serra-
tis, fructu hispido, LINN.
Gratteron; *Rieble.*

Gallium latifolium, *Cruciata*
QUIBUSDAM, *flore luteo*,
J. B. *Croisette.*

Gallium luteum, off. *Gal-*
lium verum, J. B. *Gallium*
foliis octonis linearibus,
ramis floriferis, *brevibus*,
LINN. *Gallium foliis octo-*
nis, *gracilissimis*, *confu-*
sis, *spicâ flavâ caulem*
terminante, HALLER.
Caille-lait à fleurs jaunes,
ou petit Muguet.

Gallium tetraphyllum, mon-
tanum, cruciatum, CO-
LUMN. *Petite Garance*;
Rubéole; *Herbe à l'esqui-*
nancie.

GALLUS; *Gallus gallinaceus*;
Gallus caudâ compressâ af-
cedente, LINN. *Coq do-*
mestique.

GAMMARUS, sive *Astacus*
fluviatilis, VORM. *Ecre-*
visse de rivieres ou de ruis-
seaux.

GANAPERIDE, RAIH. *Arbre*
dont l'écorce est le quin-
quina.

GAPRAGO, CÆSALP. *Ga-*
léga.

GARANTOGNEN, IROQUÆIS.
Gins-eng, ou *Ginseng.*

GARCINIA, LINN. *Mangos-*
tans, *fruit des Indes.*

GARGARISMA. *Gargaris-*
me.

GARIOFILATA, vulgò, CÆ-
SALP. *Benoîte*; *Herbe de*
S. Benoît; *Galiot*; *Ga-*
riot; *Récife.*

GAVIA vulgaris, KLEIN.
Vanneau.

GAZELLA bezoardica orien-
talis, off. *Gazella indica*,
cornibus rectis, *longissi-*
mis, *nigris*, *prope caput*
tantum annulatis, RAIH.
Chevre, ou *Gazelle du bé-*
zoard oriental.

Gazella indica, *cornibus rec-*
tis, *longissimis*, *nigris*,
prope caput tantum annu-
latis, RAIH. *Gazelle des*
Indes, *dans le quatrieme*
estomac de laquelle se trouve
le vrai bézoard oriental.

GENGIDIUM, off. *Cerfeuil*.

GENISTA hispanica, off. *Genista juncea*, J. B. *Genêt d'Espagne*.

Genista spartium spinosum foliis polygoni, C. B. *Alhagi*.

Genista tinctoria germanica, C. B. *Genista foliis lanceolatis*, ramis teretibus striatis, LINN. *Genista foliis confertis*, ovalibus acutis, floribus sessilibus, spicatis, HALLER. *Genêt d'Allemagne*.

Genista vulgaris, off. *Genista angulosa*, & *Scoparia*, C. B. *Genista angulosa trifolia*, J. B. *Genêt commun*.

GENTIANA, off. *Gentiane*, *racine*

Gentiana hydropica, HOFFM. *Gentiana corollis infundibuliformibus quinquesidis*, foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, LINN. *Gentiana foliis trinerviis*, ovatis, floribus umbellatis, tubo strictissimo, HALLER. *Petite Centauree*.

Gentiana major lutea, C. B. *Gentiana vulgaris major*, hellebori albi folio, J. B. *Gentiana corollis rotatis verticillatis*, HALLERII. *Gentiane*, *plante dont la racine porte le même nom*.

Gentiane, DIOSCORID. *Gentiane*, *racine*.

GEODES, ALDROV. *Bézoard fossile*.

GERANIUM cicutæ folio moschatum, C. B. *Geranium*

pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, LINN. *Geranium moschatum folio ad myrrhidem accedente majus*, J. B. *Bec de grue musqué*.

Geranium columbinum, off. *Geranium folio malvæ rotundo*, C. B. *Geranium folio rotundo multum serrato*, sive *Columbinum*, J. B. *Bec de grue*, ou *Pied de pigeon*.

Geranium robertianum, off. *Geranium robertianum primum viride*, C. B. *Geranium pedunculis bifloris*, quinque trive partitis, lobis pinnatifidis, LINN. *Bec de grue*, ou *Pied de pigeon*.

Geranium sanguineum, off. *Geranium sanguineum maximo flore*, C. B. *Geranium sanguineum*, sive *Hamatodes*, crassâ radice, J. B. *Bec de grue sanguin*, ou *Bec de grue à grandes fleurs*.

GERONTOPOGON, sive *Saliflica* Italorum, L. H. *Sarcifis*; *Cercifis*; *Salsifis*; *Sarsifis blanc commun des jardins* ou d'Italie.

Gerontopogon, flore luteo, GESNER. *Sercifis sauvage* ou des prés; *Barbe de bouc*.

GETHYLLIS, seu *Gethyum*. *Porreau* ou *Poireau*.

GEUM floribus erectis, fructu globoso, seminum caudâ uncinatâ, LINN. *Benoîte*;

Herbe de S. Benoît ; Galiot ; Gariot ; Récife.
 Geum floribus erectis, fructu globofo, aristis uncinatis, nudis foliis ternatis, (fortè)
 GRONOV. Geum virginianum. *Benoîte sauvage.*
 GHITTA jemon. *Gomme-gutte.*
 GIAUZIBAN, AVIC. *Muscade, ou Noix muscade.*
 GIGARTA. *Semences de grenade.*
 GINGIBER, sive Zingiber, OFFICIN. *Gingembre, racine.*
 GINGIBILL, BONTII. *Plante dont la racine est le gingembre.*
 GINGIDIUM umbellâ oblongâ, C. B. *Fenouil annuel ; Visnage ; Cure-dent d'Espagne.*
 GINS-ENG, seu Pe-tsi, SINSIB. *Gens-eng, OFF. Ginf-eng, ou Ginfeng.*
 GLACIES Mariæ, seu Lapis specularis, KONIG. *Pierre spéculaire ; Verre de Moscovie.*
 GLADIOLUS foetidus, C. B. *Glaïeul puant ; Spatule ou Espatule ; Iris qui sent le gigot.*
 Gladiolus luteus, OFFICIN. *Le faux Acorus.*
 GLASTUM, off. Glastum sativum, sive Isatis, J. B. *Pastel ou Guede.*
 GLAUCIUM flore luteo, TOURNEF. *Glaucium foliis tomentosis, imis pinnatis ; superioribus serratis, amplexicaulibus, HALLER. Pavot*

cornu ; Glaucium à fleurs jaunes.
 GLANS. *Suppositoire.*
 Glans ægyptia, PLIN. *Ben, ou Noix de ben.*
 Glans unguentaria, C. B. *Arbre qui porte la noix de ben : le fruit même nommé Ben ou Noix de ben.*
 GLAUX quorumdam, LOBEL. *Vulnéraire des paysans.*
 Glaux, sive Crista gallinacea, QUIBUSD. *Sain-foin ; gros Sain-foin.*
 GLECHOMA foliis reniformibus crenatis, LINN. *Lierre terrestre ; Herbe de S. Jean ; Gondolle ; Rondotte ; Rondelle ; Rondette.*
 GLESSUM. *Mot allemand qui désigne le succin ou karabé.*
 GLIS. LATINOR. *Loir.*
 Glis, pilis è fusco & flavicante mixtis vestitus, sive Marmota alpina, BRISSON. *Marmote.*
 GLOSSOPETRA. *Langue de serpent, pierre triangulaire.*
 GLUTEN auri. *Le Borax.*
 GLUTINANTIA medicamenta. *Remedes agglutinatifs.*
 GLYSYPICROS, seu Amara dulcis, J. B. *Morelle ; Douce-amere.*
 GLYCYRRHIZA, off. Glycyrrhiza filiquosa vel germanica, C. B. *Glycyrrhiza radice repente, vulgaris germanica, J. B. Glycyrrhiza vulgaris, DODON. Glycyrrhiza leguminibus glabris, LINNÆI. Réglisse.*

Glycyrrhiza arborescens. *Aca-*
cia commun; grand Aca-
cia; Acacia en arbre
d'Amérique; faux Aca-
cia.

GNAPHALII genus, *aliis,*
Pilosella major quibus-
dam, J. B. Pied de chat,
plante.

GNAPHALIUM, *off.* Gnapha-
lium montanum flore ro-
tundiore, C. B. Gnapha-
lium montanum suave ru-
bens, LOBEL. *Pied de*
chat, plante.

Gnaphalium foliis lanceola-
tis, inferioribus obtusis,
caule herbaceo simplicissi-
mo, corymbo terminali
composito, LINN. *Stæ-*
chas citrin.

Gnaphalium vulgare, *officin.*
Gnaphalium germanicum,
J. B. Gnaphalium vulgare
majus, C. B. Gnaphalium
flore dichotomo sphæris flo-
ralibus in angulo divisionis
sessilibus, HALLER. *Herbe*
à coton.

GRAMEN caninum vulgare,
off. Gramen loliaceum ra-
dice repente, *sive* Gramen
off. TOURN. Gramen re-
pens officinarum, fortè
triticeæ spicæ aliquatenus
simile, J. B. *Chientent or-*
dinaire.

Gramen cyperoïdes aroma-
ticum indicum, BREYN.
Plante qui donne le nard in-
dien.

Gramen dactylon aromati-
cum, multiplici paniculâ,
spicis brevibus tomento

candicantibus ex eodem
pediculo binis, PLUCK.
Plante qui donne le jonc
odorant.

Gramen dactylon radice re-
pente, *sive* officinarum,
TOURN. Gramen repens
cum paniculâ graminis
mannæ, J. B. Gramen
dactylon, folio arundina-
ceo majus aculeatum, fortè
Plinio, C. B. *Chientent;*
Pied de poule

Gramen Parnassi, GERARD.
Gramen Parnassi vulgare,
PARK. Gramen Parnassi,
flore albo simplici, C. B.
Gramen Parnassi DODO-
NEO, quibusdam Hepaticus
flos, J. B. *Parnassia; Hé-*
patique blanche.

Gramen polyanthemum ma-
jus, DODON. Gramen
marinum mediterraneum
majus, *Statice* quibusdam,
PARK. *Statice; Gazon*
d'Olympe ou de montagne;
Œillet de Paris; Herbe à
sept tiges.

GRANA fici indici, C. B. *Co-*
chenille.

Grana paradisi. *Graine de*
paradis.

Grana tiglia, OFFIC. *Graine*
du ricin indien; Pignons
d'Inde; Pignons de Bar-
barie; Grains de Tilli ou
des Moluques.

GRANADILLÆ affinis, DALE.
Plante dont la racine est
nommée contrayerva.

GRANATA, *sive* punica Ma-
lus sativa, OFF. *Grenadier*
domestique.

GRANATORUM officula, vel nuclei, vel semina. *Semences de grenade.*

GRANATUM malum. *Grenade, fruit du grenadier.*

GRANATUS. Grenat, pierre précieuse.

GRANUM infectorium, OFF. Kermès; Graine de kermès; Graine d'écarlate; Vermillon; Kermès animal.

Granum kermès, OFF. Kermès; Graine de kermès; Graine d'écarlate; Vermillon; Kermès animal.

Granum regium, OFFICIN. Graine de ricin, ou Pignon d'Inde.

Granum regium minus, MESUE. *Tithymale à larges feuilles; Epurge; Catapuce ordinaire.*

Granum zelim, SERAPIONIS. *Poivre d'Ethiopie.*

GRATIA Dei, CÆSALP. Gratia Dei, cujus semen gelbenech, papaver spumeum fortè, ANGUILL. *Gratiolle; Herbe à pauvre homme.*

Gratia Dei, Geranium quibusdam, TRAGI. *Bec de grue, ou Herbe à Robert.*

GRATIOLA, offic. Gratiola centauroïdes, C. B. Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis, LINN. *Gratiolle; Herbe à pauvre homme.*

Gratiola cærulea, C. B. *Centauree bleue; Tertianaire, ou Herbe aux fièvres.*

GROSSULARIA, Uva crispa dicta, officin. Grossularia

simplici acino, vel spinosa, sylvestris, C. B. *Groseiller blanc épineux.*

Grossularia hortensis fructu margaritis simili, C. B. & TOURN. *Groseiller blanc.*

Grossularia spinosa sativa, C. B. & TOURN. Grossularia majore fructu, CLUS. *Groseiller blanc épineux cultivé.*

Grossularia olens, Ribes nigrum dicta, off. Grossularia non spinosa, fructu nigro majore, C. B. *Groseiller noir; Cassis, ou Cassier des Poutevins.*

Grossularia, Ribes dicta, off. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa, hortensis, rubra, sive Ribes, off. C. B. *Groseiller rouge.*

GRUS, off. Grue.

GRYLLUS, off. Gryllus domesticus, ALDROV. Gryllus caudâ bisetâ, alis inferioribus, pedibus simplicibus, LINN. Gryllus in domibus habitans & cantilans, NONNULLOR. *Grillon domestique; Grillot; Grillet ou Grille; Grésillon; Crignon ou Crinon; Cricon; Cripuet.*

Gryllus caudâ ensiferâ rectâ, corpore subviridi, LINN. *Grande Sauterelle verte.*

GUAIACUM, officin. Gaïac; Bois de gaïac; Bois saint.

Guaiacum flore cæruleo, simbrato, fructu tetragono, PLUM. Guaiacum polyphyllum fructu singulari tetragono, EUSDEM. *Gaïac &*

fleurs bleues dentelées, dont le fruit est quadrangulaire.

GUAJABO pomifera indica, C. B. *Guaiavier* ou *Goyavier*, arbre des Indes occidentales.

GUAJAVA, off. *Guaiavier* ou *Goyavier*, arbre des Indes occidentales.

GUMMI. *Gomme*.

Gummi ammoniacum. *Gomme ammoniac*.

Gummi arabicum. *Gomme arabe*; *Gomme du Sénégal*.

Gummi elemi. *Gomme élémi*; dénomination impropre, car c'est une résine.

Gummi funerum, JUDÆOR. & ÆGYPT. *Bitume de Judée*.

Gummi gamandra, vel *gamandræ*, vel de *gamandrâ*. *Gomme gutte*.

Gummi gitta. *Gomme gutte*.

Gummi de Goa. *Gomme gutte*.

Gummi gotta. *Gomme gutte*.

Gummi gutta, vel *guttæ*. *Gomme gutte*.

Gummi de Temec. *Gomme gutte*.

Gummi juniperinum, OFFIC. *Sandaraque des Arabes*; *Gomme* ou *Résine de genévrier*; *Vernis*.

Gummi laxativum. *Gomme gutte*.

Gummi nostras. *Gomme de notre pays*.

Gummi de Peru. *Gomme gutte*.

Gummi peruanum. *Gomme gutte*.

Gummi-resinæ. *Gommes-résines*.

Gummi sambuci, DODON. *Oreille de Judas*.

Gummi tragacantha. *Gomme adragant*.

GUTTA gama. *Gomme gutte*.

Gutta geman. *Gomme gutte*.

Gutta hammoniaca. *Gomme ammoniac*.


Gutta ad podagram. *Gomme gutte*.

Gutta romana. *Succin*, ou *Karabé*.

GYP SUM lamellis rhomboïdibus (parallelis) pellucidum, WALL. *Pierre spéculaire*; *Verre de Moscovie*.

Gypsum particulis minimis punctulis nitens, polituram admittens, WALL. *Albâtre*.

Gypsum viride, semi-pellucidum fissile, WALL. *Pierre néphrétique*.



H E L

- H**AANTHAL, ARABUM. *Coloquinte.*
- HÆMACHATES. *Agate.*
- HÆMATITES lapis, OFFICIN. *Pierre hématite.*
- HÆMORRHOIDUM herba, OFF. *Petite Chélidoine ; petite Scrophulaire.*
- HAFS & Hafus, ARABUM. *Noix de galle.*
- HALCEDO muta, BELON. *Martin-pêcheur ; Oiseau de S. Martin, ou simplement Martin ; Alcyon muet ; Pivert d'eau ; Merle bleu.*
- HALEC, off. *Hareng.*
- HALICACABUM, offic. GER. & RIV. *Halicacabum, sive Alkekengi vulgare, PARK. Alkekenge ; Coqueret ; Coquerelle.*
- HANEBACH ARABUM flore cæruleo, QUORUMD. *Lilas ou Lilac ; Syringa à fleur bleuâtre ; Queue de renard des jardins.*
- HANAB, AVICEN. *Jujubes, fruits du jujubier.*
- HAOUVAI. *Ahouai.*
- HARACZI. *Pierre qui se trouve dans la vésicule du fiel du bœuf.*
- HARENGUS, RONDEL. *Harengus flandricus, ALDROV. Harengus chalcidis species, BELON. Hareng.*
- HARUNDO vulgaris, sive val-latoria, PARK. *Harundo, Arundo calamus, CHABR. Roseau.*
- HEDEREA arborea, C. B. *Hedera foliis ovatis lobatifque, LINN. Lierre en arbré.*
- Hedera terrestris, off. *Hedera terrestris vulgaris, C. B. Hedera humilis, Corona terræ, LOBEL. Lierre terrestre ; Terrette ; Herbe de saint Jean ; Gondolle ; Rondotte ; Rondelle ; Rondette.*
- HEDERALIS. *Dompte-venin.*
- HEDYPNOIS, sive Dens leonis, Fuschii, J. B. *Pissenlit ; Dent de lion.*
- HELC Alimbath, seu Helt Alimbach, ARAB. *Térébenthine de Chio.*
- HELENium, OFF. *Aunée, ou Enule campane.*
- Helenium indicum maximum, C. B. *Soleil.*
- HELIANTHEMUM tuberosum esculentum, off. *Helianthemum indicum tuberosum, C. B. Topinambour, ou Poire de terre.*
- Helianthemum vulgare, off. *Helianthemum flore luteo, J. B. Helianthemum anglicum luteum, GERARD. Hyssope des Garriques ; Herbe d'or ; Hélianthème.*
- HELIANTHOS, sive Flos solis, LOBEL. *Hyssope des*

Gariques ; Herbe d'or ; Hélianthème.

HELILEGI ARABUM. *Myrobolans bellirics* ou *belliriques.*

Helilegi asuad, ARABUM. *Myrobolans indiens* ou *noirs.*

Helilegi azafar, ARABUM. *Myrobolans citrins.*

Helilegi kebuli, ARABUM. *Myrobolans chébules.*

HELIOTROPIUM, off. Heliotropium majus, DIOSC. C. B. & TOURN. Heliotropium majus flore albo, J. B. Heliotropium officinis, verrucaria Scorpioïdes, LOBEL. *Herbe aux verrues ; Héliotrope.*

Heliotropium indicum QUORUMD. GERARD. *Topinambour*, ou *Poire de terre.*

HELLEBOPASTRUM, officin. *Ellébore noir commun ; Pied de Griffon ; Pommelée*, ou *Herbe du cru.*

HELLEBORUM album, sive Veratrum, LOBEL. *Ellébore blanc à fleur verte.*

Helleborum album flore nigro, J. B. Helleborum album floribus atro-rubentibus, præcox, LOBEL. *Ellébore blanc à fleur noire.*

HELLEBORUS albus flore atro-rubente, C. B. *Ellébore blanc à fleur noire.*

Helleborus albus, flore subviridi, C. B. Helleborus albus flore ex viridi albescente, J. B. *Ellébore blanc à fleur verte.*

Helleborus niger angustioribus foliis, TOURN. Helleborus niger flore roseo, C. B. Helleborus niger legitimus, CLUS. Helleborus scapo subnudo bifloro, foliis pedatis, LINN. *Ellébore noir à fleur de rose.*

Helleborus niger ferulaceus, Theophr. LOBEL. Helleborus Hippocratis, TABERN. *Especie d'ellébore que TABERNAMONTANUS croit être l'ellébore d'HIPPOCRATE.*

Helleborus niger foetidus, C. B. Helleborus niger sylvestris, adulterinus, etiam hyeme virens, J. B. Helleborus caule infernè angustato, multifolio, multifloro, foliis caule brevioribus, LINN. *Ellébore noir commun ; Pied de griffon ; Pommelée*, ou *Herbe de cru.*

Helleborus niger hortensis flore subviridi, C. B. Helleborus niger vulgaris, flore viridi vel herbaceo, radice diurnâ, J. B. *Ellébore noir à fleur verte.*

Helleborus niger orientalis amplissimo folio, caule præalto, flore purpurascente, COR. I. R. H. Helleborus niger orientalis, BELON. *Ellébore noir d'Orient.*

Helleborus niger, saniculæ folio major, C. B. *Sanicle femelle* ou *de montagne.*

Helleborus niger tenuifolius buphthalmi flore, C. B.

- Ellébore noir à fleur d'œil de bœuf.*
HELMINTOLITHUS testacei ,
 LINN. *Belemnite, ou Pierre de lynx.*
Helmintolithus zoophyti ,
 LINN. *Pierre de Judée.*
HELXINE , *Urceolaris* , sive *Perdicium* , CÆSALP. *Pariétaire ; Paritoire ; Vitrivole ; Cassé-pierre ; Perce-muraille.*
Helxine *Cissampelos* , CORDI. *Grand Liseron , ou Liset.*
Helxine , *Cissampelos multis* , sive *Convolvulus minor* , J. B. *Petit Liseron ou Liset ; Campanette ou Clochette ; Vrillée commune.*
Helxine vera , PLINII. *Carline ou Charderonnette.*
HENNA , seu *Alhenna* ,
Arabum , WALT. *Alcanna vraie.*
HEPATICA alba , OFF. *Parnassia ; Hépatique blanche.*
Hepatica aurea , vel *Saxifraga aurea* , off. *Hepatica palustris* , H. E. *Saxifrage dorée , ou Hépatique dorée.*
Hepatica fontana ; *Hepatica vulgaris* ; *Hepatica terrestris* , offic. *Hepatica fontana* , sive *Lichen petræus latifolius* , *Hepatica vulgaris* , sive *Lichen* , PARK. *Hepatica fontana* , seu *Jecoraria* , TRAGI. *Hépatique commune.*
Hepatica nobilis ; *Hepatica trifolia* , off. *Hepatica trifolia cæruleo flore* , CLUS.

- Hépatique des fleuristes , ou belle Hépatique.*
Hepatica stellaris , TABERN. *Hepatica stellaris* , sive *Asperula* , J. B. *Muguet des bois ; petit Muguet ; Hépatique.*
Hepatica medicamenta. *Remedes hépatiques.*
HEPATICUS flos quibusdam ,
Gramen Parnassi Dodoneo , J. B. *Parnassia ; Hépatique blanche.*
HEPTACHRUM , seu *Jacea* , sive *Flos Trinitatis* , GESNER. *Violette de trois couleurs ; Herbe de la Trinité ; Pensée.*
HEPTAPHYLLIS , FUSCH. *Tormentille*
HERACLEUM foliis pennatifidis , LINN. *Berce ; fausse Branc ursine ; Branc-ursine bâtarde.*
HERACLEUS lapis. *Aimant.*
HERBA antoniana , seu *sancti Antonii* , maxima , GESNER. *Herbe de S. Antoine.*
Herba apostematica QUORUMDAM. *Scabieuse ordinaire des prés ou des champs*
Herba benedicta , BRUNSF. *Benoîte ; Herbe de S. Benoît ; Galiot ; Gariot ; Récife.*
Herba calicularis , QUORUMDAM. *Jusquiame noire ; Hannebane.*
Herba castiana famem sistimque retardans , J. B. *Alatérne , seconde espece.*
Herba cunicularis , QUORUMDAM. *Jusquiame noire ; Hannebane.*

- Herba divi Stephani, TABERN. *Herbe de S. Etienne, ou Herbe enchanteresse.*
- Herba divina. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba doria, NONNULLORUM. *Verge d'or à feuilles étroites ; petite Verge dorée.*
- Herba ferraria vel sagminalis, QUORUMDAM. *Verveine.*
- Herba fullonum, QUORUMD. *Savonniere ou Savonnai-re ; Saponniere ou Saponnaire.*
- Herba hæmorrhoidum, OFF. *Petite Chélidoine ; petite Scrophulaire.*
- Herba impatiens, sive Noli me tangere, off. *Impatiens pedunculis (solitariis) multifloris, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus, LINN. Balsamine jaune ; Balsamine sauvage ou des bois ; Merveille à fleurs jaunes ; Herbe impatiente.*
- Herba impia, OFF. *Herbe à coton.*
- Herba Joannis infantis, MONARDI. *Herbe de Jean, infant.*
- Herba judaica & pagana, NONNULLOR. *Verge d'or à feuilles étroites ; petite Verge dorée.*
- Herba judaica altera, DODON. *Centauree bleue ; Tertianaire, ou Herbe aux fievres.*
- Herba julia, quibusd. J. B. *Eupatoire de Mésué.*
- Herba kali, BELLON. *Grande Soude ; Salicote ; Marie vulgaire.*
- Herba lanaria, QUORUMD. *Serrette ou Sarrette.*
- Herba legati. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba leporina, NONNULL. *Petit Lotier ou Trefle sauvage jaune.*
- Herba lumbricorum QUORUMD. *Thalitron ou Thalitron ; Science des chirurgiens.*
- Herba maritima cochleiformis, QUORUMD. *Soude épineuse ; Salicote épineuse ; Marie épineuse.*
- Herba medicea. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba melancholifuga, C. A. *Fumeterre ou Fiel de terre.*
- Herba Mercurii, PLINII. *Mercuriale mâle ; Foirole ; Vignoble ou Vignette.*
- Herba muricata, NONNULL. *Tribule commun ou terrestre ; Herse ; Croix de Malte ou de Chevalier ; Salgot terrestre.*
- Herba panacea, *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba papillaris, QUORUMDAM. *Lampsane ; Herbe aux mammelles.*
- Herba pappa, NONNULLOR. *Senecion ou Senesson.*
- Herba paralysis, BRUNSF. *Primevère ; Primérole ; Fleurs de coucou ; Braie de cocu ; Herbe à la paralysie.*

- Herba Paris, off. DODON.
Raisin de renard ; Herbe à Paris.
- Herba pedicularis, CORD.
Staphisaigre , Herbe aux poux ; Herbe à la pituite.
- Herba peforata, TRAGI.
Millepertuis , ou Herbe à mille pertuis.
- Herba petrella, NONNULL.
Senecón ou Senefson.
- Herba plantaginis foliis, flore doronici , sternutamenta movente, GESNER. *Doronique ou Arnica.*
- Herba prioris. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba proserpinaca (à serpendo), APUL. *Renouée ; Traînasse ; Centinode ; Corrigiole.*
- Herba pulicaris seu pulicaria, NONNULLOR. *Herbe aux puces.*
- Herba radioli *Apulei*, Polypodium, Filicula, LOBEL.
Polypode de chêne.
- Herba reginæ. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba Roberti, OFF. *Bec de grue , ou Herbe à Robert.*
- Herba sacra, ANGUILL. *Verveine.*
- Herba sacra, QUORUMD. L. & AGRIPP. *Mélisse sauvage ou bâtarde ; Mélisse de montagne ou des bois ; Mélisse puante ou qui sent la punaise.*
- Herba sacra, seu Hierobotane , sive Verbenaca supina femina, DODON.

- Véronique des prés , ou Germandrée bâtarde.*
- Herba sagminalis vel ferraria, QUORUMDAM. *Verveine.*
- Herba sancta sive sacra. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba sancta minor, sive Tabacum, LOBEL. *Tabac de Virginie ; Pétun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.*
- Herba sanctæ crucis femina, CAST. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- Herba sanctæ Kunigundis, TRAGI. *Eupatoire d'AVICENNE ou ordinaire.*
- Herba sanctæ Mariæ vulgò, CÆSALP. *Tanaïsie des jardins à feuille de menthe ; le grand Baume ; la Mente-coq ; la Menthe Notre-Dame ; le Coq ; le Pasté ; l'Herbe du coq ou au coq ; le Coq des jardins.*
- Herba sancti Petri, OFFIC. *Passe-pierre ; Fenouil marin ; Bacile ; Herbe de saint Pierre ; Criste marine.*
- Herba sardoa vel sardonias ; Herba strumea ; Herba scelerata, NONNULL. *Renoncule des marais ; Grenouillette d'eau ou aquatique ; Herbe sardonique.*
- Herba scelerata, NONNULL. *Renoncule des marais ; Grenouillette d'eau ou aquatique ; Herbe sardonique.*
- Herba siciliana, TABERN. *Toute-saine.*

Herba solis, NONNULLOR.
Millepertuis, ou *Herbe à*
milie pertuis.

Herba sophia angustifolia,
Thaliætrum, TABERN.
Thalitron ou *Thaliætron*;
Science des chirurgiens.

Herba strumea, NONNULL.
Renoncule des marais; *Grenouillette d'eau* ou *aquatique*; *Herbe sardonique*.

Herba Trinitatis, BRUNSE
Violette de trois couleurs;
Herbe de la Trinité; *Pensée*.

Herba Trinitatis flore cæruleo, seu *Trifolium hepaticum*, J. B. *Hépatique des fleuristes*, ou *belle Hépatique*.

Herba tunica, QUIBUSD.
Æillet.

Herba turca, sive *Herniaria*,
LOBEL. *Turquette lisse*;
Herbe du Turc; *Herniole*.

Herba venti, TRAGI. *Couquelourde*; *Pulsatille*;
Passé velours.

Herba viperaria, QUORUMDAM. *Vipérine* ou *Herbe aux vipères*.

Herba vitri seu vitraria,
NONNULL. *Grande Soude*;
Salicote; *Marie vulgaire*.

HERBULUM, sive *Senecio*,
TRAGI. *Seneçon* ou *Sennesson*.

HERCULANIÆ mater, QUORUMDAM. *Nenuphar*, ou *Nénusar blanc*; *Blanc d'eau*;
Lis d'eau ou *d'étang*; *Vollet*; *Plateau à fleurs blanches*.

HERINACEUS & Erinaceus,
MERRIAN. *Hérisson terrestre* ou *commun*.

HERMODACTYLI non venenati, off. LOBEL. *Hermodactyles*, *racine*.

HERMODACTYLUS, officin.
Hermodacte, *racine*.

Hermodactylus folio quadrangulo, TOURN. *Hermodactylus legitimus*, DODON. *Plante dont la racine est nommée hermodacte*.

HERMUPOA. *Mercuriale mâle*; *Fourole*; *Vignoble* ou *Vignette*.

Herniaria glabra, J. B. *Herniaria*, DODON. *Herniaria*, sive *Herba turca*, LOBEL. *Herniaria calycibus bractea nudis*, LINNÆI. *Turquette lisse*; *Herbe du Turc*; *Herniole*.

Herniaria hirsuta, J. B. *Turquette velue*.

HESPERIDES flore purpureo albo & vario, J. B. *Julienne* ou *Julianne*; *Violette*; *Giroflée des dames*; *Giroflée musquée*.

HESPERIS allium redolens, MOR. & TOURN. &c....

Hesperis seiparia allium redolens, BUXB. *Alliaire*.

Hesperis hortensis flore purpureo, C. B. & TOURN. *Hesperis nostras* flore simplici purpureo, QUORUMDAM. *Julienne* ou *Julianne*; *Violette-giroflée des dames*; *Giroflée musquée*.

HIBERNICUS lapis, officin.
MERRIAN. *Pierre d'Irlande*, ou *Ardouze d'Irlande*.

HIBISCUS, off. *Guimauve*.
 Hibiscus foliis peltato-cordatis, septemangularibus, ferratis, hispidis, LINN. *Ambrette*, ou *Graïne musquée*.

HIERACIUM murorum folio pilosissimo, C. B. Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minore, LINNÆI. *Pulmonaire des François*; *Herbe à l'épervier à feuilles tachées*.

Hieracium repens vulgare majus, VOLK. Hieracium foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro, LINNÆI. *Piloselle*; *Oreille de rat ou de souris*.

HIEROBOTANE mas, DODON. *Véronique des bois ou des haies*.

Hierobotane mas, BRUNSF. *Verveine*.

Hierobotane femina, BRUNSF. *Tortelle ou Vêlar*.

Hierobotane, vel Herba sacra, seu Verbenaca supina femina, DODON. NONNULL. *Véronique des prés*, ou *Germandrée bâtarde*.

HING, PERSARUM & INDORUM. *Assa-fœtida*; *Merde au diable des Européens*; *Manger des dieux des Asiatiques*.

HINGISEH Persis, umbellifera levistico affinis, foliis instar pœoniæ ramosis, caule pleno maximo, semine foliaceo, nudo, solitario, branca-urfinæ vel pastinacæ simili, radice

assa-fœtidam fundente; KÆMPFER. *La Plante qui donne l'assa-fœtida*.

HIPPIA minor, CORDI. *Morgéline*; *Mouron*.

HIPPOCASTANUM vulgare, TOURNEF. *Marronnier d'Inde*.

HIPPOLAPATHUM, off. Hippolapathum, sive Rhabarbarum monachorum, DODON. Hippolapathum sativum Gerardi, RAIL. *Rhubarbe des moines*.

Hippolapathum rotundifolium, & Pseudo-rha recentiorum, LOBEL. Hippolapathum rotundifolium vulgare, PARK. *Rhubarbe bâtarde*, ou *fausse Rhubarbe*.

Hippolapathum sylvestre, MATTH. *Patience* ou *Parrelle*.

HIPPOLITHI. *Pierres de la vésicule du fiel du cheval*.

HIPPOMARATHRUM anglicanum, QUORUMD. *Saxifrage des Anglois* ou *des prés*.

HIPPOTAMUS, off. RAIL. *Cheval marin*, ou *Cheval de rivière*; *Hippopotame*; *Bœuf du Nil*; *Bœuf de rivière*; *Bœuf marin*.

HIPPOSELINUM, MATTH. *Livèche*, ou *Ache de montagne*.

Hipposelinum THEOPHR. vel Smirnum DIOSCOR. C. B. *Maceron*; *gros Persil de Macédoine*.

HIPPURIS, DIOSCORIDIS. *Grande Prêle*.

Hippuris

- Hippuris minor**, DODON. *Petite Prêle.*
- Hircus**. *Bouc, mâle de la chevre domestique.*
- Hircus bezoardicus**, ALDROV. *Chevre ou Gazelle du bezoard oriental.*
- Hircus ferus**, quoddam genus Cretæ familiare, quod Galli *Bouc-étain* appellant, BELON. *Hircus cornibus supra nodosis, infra retusis, in dorsum reclinatis*, BRISSON. *Chevre sauvage, ou Bouquetin, ou Bouc-étain, ou Bouëtine, ou Bouëtine.*
- HIRSCHBERGENSES** aquæ. *Eaux de Hirschbergen, en Silésie.*
- HIRUDO sanguisuga**, off. *Hirudo major equina*, SCHRODER. *Hirudo depressa fusca margine laterali flavo*, LINN. *Sang-sue.*
- HIRUNDINARIA**, TRAGI. *Hirundinaria flore albo*, PARK. *Dompte-venin.*
- Hirundinaria major**, OFFIC. *Grande Chelidoine; Eclairé; Félongne.*
- Hirundinaria minor**, TABERN. *Nummulaire; Herbe aux écus; Monnoyere; Herbe à cent maux; Herbe qui tue les moutons.*
- HIRUNDO**, off. *Hirundo domestica*, ALDROV. *Hirundo rectricibus, excepto pari intimo, albâ maculâ notatis*, LINN. *Hirondelle domestique.*
- HISPIDULA**, offic. *Pied de chat, plante.*
- Tome VIII.**
- HOAD. Agallochum**; Bois d'aloës.
- HOAXACAN**, seu *Lignum sanctum*, HERNAND. *Gaiac à fleurs bleues dentelées dont le fruit est quadrangulaire.*
- HOITZILOXITL**, seu *Arbor balsami indici, balsamifera prima*, HERNAND. *Arbre d'où découle le baume du Pérou.*
- HOMO**. *Homme.*
- HORDA**, seu *Forda. La Vache*, femelle du taureau.
- HORDEUM galaticum** Columellæ, HERMOL. & RUEL. & AMAT. & TABERN. *Hordeum sicilienfe*, NONNULOR. *Ris ou Riz.*
- Hordeum polystichum hibernum**, off. *Hordeum polystichum hibernum majus*, TABERN. *Hordeum majus*, TRAGI. *Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis*, LINN. *Orge.*
- Hordeum polystichum verum**, off. C. B. *Hordeum hexastichum pulchrum*, J. B. *Hordeum polystichum æstivum*, TABERN. *Hordeum septentrioni notissimum*, LOBEL. *Hordeum senibus versibus*, MATTH. *Orge du printemps; Orge avancée.*
- HORMINUM**, off. *Horminum Sclarea dictum*, C. B. *Toute-bonne.*
- Horminum pratense foliis serratis**, C. B. *Horminum sylvestre*, FUCH. *Horminum*

sylvestre vulgare, PARK.
 Horminum sylvestre majus
 flore cæruleo & rubicundo,
 THAL. *Orvale* ; *Toute-*
bonne des prés ou sauvage ;
Sclarée.
 HUMULUS, LINNÆI. *Hou-*
blon.
 HUNEN, SERAPION.
Jujubes, fruits du jujubier.
 HUSO Germanorum, GESNER. & ALDROV. & WILLESBY. *Grand Esturgeon* ;
Poisson à colle.
 HYACINTHUS. *Hyacinthe*,
pierre précieuse.
 HYÆNA veteribus nuncupata,
 nunc autem *Civetta*. Hyæna
 odorifera, HERNAND.
Civette.
 HYDRAGOGA medicamenta.
Remedes hydragogues.
 HYDRARGYRUS. *Mercure* ;
Vif-argent.
 HYDROCOTYLE vulgaris,
 TOURN. *Hydrocotyle*, ou
Ecuelle d'eau.
 HYDROLAPATHUM, sive La-
 pathum aquaticum maxi-
 mum, J. B. Hydrolapa-
 thum nigrum, MUNTIN-
 GII. *Patience aquatique*,
 ou *Parelle des marais.*
 HYDROPIPER, seu *Perficaria*
 urens, C. B. & TOURN.
 Hydropiper, DODON. *Per-*
ficaire âcre ou brûlante ;
Piment, ou *Poivre d'eau* ;
Curage.
 HYDRUS, NONNULLOR. *Ser-*
pent à collier.
 HYOSCYAMI peruviani al-
 tera, DODON. *Tabac de*

Virginie ; *Pétun des Ama-*
zones ; *Nicotiane à feuilles*
étroites.
 HYOSCYAMUS luteus, DO-
 DON. & GESN. & CAMER.
 & GERARD. & ANGUILL.
 Hyoscyamus peruvianus,
 TABERN. *Tabac femelle* ;
faux Tabac ; *Tabac du*
Mexique ; *Nicotiane à*
feuilles rondes ; *petite Ni-*
cotiane.
 Hyoscyamus niger vulgaris,
 off. Hyoscyamus vulgaris
 vel niger, C. B. Hyoscyamus
 foliis amplexicaulibus,
 LINN. *Jusquiame noire* ;
Hannebanne.
 Hyoscyamus peruvianus, DO-
 DON. *Tabac mâle ou vrai* ;
Nicotiane à larges feuilles.
 HYOSIRIS Plinii, ANGUILL.
Jacée.
 HYPERICUM floribus trigynis,
 fructu baccato, foliis ova-
 tis pedunculo longioribus,
 LINN. *Toute-saine.*
 Hypericum vulgare, C. B. &
 TOURN. Hypericum vul-
 gare, sive *Perforata*, caule
 rotundo, foliis glabris,
 J. B. Hypericum floribus
 trigynis, caule ancipiti,
 foliis punctatis, obtusis,
 LINN. *Millepertuis*, ou
Herbe à mille pertuis.
 HYPNOTICA medicamenta.
Remedes hypnotiques.
 HYPOCISTIS, offic. *Hypo-*
ciste, suc desséché & noir.
 Hypocystis cretica flore pur-
 pureo, TOURN. Hypoc-
 cistis, C. B. Hypocistis
 omnino lutea, seu ochræ

colore, CLUS. Plante dont le suc desséché & noir se nomme hypociste.

HYPOMELIDES fortè PALLADI. Alisier ou Sorbier torminal; Tormigne; Anier ou Aigrettier.

HYPSEAR, ARABUM. Gui commun; Gui de chêne.

HYSSOPUS, offic. Hyssopus officinarum cærulea seu spicata, C. B. Hyssopus vulgaris, spicatus, angustifolius, flore cæruleo, J. B. Hyssopus vulgaris, DODON. Hyssopus spicis secundis, LINNÆI. *Hyssope*.

Hyssopus agrestis, BRUNSF. *Sarriette*; *Sadrée*, ou

Savourée commune & annuelle des jardins.

Hyssopus campestris, TRAGI. *Hyssope des Gariques*; *Herbe d'or*; *Hélianthème*.

Hyssopus Hebræorum, NONNULLOR. *Romarin*; *Encensier*.

Hyssopus montanus, NONNULL. *Sarriette vraie*, ou *Herbe de S. Julien*.

HYSTERICA medicamenta. *Remedes hystériques ou contre les vapeurs.*

HYSTRIX, RAII. *Hystrix* manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, LINN. *Hystrix* malacensis, SEBA. *Porc-épic*.



I N T

- I**BERIS, *sive* Lepidium gramineo folio, TOURN. Iberis latiore folio, C. B. Iberis cardamantica, LOBEL. *Passerage sauvage; Cresson sauvage.*
- ICICA**, *sive* Elemmi. *Elémi, résine.*
- ICICARIBA** Brasiliensibus, MARCG. Icariba & illius gummi Icica, *sive* Elemmi, PISON. *Arbre qui porte l'élémi, résine.*
- ICROUHACOU**, ARAB. Sarcocolle.
- IGASUR**, *seu* Nux vomica legitima, Serapionis, CAMELLI. *Fève de S. Ignace.*
- IGNIS.** Feu.
- ILEX** aculeata baccifera, folio sinuato, C. B. *Houx.*
- ILLECEBRA** major, & Vermicularis crassula minor, off. LOBEL. *Petite Joubarbe; Trique-madame, ou Tripe-madame.*
- Illecebra** minor, off. Illecebra, *sive* Sempervivum minimum, LOBEL. *Joubarbe âcre; Vermiculaire âcre ou brûlante; Pain d'oiseau; Poivre des murailles.*
- ILY**, H. M. Bambu, ou Bambou, ou Bamboé, ou Mambu.
- IMPATIENS** herba, *sive* Noli me tangere, off. Impatiens pedunculis (solitariis) multifloris, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus, LINN. *Balsamine jaune; Balsamine sauvage ou des bois; Merveille à fleurs jaunes; Herbe impatiente.*
- IMPERATORIA** major, C. B. Imperatoria, J. B. *Impératoire.*
- Imperatoria** nigra, TABERN. *Sanicle femelle ou de montagne.*
- Imperatoria** sativa, TOURN. *Angélique.*
- IMPIA**, DODON. *seu* Filago. *Herbe à coton.*
- INCARNANTIA** medicamenta. *Remedes incarnatifs ou sarcotiques.*
- INCIDENTIA** medicamenta. *Remedes incisifs.*
- INDIGO**, Gali, *sive* Nil, Herba rorismarini facie, LINN. *Anil, plante du Brésil.*
- INFUSUM**; infusio. *Infusion.*
- INJECTIO.** *Injection.*
- INSCHI**, vel Inschi-kua, H. M. *Plante dont la racine est le gingembre.*
- INTESTINA** terræ, NONNULL. *Vers de terre; Lombrics.*
- INTYBUM** sativum, J. B. *Chicorée frisée, ou Endive frisée.*
- Intybum** sativum angustifolium, J. B. *Chicorée à feuilles étroites, ou petite Endive.*
- INTYBUS** angustifolia, offic. *Chicorée à feuilles étroites, ou petite Endive.*

Intybus crispa, C. B. *Chicorée frisée*, ou *Endive frisée*.

Intybus fativa, off. *Intybus fativa latifolia*, C. B. *Chicorée blanche*, ou *Endive commune*.

Intybus sylvestris, seu *erratica*, acutis foliis, TRAGI. *Laitron*, ou *Laceron épineux*.

INULA, off. *Inula foliis ovatis*, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis, LINNÆI. *Aunée*; ou *Enule campane*.

IPECACUANHA cinerea; *Ipecacuanha peruviana*, off. *Ipecacuanha* fortè PISONIS. *Ipécacuanha gris*.

Ipecacuanha fusca; *Ipecacuanha brasiliensis*, officin. *Ipecacuanha altera*, seu *fusca*, PISONIS. *Ipécacuanha brun*.

ἵπποπόταμος, GRÆCOR. *Cheval marin*, ou *Cheval de riviere*; *Hippopotame*; *Bœuf du Nil*; *Bœuf de riviere*; *Bœuf marin*.

ἵππος, GRÆCOR. *Cheval*.

IRIS foetidissima, seu *Xiris*, TOURN. *Iris foliis ensiformibus*, corollulis imberbibus, petalis interioribus longitudine stigmatis, LINNÆI. *Iris agria* THEOPHR. & DIOSCORIDIS. *Glaïeul puant*; *Spatule* ou *Espatule*; *Iris qui sent le gigot*.

Iris latifolia tuberosa, ZINGIBER dicta flore albo, H. O. *Plante dont la racine est le gingembre*.

Iris palustris lutea, TABERN.

Iris imberbis lutea, nervo folii eminente, HALLERII. *Iris de marais à fleur jaune*.

Iris palustris lutea, TABERN.

Iris corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus, LINN. *Le faux Acorus*.

Iris tuberosa, folio anguloso, C. B. *Iris tuberosa Belgarum* & secundum Aldrovandum prima *Lonchitis* Dioscoridis, LOBEL.

Iris bulbosa precox, CLUS. *Iris corollis imberbibus*, foliis tetragonis, LINN. *Plante dont la racine se se nomme hermodacte*.

Iris vulgaris germanica, sive *sylvestris*, C. B. *Iris vulgaris violacea*, sive *purpurea sylvestris*, J. B. *Iris sylvestris*, TABERN. *Iris corollis barbatis*, caule foliis longiore multiflore, LINN. *Iris ordinaire*.

ISATIS fativa sive *latifolia*, C. B. & TOURN. *Isatis*, Glaustum, off. *Isatis*, sive *Glaustum fativum*, J. B. *Pastel* ou *Guede*.

Isatis sylvestris vel *angustifolia*, C. B. *Isatis foliis radicalibus*, crenatis, caulinis integerrimis, penè acutis, filiculis oblongis, LINN. *Pastel sauvage*.

ISGARUM vulgò, *Salsolæ* genus in hortis, CÆSALP. *Grande Soude*; *Salicote*; *Marie vulgaire*.

ISOPHYLLON, CORDI. *Perce-feuille vivace ; Oreille de lievre.*

ISOPYRUM, GESNER. *Ménianthe ; Trefle de marais ; Trefle d'eau ou aquatique ; Trefle de castor.*

ISPIDA, off. DALE. & GESN. & ALDROV. *Ispida, Alcyon fluviatilis ; vulgò Piscator regis, CHARLET. Ispida, an veterum Alcyon ? WILLUGHBY. Martin-pêcheur ; Oiseau de Martin, ou simplement Martin ; Alcyon muet ; Pivert d'eau ; Merle bleu.*

IVA arthritica, OFF. *Ivette ordinaire.*

Iva inoschata Monspeliensium, J. B. *Ivette musquée.*

IXIA, PLIN. *Larme qui découle de la carline gommeuse, ou Chaméléon.*

Ιξία, quorumdam, DIOSC. *Carline gommeuse ; Chaméléon blanc.*

Ιξίας, DIOSCORIDIS. *Larme qui découle de la carline gommeuse, ou Chaméléon.*

Ιξίον, THEOPHR. *Carline, ou Charderonnette.*



J U D

JACARECATINGA acori species, PISON. *Acorus des Indes ou d'Asie ; Glaïeul aromatique d'Asie.*

JACEA major, sive Viola tricolor, CAST. Jacea, sive Flos Trinitatis, vel Heptachrum, GESNER. Jacea tricolor, sive Trinitatis Flos, J. B. & RAIL. *Violette de trois couleurs ; Herbe de la Trinité ; Pensée.*

Jacea nemorensis quæ Serratula vulgò, TOURN. Jacea rubra major laciniola, L. H. Jacea aromatica vel caryophyllata, QUORUMD. *Serrette ou Sarrette.*

Jacea nigra pratensis, latifolia, C. B. & TOURN. Jacea nigra vulgaris capitata & squamata, J. B. *Jacée.*

Jacea orientalis patula, carthami facie, flore luteo magno, TOURN. *Plante dont la racine se nomme bēhen blanc.*

JACOBÆA foliis ferulaceis, flore minore, TOURNEF. *Achillée.*

Jacobæa vulgaris laciniata, C. B. & TOURN. *Jacobée ; Fleur de saint Jacques ; Herbe de S. Jacques.*

JALAPA ; Jalapium, OFFIC. *Jalap, racine d'Amérique.*

Jalapa flore purpureo, TOURNEF. *Belle de nuit.*

JASMINUM arabicum laurifolio, cujus semen, apud nos, *café* dicitur, M. A. S. *L'Arbre qui produit le café.*

Jasminum cæruleum mauritanum fortè, Ligustrum orientale, CÆSALP. *Lilas ou Lilac ; Syringa à fleur blanche ; Queue de renard des jardins.*

Jasminum mexicanum, sive Flos mexicanus multis, J. B. *Belle de nuit.*

JASPIS, off. Jaspis unicolor rubescens, WALLERII. *Jaspe.*

JAYAMA Hispaniolam habitantibus. *Ananas.*

JECICUCU Brasiliensibus, seu radix Mechoacan, MARCG. *Méchoacan, Rhubarbe blanche.*

JECORARIA, seu Hepatica fontana, TRAGI. *Hépatique commune.*

JETAIBA, PISON. *Arbre d'où découle la résine animé.*

JEUZBAVE, vel Jusbaque, SERAP. *Muscade, ou Noix muscade.*

JOTICACICA & Jetaïcica, Brasiliensibus. *Animé d'Occident ; Animé occidental ; Résine de courbaril.*

JUDAICA arbor, J. B. Arbor Judæ, DODON. *Gainier ; Arbre de Judas ou de Judée ; Arbre d'amour.*

JUDAICUS lapis, OFF. *Pierre de Judée.*

JUGLANS foliolis ovalibus
glabris subferratis, omni-
bus subæqualibus, LINN.
Noyer.

JUIUBÆ, off. *Jujubes, fruits
du jujubier.*

JULEPUS. *Julep.*

JUNCUS odoratus, PLINII.
Jonc odorant.

Juncus odoratus, seu Schæ-
nanthus, J. B. Juncus ro-
tundus aromaticus, C. B.
*Plante qui donne le jonc
odorant.*

Juncus rotundus, CELSI.
Jonc odorant.

JUNIPERUS fruticosa, Juni-
perus vulgaris, off. Juni-
perus vulgaris fruticosa,
C. B. & TOURN. Juniperus
vulgaris, baccis parvis pur-
pureis, J. B. Juniperus fo-
liis sessilibus patentibus,

LINNÆI. *Genevrier, ou
Geniévrier.*

Juniperus foliis adnatis oppo-
sitionibus concatenatis,
LINN. *Sabine, ou Sabinier
à feuilles de cyprès.*

Juniperus foliis quadrifariam
imbricatis acutis, ROY.
*Plante d'où découle l'en-
cens.*

JUPICANGA *Brasilensibus,*
PISON. *Plante dont la ra-
cine est la squine d'Occi-
dent.*

JUPITER CHYMICORUM.
Etain.

JUSBAQUE, SERAP. *Muscade
ou Noix muscade.*

JUSCULUM. *Bouillon.*

JUSQUIAMUS, off. *Jusquiame
noire; Hannebane.*

JUTAY, sive Tamarindus,
PISON. *Tamarinier.*



K E I

- K**ADANACU, H. M. *Plante qui fournit le suc nommé aloës hépatique.*
- Κάλαμος αρωματικός, DIOSC. & GALEN. Κάλαμος μυρεψικός, HIPPOC. *Calamus vrai.*
- KALI**, seu Soda, off. Kali majus cochleato semine, C. B. & TOURN. Kali magnum sedi medii folio, semine cochleato, LOBEL. Kali herba, BELLON. Kali ARABUM, seu MAURITANORUM. *Grande Soude ; Salicote ; Marie vulgaire.*
- Kali spinosum, off. Kali spinosum cochleatum, C. B. Kali spinosum, sive Tragus spinosus Matthioli, J. B. Kali spinosum foliis longioribus & angustioribus, TOURN. *Soude épineuse ; Salicote épineuse ; Marie épineuse.*
- KAMICHY** Insularibus, JONST. *Anhima, oiseau de proie du Brésil.*
- KANDEL**, SERAPION. *Coloquinte.*
- KANNA - GHORAKA**, id est Ghoraka dulcis Cingalensibus, HERM. *Arbre d'où découle la gomme-gutte.*
- Κάμφρα GRÆCOR. RECENTIOR. & AETH. *Camphre.*
- KARABE** ARABUM seu SERAPIONIS. *Bitume de Judee.*
- Κάρυον μυρεψικόν, GRÆCOR. RECENTIOR. *Muscade, ou Noix muscade.*
- Καρυοφύλλον, PAULI. *Girofle, ou Clous de girofle.*
- Κασία μέλαινα, ACTUAR. & GRÆCOR. *Casse solutive.*
- Κασὼρ, GRÆCOR. *Castor, ou Bievre.*
- Καταγματικά Φάρμακα. *Remedes catagmatiques ou contre les fractures.*
- Κατάπασμα. *Cataplasme ; on donne ce nom à des poudres odorantes.*
- Καταπλάσμα. *Cataplasme.*
- Καθαιρετικά Φάρμακα. *Remedes cathérétiques ou rongearis.*
- Καθάρτικα Φάρμακα. *Remedes cathartiques ou purgatifs.*
- KATHETH**, ARABUM. *Oliban ou Encens.*
- KATOU-INCHIKUA**, H. M. *Gingembre mâle.*
- KATOU-KATUA**, H. M. *Arbre qui porte la feuille indienne, ou Malabathrum.*
- KATUMARUNGH** ZEYLANENSIBUS. *Arbre qui produit l'espece de noix de ben nommé Mouringou.*
- Καυσικά Φάρμακα. *Remedes caustiques.*
- KAWORIKI**, JAPONUM. *Agallochum ; Bois d'aloës.*
- KEIRI**, off. *Giroflier jaune ; Violier jaune.*
- Κηλίδες, GRÆCOR. *Noix de galle.*

- LACTARIA** vel **Lactucaria** fruticosa, QUORUMDAM. *Tithymale des marais*; *Grande Esule*; *Turbith noir ou bâtard*.
- LACTUCA** agnina prima, TABERN. *Mâche*; *Blanchette*; *Poule grasse*; *Clairrette*; *Doucette*; *Accroupie*; *Salade de chanoine*.
- Lactuca** sativa capitata, off. **Lactuca** capitata, C. B. & TOURN. **Lactuca** sativa vulgaris capitata, J. B. **Lactuca** sativa, sevilis sive capitata, LOBEL. *Laitue pommée*.
- Lactuca** leporina, APULÆI. *Laitron*, ou *Laceron doux*; *Palais de lievre*.
- Lactuca** romana, off. **Lactuca** romana, longa, dulcis, J. B. **Lactuca** folio obscurius virente, semine nigro, C. B. **Lactuca** intybacea, GERARD. *Laitue romaine*; *Chicon*.
- Lactuca** sativa non capitata, off. **Lactuca** sativa, C. B. & TOURN. **Lactuca** sativa vulgaris non capitata, J. B. **Lactuca** sativa folio scariolæ, LOBEL. *Laitue non pommée*.
- Lactuca** sativa, maxima, austriaca, capitata, variegata, TOURNEF. **Lactuca** caryophyllacea vulgò, H. L. B. *Laitue panachée*; *Laitue de Silésie*.
- Lactuca** sylvestris, costâ spinosâ, off. C. B. **Lactuca** sylvestris, sive *Endivia multis dicta*, folio laciniato, dorso spinoso, J. B. **Lactuca** sylvestris, DODON. *Laitue sauvage*.
- Lactuca** ustularia, & *Ungula asiniana*, GERMANORUM, CORDI. *Tussilage*; *Pas d'âne*.
- LADA**, aliis *Molanga*, sive *Piper aromaticum*, PISON. *Poivrier*.
- Λάδανον, GRÆCOR. **Labdanum**, substance résineuse.
- LADANUM**, vel **Labdanum**, off. *Labdanum*, substance résineuse.
- Labdanum** creticum, PROSP. ALPIN. *Arbrisseau duquel découle le labdanum*.
- LADEN** & **Loden** ARABUM. *Labdanum*, substance résineuse.
- LAGOPODIUM**, sive *Pes leporis*, GERARD. *Petit Trefle des champs*; *Pied de lievre*.
- Lagopodium** flore luteo, TABERN. *Vulnéraire des paysans*.
- LAGOPUS**, off. **Lagopus**, vel *Trifolium arvense humile spicatum*, C. B. **Lagopus** trifolius quorumdam, J. B. **Lagopus**, sive *Pes leporinus*, MATTH. **Lagopus** & *Lotus campestris*, TRAGI. *Petit Trefle des champs*; *Pied de lievre*.
- LAGOPYRON** Hippocr. GESN. *Pied de chat*, plante.
- Lagopyron** Galeni, NONNULLOR. *Petit Trefle des champs*; *Pied de lievre*.
- LAGOPYROS** Hippocratis, NONNULLOR. *Petit Trefle*

des champs ; Pied de lievre.

LAGURUS paniculæ spiculis conjugatis ovatis, LINN. *Plante qui donne le jonc odorant.*

LAMIA, seu Canis carcharias, GESNER. *Requin ; Requier, Requiem ; grand Chien de mer ou marin ; Poisson à deux cents dents ; Lamie ou Poisson anthropophage ; Tiburon.*

LAMIUM album, off. Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo, PARK. Lamium album non foetens, folio oblongo, C. B. Lamium primum, sive Urtica iners, DODON. Lamium foliis cordatis, acuminatis, serratis, petiolatis, LINN. Lamium foliis dissitis, cordatis, obtusis, HALLER. *Ortie morte non puante ; Ortie blanche ; Ortie qui ne pique point.*

Lamium folio oblongo, flore rubro, PARK. & TOURN. Lamium purpureum non foetens, folio oblongo, C. B. *Ortie morte non puante, à fleurs purpurines.*

Lamium flore oblongo, luteum, C. B. Lamium luteo flore, sive Urtica iners tertia, DODON. *Ortie morte à fleurs jaunes.*

Lamium maximum sylvaticum, foetidum, C. B. *Grande Ortie puante.*

Lamium montanum melissæ folio, C. B. Lamium

pannonicum primum albo flore, CLUS. Lamium, PLINII. *Mélisse sauvage ou bâtarde ; Mélisse de montagne ou des bois ; Mélisse puante, ou qui sent la puanteise.*

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis *Dioscoridis*, C. B. Lamium rubrum, GERARD. Lamium vulgare, folio subrotundo, flore rubro, PARK. *Ortie morte puante.*

LAMPSANA vulgaris, officin. Lampsana domestica ; Soncho affinis, C. B. *Lampfane ; Herbe aux mamelles.*

LANARIA QUORUMD. *Savonnaire ou Savonnaire ; Saponniere ou Saponnaire.*

LANCEA Christi, vel Luciola, GESNER. *Petite Serpente ; Ophioglosse ; Langue de serpent ; Herbe sans couture.*

LANTANA vulgò, aliis Viburnum, J. B. Lantana, sive Viburnum, GERARD. *Viorne ; Hardeau ; Bourdene ou Bourdaine.*

LAPATHI acuti varietas, folio crispo, GERARD. *Patience sauvage frisée.*

LAPATHUM acetosum, sexu distinctum, foliorum sagittatorum hamis brevibus, HALLER. *Oseille ordinaire ; Oseille longue ; Vinette.*

Lapathum aquaticum folio cubitali, C. B. Lapathum aquaticum maximum, sive

- Hydrolapathum, J. B. Lapathum palustre, TABERN. Lapathum longifolium nigrum palustre, *sive* Britannica antiquorum vera, *vel* Hydrolapathum nigrum *Muntingii*, RAII. *Patience aquatique*, ou *Parelle de marais*.
- Lapathum folio acuto, crispo, C. B. & TOURN. Lapathum acutum crispum, J. B. Lapathum acutum, minus, PARK. *Patience sauvage frisée*.
- Lapathum folio acuto plano, C. B. & TOURN. Lapathum acutum, *sive* Oxylapathum, J. B. & DODON. Lapathum acutum *Gerardi*, RAII. Lapathum acutum majus, PARK. *Parelle*, ou *Patience sauvage ordinaire*.
- Lapathum folio minus acuto, C. B. Lapathum vulgare, folio obtuso, J. B. Lapathum sylvestre vulgatus, PARK. Lapathum sylvestre folio minus acuto, GERARD. *Patience sauvage à feuilles arrondies*.
- Lapathum hortense, seu Spinaria semine non spinoso, C. B. *Epinard mâle dont la graine n'est pas épineuse*.
- Lapathum hortense, seu Spinaria sterilis, C. B. *Epinard femelle ou stérile*.
- Lapathum hortense, seu Spinaria semine spinoso, C. B. *Epinard mâle dont la graine est épineuse*.
- Lapathum hortense folio oblongo, *sive* secundum *Dioscoridis*, C. B. Lapathum sativum, DODON. *Patience* ou *Parelle*.
- Lapathum majus, off. Lapathum hortense latifolium, C. B. Lapathum majus, *sive* Rhabarbarum monachorum, J. B. Lapathum sativum, *sive* Patientia, PARK. *Rhubarbe des moines*.
- Lapathum rotundifolium; Lapathum montanum, off. Lapathum folio rotundo, alpinum, J. B. & TOURN. Lapathum hortense rotundifolium, LOBEL. *Rhubarbe bâtarde*, ou *fausse Rhubarbe*.
- Lapathum sanguineum; Lapathum rubrum; Lapathum nigrum, off. Lapathum folio acuto rubente, C. B. & TOURN. Lapathum sanguineum, *sive* Sanguinis draconis herba, J. B. Lapathum rubens, DODON. *Patience rouge*, ou *Sang-dragon*.
- Lapathum sinuatum, off. Lapathum pulchrum bononiense, sinuatum, J. B. & TOURN. Lapathum parisiense sinuatum, H. R. P. *Lapathon-violon*, ou *Patience sinuée*.
- Lapathum spinaria dictum, OFF. *Epinard*.
- Lapathum unctuosum folio triangulo, C. B. *Bon Henri*.
- LAPIDES cancrorum. *Pierres d'écrevisses*, improprement nommés yeux d'écrevisses.

- LAPIS alcheron.** *Pierre qui se trouve dans la vésicule du fiel du bœuf.*
- Lapis aquilæ seu aquilinus.** *Pierre d'aigle.*
- Lapis armenus,** OFF. *Pierre d'Arménie.*
- Lapis bezoardicus.** *Bézoard.*
- Lapis bezoardicus fossilis,** J. DE LAET. *Lapis bezoardicus mineralis fossilis,* BOCCONE. *Bézoard fossile.*
- Lapis bononienis,** MONT. & DE LAET. *Pierre lumineuse, ou Phosphore de Bologne.*
- Lapis calaminaris,** OFFICIN. *Pierre calaminaire.*
- Lapis calcarius;** **Lapis calcareus** particulis scintillantibus, WALL. *Pierre à chaux.*
- Lapis ceratites,** GESNER. *Unicorne fossile.*
- Lapis cæruleus,** MATTH. *Pierre d'azur.*
- Lapis cyanus** sive lazuli, ALDROV. *Pierre d'azur.*
- Lapis gagates.** *Jais ou Jayet.*
- Lapis hæmatites,** OFF. *Pierre hématite.*
- Lapis heracleus.** *Aimant.*
- Lapis hibernicus,** off. MERRIAN. *Pierre d'Hibernie, ou Ardoise d'Irlande.*
- Lapis hystricis,** seu *Pedra del porco.* *Pierre de porc-épic.*
- Lapis illuminabilis,** ALDROV. *Pierre lumineuse, ou Phosphore de Bologne.*
- Lapis indicus nephriticus,** ALDROV. *Pierre néphrétique.*
- Lapis jaspis,** Achates antiquorum, *Agata* vulgò dictus. CUP. *Agate.*
- Lapis judaicus,** OFF. *Pierre de Judée.*
- Lapis lazuli pallidè cæruleus,** punctulis albus, WALL. *Pierre d'Arménie.*
- Lapis lyncis,** off. **Lapis lyncurius.** *Bélemnite ou Pierre de lynx.*
- Lapis lucidus,** MONT. *Pierre lumineuse, ou Phosphore de Bologne.*
- Lapis magnes,** MATTH. *Aimant.*
- Lapis Margarethæ,** NONNULOR. *Nombril marin; Umbilic marin; Nombril ou Fève de mer; Limaçon de mer.*
- Lapis nephriticus,** OFFICIN. *Pierre néphrétique.*
- Lapis obliidianus.** *Jais, ou Jayet.*
- Lapis, onyx dictus,** sive unguis humani candorem referens. *Onyx, pierre précieuse.*
- Lapis ossifragus,** BOET. *Ostéocolle.*
- Lapis pumex dictus,** C. H. C. *Pierre-ponce.*
- Lapis serpentinus.** *Pierre de serpent.*
- Lapis fissilis hibernicus,** CHARLET. *Pierre d'Hibernie, ou Ardoise d'Irlande.*
- Lapis scyrus,** ALDROV. *Pierre-ponce.*
- Lapis specularis,** off. **Lapis specularis,** seu *Glacies Mariæ,* KONIG. *Pierre*

spéculaire ; Verre de Moscovie.

LAPPA major, off. Lappa major, Arctium DIOSCORID. C. B. *La Bardane, ou Glouteron.*

Lappa minor, Xanthium DIOSCORID. C. B. *Petite Bardane ; petit Glouteron, ou Gletteron ; Glapelles.*

LAPPAGO aspera, OFFICIN. *Gratteron ; Rieble.*

Λάπις, GRÆCORUM. *Térébenthine de Venise ou des mélezes.*

LARIX folio deciduo conifera, J. B. Larix, C. B. & DODON. Larix folio deciduo, HALLER. *Térébenthine de Venise ou des mélezes.*

LASER & Laserpitium, PLIN. & DODON. *Assa-fœtida ; Merde au diable des Européens ; Manger des dieux des Asiatiques.*

LASERPITIUM ANGUILL. Laserpitium germanicum, LOBEL. *Livêche ou Ache de montagne.*

Laserpitium foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, LINNÆI. *Seséli commun ; Livêche ; Sermentaire.*

Laserpitium foliolis cordatis incis, LINN.

LATHYRIS, officin. Lathyris Dioscoridis, SCHW. Lathyris major, C. B. Lathyris major hortensis, Cataputia minor, PARK. *Tithymale à larges feuilles ; Epurge ; Catapuce ordinaire.*

LAUREOLA femina, off. & C. B. Laureola femina, seu Thymelæa lauri folio deciduo, TOURNEF. Laureola folio deciduo, sive Mezereon germanicum, J. B. Laureola femina, & Daphnoides crocea, H. L. *Lauréole femelle ; Bois gentil ; Thymélée femelle des pays froids.*

Laureola mas ; Laureola semper virens, off. Laureola semper virens flore viridi, quibusdam. Laureola mas, C. B. Laureola semper virens flore luteolo, J. B. *Lauréole mâle ; Thymélée mâle des pays froids.*

LAURO affinis, terebinthi folio, alta, ligno odorato, candido, flore albo. *Arbre de la Jamaïque d'où se tire un bois de rose.*

Lauro-cerasus, CLUS. *Laurier-rose ; Nérion ; Océandre ; Rosage ou Rosagine.*

LAURUS alexandrina, offic. Laurus alexandrina, fructu folio infidente, C. B. Laurus alexandrina, Chamædaphne, COLUMN. Laurus carpophyllos sive epiphyllocarpos, QUORUMD. *Laurier alexandrin ou d'Alexandrie*

Laurus camphorifera KÆMPF. Laurus foliis lanceolato-ovatis trinerviis, nervis supra basim unitis, LINN. *Arbre qui donne le camphre ordinaire ou du Japon.*

Laurus foliis enervibus, obversè ovatis, utrinque acutis,

LIGUSTRUM, off. & J. B. & TOURN. *Ligustrum germanicum*, C. B. *Troëne*.

Ligustrum ægyptiacum latifolium, C. B. *Alcanna vraie*.

Ligustrum orientale, fortè *Jasminum cæruleum mauritanum*, CÆSALP. *Lilas* ou *Lilac*; *Syringa* à fleur bleuâtre; *Queue de renard des jardins*.

LILAC, off. & J. B. & MATTH. & TOURN. *Lilach*, sive *Hambach ARABUM*, flore cæruleo, QUORUMD. *Lilas* ou *Lilac*; *Syringa* à fleur bleuâtre; *Queue de renard des jardins*.

LILIUM candidum, off. *Lilium album vulgare*, J. B. *Lilium album flore erecto & vulgare*, C. B. *Lilium album NICANDRI*, seu *Ambrosia*, ANGUILL. *Lilium foliolis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris*, LINN. *Lis*, ou *Lys blanc*.

Lilium convallium, C. B. & TOURN. *Lilium convallium vulgò*, J. B. *Lilium convallium flore albo*, PARK. *Lilium convallium vel vernum Theophrasti*, LOBEL. *Muguet*; *Lis des vallées*.

LIMAX ruber, off. *Limax quartus, subrufus, montanus*, LISTER. *Limax magna Germanis*, colore rufo, ALDROV. *Limax subrufus*, LINN. *Limax major rubicunda terrestris*,

E. G. *Limace rouge*; *Limas*; *Limaçon rouge nud & sans coquille*; *Licoche ordinaire*.

Limax terrestris, OFF. *Limaçon*; *Colimaçon ordinaire des jardins*; *Escargot commun*; *Limas à coquille*.

LIMNESSIUM, sive *Centaurioides*, CORDI. *Gratiolle* ou *Herbe à pauvre homme*.

LIMON, off. *Limon vulgaris*, FERR. *Limonier*, arbre.

LIMONIA malus, off. *Limonia malus acida*, C. B. *Limonia malus*, J. B. *Limonier*, arbre.

LIMONIUM malum. *Limon*, fruit du limonier.

Limonium pratense, TRAGI. *Ménianthe*; *Trefle de marais*; *Trefle d'eau* ou *aquatique*; *Trefle de castor*.

Limonium sylvestre, TRAGI. *Pyrole*, ou *Verdure d'hiver*.

LINARIA segetum, nummulariæ folio villosa, TOURNEF. *Velvete*; *Véronique femelle*.

Linaria vulgaris lutea, flore majore, C. B. *Linaria vulgaris nostras*, PARK. *Linnaire* ou *Lin sauvage*.

LINGUA cervina, off. *Lingua cervina vulgi*, sive *Phyllitis*, J. B. *Scolopendre vulgaire*, ou *Langue de cerf*.

Lingua hircina, QUORUMD. *Vipérine*, ou *Herbe aux vipères*.

Lingua serpentina, sive *Ophioglossum*, PARK. & CÆSALP.

Petite Serpentaire; Ophio-glosse; Langue de serpent; Herbe sans couture.

Lingua viperina, QUORUMD. *Petite Serpentaire; Ophio-glosse; Langue de serpent; Herbe sans couture.*

LINIMENTUM. *Liniment.*

LINKIA terrestris gelatinosa, membranacea, vulgatissima, ex pallido & virescente fulvâ, MICHELI. *Mousse membraneuse; Nostoch des Allemands.*

LINNÆA. *Campanule à fleur de serpolet.*

LINOZOSTIS, sive Parthenion. *Mercuriale mâle; Foirole; Vignoble ou Vignette.*

LINUM catharticum, off. Linum pratense floribus exiguis, C. B. Linum minimum, vel Alsine verna, glabra, flosculis albis, J. B. Linum sylvestre catharticum, GERARD. Linum sylvestre catharticum, (seu Chamaelinum CLUSII, flore albo) PARK. *Lin sauvage purgatif.*

Linum sativum, C. B. & Tourn. Linum sativum vulgare caeruleum, LOBEL. Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis, angulatis, capsulis mucronatis, LINN. *Lin, plante.*

LIQUIDAMBAR arbor, seu styraciflua, aceris folio, fructu tribuloïde, PLUCK. Liquidambar, GRÆCOR. Liquidambar foliis palmatis

angulatis, LINN. *Arbre d'où coule le storax ou styrax.*

LIQUIDAMBARI arbor, sive Styracifera, aceris folio, fructu tribuloïde, id est pericarpio orbiculari ex quàmplurimis apicibus coagmentato semen recondens, PLUCK. Liquidambari indici arbor, seu Xochiocotzo-quahuitl, HERNAND. *Arbre d'où découle le liquidambar.*

LIQUIDAMBARUM, off. Liquidambar, suc résineux.

LIQUIRITIA, officin. Réglisse.

Λιόδενδρον, DIOSCORID. Corail.

LITHONTRIPTICA medicamenta. *Remedes lithontriptiques.*

Λίθος αιματίτης, GRÆCOR. Pierre hématite.

Λίθος γαγατης. Jais ou Jayet.

Λίθος κυανός, GRÆCOR. Pierre d'azur.

LITHOSPERMUM arundinaceum, off. Lithospermum arundinaceum fortè Dioscoridis & Plinii, C. B. *Larme de Job, espece de gremil.*

Lithospermum erectum, off. Lithospermum majus erectum, C. B. Lithospermum, sive Milium folis, J. B. Lithospermum feminibus lævibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis, LINNÆI. Lithospermum foliis subtus nervosis, floribus ex alis

- foliorum exeuntibus, HAL-
LER. *Gremil*, ou *Herbe*
aux perles.
- Lithospermum repens, off.
Lithospermum minus re-
pens, latifolium, C. B. &
TOURNEF. Lithospermum
majus DODONÆI, flore
purpureo, semine anchusæ,
J. B. Lithospermum majus
DODON. *Gremil rampant*.
- Lithospermum villosus, cau-
libus erectis simplicissimis,
LINN. *Alcanna faux*.
- LITHOTOMI cavitare latente
donati, WALL. *Pierre*
d'aigle.
- LITUS. *Liniment*.
- LOC vel Lac, ARABUM. *Lac-*
que ou *Laque*.
- LOCUSTA, off. Locusta vi-
ridis major, RAIL. *Grande*
Sauterelle verte.
- Locusta herba prior, J. B.
Locusta herba foliis ferè
oleæ, GESNER. *Mâche*;
Blanchette; *Poule grasse*;
Clairette; *Doucette*; *Ac-*
croupie; *Salade de cha-*
noine.
- LODEN & Laden, ARABUM.
Labdanum, *substance rési-*
neuse.
- LOLIGO sepia, MERRIAN.
Seche ou *Seiche*; *Bouf-*
fron.
- LOLIUM, Nigella arvensis
falsò, QUORUMD. *Nielle*
des bleds; *fausse Nielle*;
Nielle bâtarde; *Alesne*.
- LONICERA floribus capitatis
terminatricibus, floribus
omnibus distinctis, LINN.
Chevre-feuille.
- Lonicera pedunculis bifloris,
foliis ovatis, obtusis, in-
tegris, LINN. *Chevre-*
feuille qui se cultive dans
les jardins.
- LOOCH, seu Eclegma. *Looch*
ou *Eclegme*.
- LOTI, sive Trifolii species,
CORDI. *Melilot*, ancien-
nement *Mirlirrot*.
- LOTO affinis, vulneraria pra-
tensis, C. B. *Vulnéraire*
des paysans.
- LOTUS, sive Melilotus pen-
taphyllos minor glabra,
C. B. & TOURNEF. Lotus
corniculata glabra minor,
J. B. Lotus pentaphyllus,
GESNER. Lotus flore her-
baceo, florum capitulo de-
presso, leguminibus decum-
bentibus teretibus, LINN.
Lotus sylvestris, NONNUL-
LOR. *Petit Lotier*, ou *Tre-*
fle sauvage jaune.
- Lotus & Lagopus campestris,
TRAGI. *Petit Trefle des*
champs; *Pied de lievre*.
- Lotus hortensis, odora, off.
C. B. Lotus sativa odorata,
annua flore cæruleo, J. B.
Lotus hortorum odora,
LOBEL. *Lotier odorant*;
Trefle musqué; *faux Baume*
du Pérou.
- Lotus latifolia, DALECAMP.
Vulnéraire des paysans.
- Lotus pentaphyllos filiquosus
villosus, C. B. & TOURN.
Lotus incana, sive Oxytri-
phyllum Scribonii Largi,
GERARD. Lotus hæmor-
rhoïdalis major, sive Tri-
folium hæmorrhoidale

- majus, PARK. Lotus sylvestris, MATTH. Lotus filiquosa, NONNULL. *Trefle hémorrhoidal*, ou *Lotier hémorrhoidal*.
- Lotus urbana, MATTH. *Mélilot*, anciennement *Mirlot*.
- LUCIDUS lapis, MONT. *Pierre lumineuse*, ou *Phosphore de Bologne*.
- LUCIOLA, vel Lancea Christi, GESNER. *Petite Serpente*; *Ophioglosse*; *Langue de serpent*; *Herbe sans couture*.
- LUCIUS, off. *Brochet*, poisson.
- LUJULA, off. & FRACAST. *Pain à coucou*; *Alléluia*.
- LUMBRICI terreni, BOSSCH. *Vers de terre*; *Lombrics*.
- LUMBRICUS, off. Lumbricus terrestris, JONST. Lumbricus terrenus, SCHROD. Lumbricus lævis, LINN. Lumbricus terrestris, major, RAI. *Ver de terre*; *Lombric*; *Achée* ou *Aschée*; *Lesche*.
- LUNA. Les Chymistes ont donné ce nom à l'argent.
- LUNARIA major, siliquâ rotundiore, J. B. Lunaria bulbosa, seu Rhaphanitis, QUORUMD. Lunaria odorata seu regia. *Grande Lunaire*; *Bulbonach*; *Médaille*; *Satinée*; *Satin blanc*; *Passe-satin*.
- LUPARIA nigra, seu lupi radix. *Aconit bleu*; *Tue-loup*; *Napel*; *Coqueluchon*; *Capuchon*; *Capuce de moine*; *Madriettes*.
- LUPI radix. Vid. LUPARIA.
- LUPINUS, off. Lupinus sativus flore albo, C. B. Lupinus vulgaris, semine & flore albo, sativus, J. B. Lupinus calycibus alternis, appendiculis lateralibus nullis, LINN. *Lupin*.
- LUPULUS, off. Lupulus mas & femina, C. B. Lupulus salictarius, GER. Lupulus salictarius spontaneus & Vitis Septentrionalium, LOBEL. *Houblon*.
- LUPUS LATINOR. Lupus vulgaris; Lupus terrestris communis sive vulgaris, QUORUMD. *Loup*.
- LUPUS fluviatilis. *Brochet*, poisson.
- LUPUS marinus, NONNULL. *Veau marin* ou *Phocas*.
- LUPUS varius, NONNULLOR. *Truite ordinaire* ou *des rivières*.
- LUTEA Plinii, QUIBUSDAM. *Gaude*; *Herbe jaune* ou *à jaunir*.
- LUTEOLA herba, salicis folio, C. B. & TOURNEF. *Gaude*; *Herbe jaune* ou *à jaunir*.
- LUTRA, offic. Lutra digitis omnibus æqualibus, LINN. Lutra castanei coloris, BRISSON. *Loutre*.
- LUTRIS. *Loutre*.
- LUTRIX. *Loutre*.
- LUTUM herba, DODON. *Gaude*; *Herbe jaune* ou *à jaunir*.
- LYCHNIS agria & Flos frumenti, BRUNSF. *Bleuet* ou *Bluet*; *Blavéole*; *Aubifoin*;

- acutis, integris, annuis,
LINN. *Arbre qui donne le benjoin.*
- Laurus foliis enerviis obversè ovatis obtusis, LINN. *Arbre qui donne la cannelle blanche, ou Ecorce de Winter.*
- Laurus foliis integris & trilobis, LINN. *Arbre dont le bois se nomme sassafras.*
- Laurus foliis lanceolatis trinerviis, nervis supra basim unitis, LINN. *Arbre qui fournit la casse en bois.*
- Laurus pusilla, sive Chamædaphne, LOBEL. *Lauréole femelle; Bois gentil; Thymélée femelle des pays froids.*
- Laurus regia, off. Laurus latifolia, Δαφνὴ πλατυφύλλεα Dioscoridis, C. B. Laurus latifolia mas & femina, *Laurier royal.*
- Laurus rosea, Oleander, LOBEL. *Laurier-rose; Nérion; Oléandre; Rosage ou Rosagine.*
- Laurus vulgaris, off. C. B. Laurus mas & femina, TABERN. Laurus tenuifolia, MATT. Laurus foliis lanceolatis, venosis, perennantibus, floribus quadrididis divisis, LINN. *Laurier franc.*
- Laurus zeylanica, baccis calyculatis, HERMAN. & RAIL. *Arbre dont la seconde écorce est la cannelle.*
- LAVANDULA, aut Lavandula major, off. Lavandula latifolia, C. B. Lavandula
- foliis lanceolatis integris, spicis nudis, LINN. *Lavande mâle; Spic; Aspic; Nard commun.*
- Lavandula minor; Lavandula angustifolia, off. C. B. Lavandula brevior folio, & spica, CLUS. *Lavande femelle.*
- Lavandula, OFF. *Lavande mâle; Spic; Aspic; Nard commun.*
- LAVER DIOSCORIDIS. *Béhen ou Ache d'eau.*
- LAWSONIA ramis inermibus, LINN. *Alcanna vraie.*
- LAZULI lapis pallidè cæruleus, punctulis albis, WALKER. *Pierre d'Arménie.*
- Lazuli lapis obscurè cæruleus, punctulis pyritaceis, WALKER. *Pierre d'azur.*
- LENS arvensis minor; Lens vulgaris, off. Lens vulgaris semine subrufo, C. B. *Petite Lentille.*
- Lens palustris & Lenticula palustris, officin. Lens palustris, J. B. Lens lacustris, DODON. *Lentille d'eau ou de marais.*
- LENTICULA palustris, off. Lenticula palustris vulgaris, C. B. *Lentille d'eau ou de marais.*
- Lenticula marina, off. Lenticula marina serratis foliis, GERARD. & PARK. *Herbe flottante, ou Lentille de mer.*
- LENTISCUS vulgaris, C. B. *Lentisque, arbre.*
- LEO, LATINOR. *Lion.*
- Λέων, GRÆCOR. *Lion.*

LEONTIDEIRAN. *Agate.*

LEONTION. *Agate.*

LEONTOCATON, QUORUMD.
Polion de montagne à fleurs jaunes.

LEONTODON calyce infernè
reflexo, LINN. *Pissenlit ;*
Dent de lion.

LEONTOPODIUM, BRUNSF.
Pied de lion ; Alchimille.

LEONURUS foliis caulinis lan-
ceolatis trilobis, LINN.
Agripaume.

LEPIDIUM hortense, OFFIC.
& ANGUILL. *Lepidium gra-*
mineo folio, sive Iberis,
TOURNEF. *Passerage sau-*
vage ; Cresson sauvage.

Lepidium vulgare, off. Lepi-
dium latifolium, C. B. &
TOURN. *Lepidium Pauli,*
J. B. *Lepidium Plinii, DO-*
DON. *Lepidium vulgare,*
sive Piperitis, PARK. Le-
pidium, Pauli Æginetæ
& Lobelii, GERARD. *Pas-*
serage.

Λεπιδωρύχια φάρμακα. *Remedes*
résolutifs ou atténuants.

LEPUS, off. *Lepus terrestris,*
MATTH. *Lepus caudâ ab-*
ruptâ, pupillis albis, LIN-
NÆI. *Lepus vulgaris cine-*
reus, KLEIN. Lepus cau-
datus, ex cinereo rufus,
BRISSEON. *Lievre.*

Lepus caudâ brevissimâ, pu-
pillis rubris, LINN. Lepus
caudatus, obscurè cine-
reus, BRISSEON. Lapin.

LER, ARABUM. *Myrrhe.*

LEUCACHATES. *Agate.*

LEUCANTHEMUM DIOSCOR.
Camomille ordinaire.

Leucanthemum canariense ;
foliis chrysanthemi, py-
rethri sapore, TOUR-
NEF. *Pyrethre, seconde*
espece.

Leucanthemum odoratius,
C. B. *Camomille romaine.*

Leucanthemum vulgare,
TOURN. *Grande Margue-*
rite ; grande Pâquerette ;
Œil de bœuf.

LEUCO-NARCISSOLIRION pra-
tense vernal, LOBEL.
Perce-neige ; Violier de
Février ou de la Chande-
leur ; Violier bulbeux ; Cam-
panes blanches, Baguenaud-
dier d'hiver ou de prin-
temps.

LEUCOIUM ; *Leucoïum lu-*
teum, off. Leucoïum lu-
teum vulgare, C. B. Leu-
coïum luteum vulgè Cheiri
flore simplici, J. B. Leu-
coïum aureum, MATTH.
Giroflier jaune ; Violier
jaune.

Leucoïum bulbosum vulga-
re, C. B. Leucoïum bul-
bosum, hexaphyllon, cum
unico flore, rarius bino,
J. B. *Leucoïum bulbosum*
serotinum, GERARD. Leu-
coïum bulbosum præcox,
majus, PARK. Perce-neige ;
Violettes de Février ou de
la Chandeleur ; Violier bul-
beux ; Campanes blanches ;
Baguenaudier d'hiver ou
de printemps.

Leucoïum & Viola purpurea,
FRICHS. *Leucoïum mos-*
chatum QUORUMDAM.
Julienne ou Julianne ;

- Viola giroflée des dames ; Giroflée musquée.*
- LEVISTICUM, Ligusticum foliis apii, OFF. *Livèche, ou Ache de montagne.*
- LIBANARIA, NONNULLOR. *Romarin ; Encensier.*
- Al-Bavos, THEOPH. & DIOSC. *Oliban ou Encens.*
- LIBANOTIS coronaria, sive Rosmarinum vulgare, PARK. *Romarin ; Encensier.*
- Libanotis fertilis THEOPH. (*quæ fortè est*) Ligusticum vulgare, C. B. *Livèche, ou Ache de montagne.*
- Libanotis latifolia altera, seu vulgatiore, C. B. *Gentiane blanche.*
- Libanotis foliis tenuissimè pinnatis, laciniis petiolatis, HALLER. *Daucus de Crete.*
- Libanotis altera quorundam, aliis dicta *Cervaria nigra*, J. B. *Grand Persil de montagne ou sauvage.*
- Al-Bavardov, HIPPOCR. *Oliban ou Encens.*
- LICHEN arboreus, off. Lichen foliaceus repens laciniatus, obtusus, glaber, suprâ lacunofus, subtus tomentosus, LINN. *Pulmonaire de chêne.*
- Lichen foliaceus repens, lobatus, obtusus, planus, subtus venosus, peltâ marginali ascendente, LINN. *Mousse contre la rage.*
- Lichen gelatinosus fugax major, RUPP. *Mousse membraneuse ; Nostoch des Allemands.*
- Lichen imbricatus, foliis multifidis, glabris, obtusis, canis, punctis vagis eminentibus, LINN. *Mousse de crâne humain ; Usnée humaine.*
- Lichen islandicus, LINN. *Lichen d'Islande ; Mousse purgative ; Mousse des phthiques ou pulmoniques ; Mousse de Suede ou de Laponie ; Mousse des rennes ; Mousse d'Islande des boutiques.*
- Lichen islandicus tenuissimus. *Lichen d'Islande très fin.*
- Lichen petraeus, off. Lichen petraeus latifolius, sive Hepatica fontana, J. B. *Lichen ; sive Hepatica vulgaris, PARK. Hépatique commune.*
- LICHENOIDES digitatum cinereum lactucæ foliis sinuosis, DILL. *Mousse contre la rage.*
- Lichenoïdes peltatum, arborescens, maximum, platyphyllum, DILL. *Pulmonaire de chêne.*
- Lichenoïdes vulgatissimum, cinereo-glaucum, lacunosum & cirrhosum, DILL. *Mousse de crâne humain ; Usnée humaine.*
- LIGNI colubrini tertium genus in Malabar, vastæ arboris magnitudine, ACOSTÆ. *Arbre qui porte la noix vomique.*
- LIGNUM, seu Arbor fragrans. *Agallochum, bois d'aloës.*
- Lignum aloës. *Agallochum, bois d'aloës.*

- Lignum aloës mexicanum ,
G. CAMELLI. *Troisième*
espece de bois d'aloës , ou
d'agallochum , suivant G.
BAUHIN.
- Lignum aloës vulgare , OFF.
Seconde espece de bois d'a-
loës , ou d'agallochum , sui-
vant G. BAUHIN.
- Lignum aquilæ *Agallochum ;*
Bois d'aloës.
- Lignum brasilianum rubrum.
Bois du Brésil , ou Bois de
Fernambouc.
- Lignum campefcianum. *Bois*
de Campeche ou de la Ja-
maïque.
- Lignum carabaccium , BA-
GLIVI. *Bois carabacci.*
- Lignum colubrinum. *Bois de*
couleuvre.
- Lignum colubrinum CLUSII ,
Pao de cobra dictum , fortè
tertium ACOSTÆ. Arbre
qui porte la noix vomique.
- Lignum ebeni. *Bois d'ébene.*
- Lignum ferri. *Bois de fer.*
- Lignum indicum. *Bois d'Inde.*
- Lignum indicum , QUORUM-
DAM. *Gaiac ; Bois de*
gaiac ; Bois saint.
- Lignum moluccense , foliis
malvæ , fructu avellanæ
minore , cortice molliore
& nigricante , *Pavana in-*
colis , C. B. Arbrisseau qui
produit ce qu'on appelle
Graine du ricin indien , ou
Pignons d'Inde , ou Pi-
gnons de Barbarie , ou
Grains de Tilli ou des Mo-
luques.
- Lignum nephriticum peregri-
num , aquam cæruleam

- reddens , C. B. *Bois né-*
phrétique.
- Lignum odoratum candidum.
CÆSALP. *Santal blanc.*
- Lignum paradisi. *Agallo-*
chum ; Bois d'aloës.
- Lignum pavanum , sive Sassa-
fras , J. B. *Sassafras.*
- Lignum rhodium. *Bois de*
Rhodes , ou de rose , ou
Bois de Chypre.
- Lignum sanctæ Crucis. *Agal-*
lochum ; Bois d'aloës.
- Lignum sanctæ Crucis. *Gui*
commun ; Gui de chêne.
- Lignum sanctum , QUORUM-
DAM. *Gaiac ; Bois de*
gaiac ; Bois saint.
- Lignum sanctum , seu Hoaxa-
can , HERNAND. *Gaiac à*
fleurs bleues dentelées dont
le fruit est quadrangulaire.
- Lignum sanum. *Garou ; Thy-*
mélée de Montpellier ; Thy-
mélée à feuilles de lin ;
Trentanel ; Lin sauvage
ou bâtard ; sain bois par
les habitants du l'Aunis ;
Chamélée noire à feuilles
déliées ; Bois d'oreilles.
- Lignum tortuosum & prin-
ceps vegetabilium , QUO-
RUM DAM. *Vigne culti-*
vée.
- LIGUSTICUM ; off. *Ligusticum*
quod seseli officinarum ,
C. B. Séséli commun ; Li-
vêche ; Sermontaine.
- Ligusticum foliis apii , off. *Li-*
gusticum vulgare , an Li-
banotis fertilis Theophrasti,
C. B. Ligusticum vulgare ,
foliis apii , J. B. Livêche ,
ou Ache de montagne.

- Alcée*, ou *Mauve sauvage*.
- Malva vulgaris*, flore majeure, folio sinuato, J. B. & TOURN. *Malva sylvestris*, folio sinuato, C. B. *Malva sylvestris major*, TABERN. *Malva erratica*, vel *Malva equina*, BRUNSF. *Malva caule procumbente*, foliis cordato-orbicularibus, obsoletè quinquelobis, LINN. *Mauve commune*, ou grande *Mauve*.
- Malva vulgaris*, flore minore, off. *Malva vulgaris*, flore minore, folio rotundo, J. B. & TOURN. *Malva sylvestris*, folio rotundo, C. B. *Malva sylvestris minor*, TABERN. *Malva sylvestris repens pumila*, LOBEL. *Petite Mauve*.
- MALVAVISCUS*, off. *Guimauve*.
- MANANAOG*, INDOR. *Fève de S. Ignace*.
- MANATI*, off. & SCHROD. *Manatiphocæ* genus, CLUS. *Manati*, seu *Vacca marina*, RAIL. *Lamantin* ou *Lamentin*; *Manate*, *Manatée*, ou *Manati*; *Bœuf marin*; *Vache marine*.
- MANATUS*, RONDELET. *Lamantin* ou *Lamentin*; *Manate*, *Manatée* ou *Manati*; *Bœuf marin*; *Vache marine*.
- MANDRAGORA* femina seu nigra, offic. *Mandragora* flore subcæruleo, purpurascens, C. B. *Mandragora femina*, J. B. *Mandragore femelle*.
- Mandragora mas* seu candida, off. *Mandragora fructu rotundo*, C. B. *Mandragore mâle*.
- MANDRAGORAS* femineus, PARK. *Mandragore femelle*.
- Mandragoras mas*, J. B. *Mandragoras albus* seu masculus, CORDI. *Mandragore mâle*.
- MANGARATIA*, PISON. *Plante dont la racine est le gingembre*.
- MANGÆ* affinis, flore parvostellato, nucleo majore ossæo. *Ambalam*, arbre des Indes.
- MANGLE* pyri foliis cum siliquis longis, ficui indicæ affinis, SLOANE. *Mangle*.
- MANGLAS* aquatica, foliis subrotundis & punctatis, PLUMM. *Mangle*.
- MANGOSTANA*, RUMPH. *Mangostans*, fruit des Indes.
- MANIA*, QUORUMD. *Jusquiame noire*; *Hannebane*.
- MANIELLA-KUA*, H. M. *Plante dont la racine s'appelle Curcuma long*; *Souchet des Indes*; *Safran des Indes*.
- MANIGUETTA* & *Meleguetta*. *Maniguette* ou *Méléguette*; *Graine de paradis*.
- MANJA-KUA*, H. M. *Plante dont la racine est appelée Curcuma rond*.

MANNA, *seu* Ros calabrinus ,
OFF. *Manne*.

MARATHRO-PHYLLUM,
caudâ porcinâ , NONNULL.
*Queue de pourceau; Fenouil
de porc; Peucedane.*

MARATHRUM, *sive* Fœni-
culum vulgatus, LOBEL.
Fenouil commun.

Marathrum vulgatus dulce,
seu Fœniculum, LOBEL.
Fenouil doux.

MARCASSITA pallida. Zinc,
demi-métal.

Marcassita saturnina. Nom
*que les chymistes ont donné
à l'antimoine.*

MARCHASITA argentea. Bis-
muth, *demi-métal.*

MARGA, off. *Marne; Aga-
ric minéral.*

Marga ochrocea rubra, LIN-
NÆI. *Craie rouge; Crayon
rouge; Sanguine.*

MARGARITA. *Perle.*

MAJORANA sylvestris, PARK.
*Origan commun ou grand
Origan; Marjolaine sau-
vage ou bâtarde; Marjo-
laine d'Angleterre.*

MARMOR solubile, particulis
micantibus arenaceis, LIN-
NÆI. *Pierre à chaux.*

MARMOTA, ITALIS. Mar-
mota alpina. *Marmote.*

MARRUBIASTRUM, TABERN.
Marrube noir.

MARRUBIUM album, C. B.
& TOURN. & J. B. Marru-
bium, *sive* Prassium album,
TABERN. Marrubium den-
ticulis calycinis setaceis
uncinatis, LINN. *Marrube
blanc.*

Marrubium aquaticum, Pa-
nax coloni, GERARD. *Pe-
tite Ortie puante.*

Marrubium Cardiacum dictum,
H. O. Marrubium Car-
diaca dictum, fortè pri-
mum Theophrasti, C. B.
Agripaume.

Marrubium nigrum foetidum,
Ballote Dioscoridis, C. B.

Marrubium nigrum, *sive*
Ballote, J. B. *Marrube
noir.*

MARS, CHYMICOR. Fer,
métal.

MARTES domestica, GESN.
Martes saxorum non fa-
garum, seu domesticus,
KLEIN. Martes, aliis Foy-
na, RAII. *Fouine.*

MARUM, *sive* Majorana, DO-
DONEI. *Marjolaine vul-
gaire.*

Marum mastich, Gallorum
& Anglorum, LOBEL. Ma-
rum vulgare, Clinopo-
dium, DODON. Marum,
GERARD. *Marum mastich.*

Marum verum; Marum COR-
TUSI, off. & J. B. *Vrai
Marum.*

MASTICATORIA medicamen-
ta. *Remedes masticatoires.*

Μαστιχὴ ἀκανθιδική, THEOPHR.
*Larme qui découle de la
carline gommeuse, ou Cha-
méléon.*

MASTICHINA, GALLORUM
Marum mastich.

MATER perlarum, officin.
SCHROD. & DALE. *Nacre
de perles, Mere de perles;
Mere-perle; Huître à l'é-
caille nacrée.*

Mater vini seu nectaris, QUORUMD. *Vigne cultivée.*

MATRICARIA alpina, chamæmeli foliis, C. B. *Especce de matricaire qui croît sur le sommet des Alpes.*

Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis, margine æqualibus, LINN. *Camomille romaine.*

Matricaria receptaculis hæmisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis, LINN.

Matricaria vulgaris seu sativa, C. B. Matricaria, vulgò minus Parthenium, J. B. Matricaria foliis compositis planis, foliis ovato-incisis, pedunculis ramosis, LINN. *Matricaire ou Espargoute.*

MATRISALVIA, TABERN. *Orvale ; Toute-bonne des prés ou sauvage ; Sclarée.*

Matrisalvia major, QUORUMD. *Orvale ; Toute-bonne.*

MATRISYLVA, off. *Chevre-feuille.*

Matrisylva, TRAGI. *Muguet des bois ; petit Muguet ; Hépatique étoilée.*

MATURANTIA medicamenta. *Remedes maturatifs.*

MAYS, TOURN. *Maïs, Blé de Turquie.*

MAZAMA, seu Cervus, HERNAND. *Chevre du bézoard occidental.*

MECHOACANNA, off. *Méchoacan ; Rhubarbe blanche.*

Mechoacanna americana, off. *Jalap, racine d'Amérique.*

MEDICA malus, sive Cidromela, LOBEL. *Citronnier.*

MEDICAMENTA absorbentia. *Remedes absorbants.*

Medicamenta abstergentia. *Remedes abstergents.*

Medicamenta acerba. *Remedes acerbes.*

Medicamenta acescentia. *Remedes acescents.*

Medicamenta acida. *Remedes acides.*

Medicamenta acoustica. *Remedes acoustiques.*

Medicamenta acria. *Remedes âcres.*

Medicamenta agglutinantia. *Remedes agglutinatifs.*

Medicamenta alexipharmaca. *Remedes alexipharmiques.*

Medicamenta alexiteria. *Remedes alexiteres.*

Medicamenta alterantia. *Remedes altérants.*

Medicamenta amara. *Médicaments amers.*

Medicamenta anacathartica. *Remedes expectorants.*

Medicamenta analeptica. *Remedes analeptiques.*

Medicamenta anodyna. *Remedes anodynus.*

Medicamenta antalgica. *Remedes antalgiques ou contre les douleurs.*

Medicamenta antaphrodisiaca, vel antaphroditica.

- Remedes antaphrodisiaques, ou qui éteignent la vivacité des desirs amoureux.*
 Medicamenta antarthritica.
Remedes antarthritiques, ou contre la goutte.
 Medicamenta antasthmatica.
Remedes antasthmatiques, ou contre l'asthme.
 Medicamenta antemetica. *Remedes anti-émétiques, ou contre le vomissement excessif.*
 Medicamenta antephtaltica.
Remede antéphialtiques, ou contre le cochemar.
 Medicamenta antidynterica.
Remedes antidyntériques, ou contre la dysenterie.
 Medicamenta anthypnotica.
Remedes anthypnotiques, ou contre le sommeil excessif.
 Medicamenta anthypochondriaca. *Remedes anthypochondriacs, ou contre le sommeil excessif.*
 Medicamenta anthysterica.
Remedes anthystériques, ou contre les vapeurs.
 Medicamenta antiacida. *Remedes antiacides.*
 Medicamenta antiapoplectica. *Remedes antiapoplectiques, ou contre l'apoplexie.*
 Medicamenta antiasthmatica.
Remedes contre l'asthme.
 Medicamenta antiepileptica.
Remedes antiépileptiques, ou contre l'épilepsie.
 Medicamenta antihectica. *Remedes antihectiques, ou contre la fièvre hectique.*

- Medicamenta antihydrica.
Remedes contre l'hydropisie.
 Medicamenta antiloimica.
Remedes contre la peste.
 Medicamenta antimelancholica. *Remedes antimélancholiques, ou contre la mélancholie.*
 Medicamenta antinephritica.
Remedes antinéphrétiques, ou contre les maladies des reins.
 Medicamenta antiparalytica.
Remedes antiparalytiques, ou contre la paralysie.
 Medicamenta antiphthifica.
Remedes contre la phthisie.
 Medicamenta antipleuretica.
Remedes contre la pleurésie.
 Medicamenta antipodagrica.
Remedes contre la goutte.
 Medicamenta antiputrida. *Remedes antiputrides, ou contre la pourriture.*
 Medicamenta antipyica. *Remedes antipyiques, ou contre la suppuration trop abondante.*
 Medicamenta antipyretica.
Remedes antipyrétiques, ou contre la fièvre.
 Medicamenta antipyrotica.
Remedes antipyrotiques, ou contre la brûlure.
 Medicamenta antiscorbutica.
Remedes antiscorbutiques, ou contre le scorbut.
 Medicamenta antiseptica. *Remedes antiseptiques, ou contre la pourriture.*
 Medicamenta antispasmodica. *Remedes antispasmodiques, ou contre les convulsions.*

Medicamenta

Péroole ; Barbeau ; Casselunette.

Lychnis coronaria Dioscoridis, sativa, flore dilutè rubente, C. B. & TOURN.

Lychnis coronaria, offic.

Lychnis coronaria rubra simplex, P. *Passe-fleur.*

Lychnis segetum major, C. B.

Lychnis sive Lychnoides segetum, & *Nigellastrum*, PARK. *Nielle des bleds ; fausse Nielle ; Nielle bâtarde ; Alesne.*

Lychnis sylvestris quæ Saponaria vulgò, TOURNEF.

Lychnis, *Saponaria dicta* ;

Lychnis fullonia, QUORUMD. *Savonnaire* ou *Savonnaire* ; *Savonnaire* ou *Savonnaire.*

LYCNOIDES segetum & Nigellastrum, PARK. *Nielle des bleds ; fausse Nielle ; Nielle bâtarde ; Alesne.*

LYCOPERDASTRUM tuberosum arrhizon, fulvum, cortice duriorè, crasso & granulato, medullâ ex albo purpurascente, semine nigro crassiorè, MICHEL. *Truffe de cerf.*

LYCOPERDON, off. *Lycoperdon vulgare*, TOURN. *Lycoperdon subrotundum laceratum dehiscens*, LINN. *Vesse de loup.*

Lycoperdon alpinum maximum cortice lacero, TOURNEF. *Autre espece de vesse de loup.*

Lycoperdon solidiusculum centro farinifero, radice

destitutum, LINN. *Truffe de cerf.*

Lycoperdon solidum muricatum radice destitutum, LINN. *Truffe d'hiver.*

LYCOPERSICON, J. B. *Lycopersicon Galeni*, ANGUILL. & TOURN. *Pomme d'amour*, ou *Pomme dorée.*

LYCOPODIUM, off. *Lycopodium*, sive *Muscus clavatus*, GERARD. & PARK. & RAIL. *Lycopodium caule repente*, foliis patulis, pedunculis spicâ geminâ terminatis, LINN. *Mousse rampante à massue ; Mousse des bois ; Pied ou Patte de loup.*

LYCOPSIS, ANGUILL. *Buglosse.*

Lycopsis germanica purpurea, FUCH. *Vipérine* ou *Herbe aux vipères.*

LYSIMACHIA, off. *Lysimachia lutea majorque*, DIOSCOR. & C. B. & TOURNEF. *Lysimachia lutea*, J. B. *Lysimachia foliis lanceolatis*, caule corymbo terminato, LINN. *Corneille ; Lysimachie ; Souci d'eau ; Perce-bosse* ou *Chasse-bosse.*

Lysimachia, *Chamænerion dicta*, latifolia, C. B. *Herbe de S. Antoine.*

Lysimachia cærulea, galericulata, vel *Gratiola cærulea*, C. B. *Centauree bleue ; Tertianaire*, ou *Herbe aux fièvres.*

Lysimachia humifusa, folio rotundiorè, flore luteo,

TOURN. *Lyfimachia foliis subrotundis, floribus solitariis, caule repente*, **LINNÆI.** *Nummulaire; Herbe aux écus; Monnoyere; Herbe à cent maux; Herbe qui tue les moutons.*

Lyfimachia lutea corniculata, **C. B.** *Lyfimachia lutea virginiana*, **GERARD.** *Herbe aux ânes.*

Lyfimachia purpurea, *off.* **Lyfimachia spicata purpurea**, *fortè Plinii*, **C. B.** *Lyfimachia flore purpureo*, **ANGUILL. & CÆSALP.** *Lyfimachia altera flore spicato*,

MATTHIOLI. *Salicaire commune; Lyfimachie rouge.*

LYSIMACHION luteum, **OFFICIN.** *Corneille, Lyfimachie; Souci d'eau; Perce-bosse, ou Chasse-bosse.*

LYSIMACHIUM purpureum cognominatum, *Lyfimachium secundum sive alterum*, **NONNULLOR.** *Salicaire commune; Lyfimachie rouge.*

LYTHRUM foliis oppositis, **LINN.** *Salicaire commune; Lyfimachie rouge.*



M A L

MACERONE, quibusdam
Smyrnum, semine magno,
nigro, J. B. *Maceron* ;
gros *Perfil de Macédoine*.

MADERAM pulli, *sive* Balam
pulli, H. M. *Tamarinier*.

MADIRA-CANIRAM, RHEED.
Arbre d'où se tire le bois de
couleuvre.

MADREPORA simplex ramo-
sa, ramis teretibus lævibus
tabulosis, lamellis inte-
gris, LINN. *Corail blanc*.

Madrepora vulgaris, TOURN.
Madrepore simplex ramo-
sa, ramis teretibus, lævi-
bus, tubulosis, lamellis
integris, LINN. Madre-
pore.

MAGNA bestia. *Elan, grand*
quadrupede.

MAGNATIS, AVIC. *Aimant*.

MAGNES, off. *Aimant*.

Magnes albus, MONT. Ma-
gnes candidus, KENTM.
Aimant charnel ; Aimant
blanc ; Calamite blanche.

MAGNESIA. *Magnésie blan-*
che ; Poudre de Santinelli,
ou Poudre de l'Italien.

MAGNUM animal. *Elan,*
grand quadrupede.

MAJORANA tenuifolia, C. B.
& TOURN. *Majorana te-*
nuior & lignosior, J. B.
Marjolaine à petites feuil-
les.

Majorana vulgaris, C. B. Ma-
jorana majori folio ex se-
mine nata, J. B. *Majorana,*

sive Marum, DODON. Ma-
jorana vulgaris æstiva,
PARK. *Marjolaine vul-*
gaire.

MALA aurea, odore fœtido,
QUIBUSD. *Mala aurea, DO-*
DON. Pomme d'amour, ou
Pomme dorée.

Mala capendua, curtipendia,
seu curtipenda ; *Mala ces-*
tiana ; Mala curtipendula
dicta, J. B. Pommes de Bar-
din ; Pommes de court-
pendu, ou de capendu.

Mala castinia. *Pommes de*
châtaigne ou de martrange.
Mala feniculata. *Pommes d'a-*
nis, ou Fenouillettes.

Mala francatura. *Pommes de*
francatu.

Mala insana, off. & DODON.
Mala insana syriaca, PARK.
Mélongene ou Mélangene ;
Maïenne ; Aubergine.

Mala renetia, CAROL. STE-
PHAN. *Mala prasomila,*
C. B. *Pommes de reinettes*.

Mala rosea ; **Mala** apiola,
MATTH. *Pommes d'apis*.

μαλαβαθρον & φύλλον μαλαβαθρου,
DIOSCOR. & GALENI. Μα-
λαβαθρον ἰνδικόν, GALENI.
Feuille indienne, ou Ma-
labathrum.

MALABATHRUM indicum,
off. *Malabathrum PLIN.*
Feuille indienne, ou Ma-
labathrum.

MALACOCISSOS, L. H. *Lierre*
terrestre ; Terrette ; Herbe

de S. Jean ; Gondolle ; Rondotte ; Rondelle ; Rondette.

MALACOCISSUS *Damocratis*, ANGUILL. *Grand Liseron* ou *Liset*.

MALACOCISSUS *minor*, FUSCH. *Petite Chélidoine* ; *petite Scrophulaire*.

MALACOCODDI, HORT. MAL. *Poirier*.

MALAN-KUA, H. M. *Plante dont la racine est la xédoaire*.

MALICORIUM. *Ecorce de grenade*.

MALUM *aurantium*, *vel aurantium*, *vel aureum*, *vel anaurantium*, *vel nerantzium*, *vel chryfigenum*, *vel citrangulum*, *Orange*.

Malum *granatum*. *Grenade*, *fruit du grenadier*.

Malum *limonium*. *Limon*, *fruit du limonier*.

Malum *punicum*. *Grenade*, *fruit du grenadier*.

MALUS *agrestis*. *Pommier sauvage*.

Malus *armeniaca*. *Abricotier*.

Malus *aurantia dulci medullâ*, off. *Malus aurantia*, DODON. *Orange à fruit doux*.

Malus *aurantia fructu acri*, off. *Malus aurantia major*, C. B. *Oranger à fruit aigre*, ou *Bigarrade*.

Malus *cotonea fructu majori*, OFF. *Coignassier femelle à gros fruit*.

Malus *cydonia angustifolia vulgaris*, H. R. P. *Coignassier sauvage*.

Malus *cydonia fructu oblongo & leviori*, TOURN. *Coignassier femelle à gros fruit*.

Malus *cydonia fructu brevior & rotundior*, H. R. P. *Coignassier femelle à petit fruit*.

Malus *granata sativa*, C. B. *Grenadier domestique*.

Malus *limonia*, off. *Malus limonia acida*, C. B. *Malus limonia*, J. B. *Limonier*, *arbre*.

Malus *malabarica fructu corticoso amaricante*, semine plano compresso, D. SYEN. & RAI. *Arbre qui donne la noix vomique*.

Malus *medica*, off. C. B. *Citronnier*.

Malus *persica vulgaris*, off. *Malus persica*, J. B. *Pêcher ordinaire*.

Malus *punica flore pleno*, H. R. P. *Malus punica sylvestris major*, sive *Balaustium majus*, PARK. & RAI. *Grenadier-balaustier*, & *Paparoï*.

Malus *punica sativa*, C. B. *Grenadier domestique*.

Malus *sativa*. *Pommier cultivé*.

MALVA *rosea*, folio subrotundo, C. B. *Malva rosea* sive *hortensis*, J. B. *Malva arborea* sive *hortensis*, TABERN. *Malva hortensis* flore simplici. *Rose d'outremer* ; *Trémier* ; *Rose trémière*.

Malva *verbenacea*, PARK. & GERARD. & DALE.

Medicamenta antivenerea.
Remedes antivénériens, ou contre les maladies vénériennes.

Medicamenta aphrodisiaca.
Remedes qui excitent aux plaisirs de l'amour.

Medicamenta apoplectica.
Remedes contre l'apoplexie.

Medicamenta aquosa.
Remedes qui contiennent beaucoup d'eau.

Medicamenta aromatica.
Remedes aromatiques.

Medicamenta astringentia.
Remedes astringents.

Medicamenta attenuantia.
Remedes atténuants.

Medicamenta attrahentia.
Remedes attirants ou attractifs.

Medicamenta austera.
Remedes austères.

Medicamenta balsamica.
Remedes balsamiques.

Medicamenta bechica; Φάρμακα βήχια.
Remedes béchiques.

Medicamenta bezoardica.
Remedes bézoardiques.

Medicamenta calefacientia.
Remedes échauffants.

Medicamenta cardiaca.
Cardiaux.

Medicamenta carminantia.
Remedes carminatifs.

Medicamenta catagmatica.
Remedes catagmatiques, ou contre les fractures.

Medicamenta cathæretica.
Remedes cathérétiques ou rongeurs.

Tome VIII.

Medicamenta cathartica.
Remedes cathartiques ou purgatifs.

Medicamenta caustica.
Remedes caustiques.

Medicamenta cephalica.
Remedes céphaliques.

Medicamenta cicatrisantia.
Remedes cicatrisants.

Medicamenta cholagoga.
Remedes cholagogues.

Medicamenta corroborantia.
Remedes corroboratifs ou fortifiants.

Medicamenta corrodentia.
Remedes corrosifs.

Medicamenta corrosiva.
Remedes corrosifs.

Medicamenta deobstruentia.
Remedes désobstruants ou apéritifs.

Medicamenta desiccantia.
Remedes dessécatifs.

Medicamenta desquamatoria.
Remedes exfoliants ou exfoliatifs.

Medicamenta detergentia.
Remedes détersifs.

Medicamenta diaphoretica.
Remedes diaphorétiques.

Medicamenta digerentia.
Remedes digestifs.

Medicamenta diluentia.
Remedes délayants.

Medicamenta discutientia.
Remedes discussifs.

Medicamenta diuretica.
Remedes diurétiques.

Medicamenta drastica.
Remedes drastiques ou actifs.

Medicamenta ecbolica.
Remedes ecboliques.

Y

Medicamenta emetica. *Remedes émétiques ou vomitifs.*
 Medicamenta emetocathartica. *Remedes éméocathartiques.*
 Medicamenta emmenagoga. *Remedes emménagogues.*
 Medicamenta emollientia. *Remedes émollients.*
 Medicamenta epulotica. *Remedes cicatrisants.*
 Medicamenta epulotica. *Remedes épulotiques.*
 Medicamenta errhina. *Errhines, ou Remedes sternutatoires.*
 Medicamenta escharotica. *Remedes escharotiques.*
 Medicamenta evacuantia. *Remedes évacuants.*
 Medicamenta exfoliativa. *Remedes exfoliants ou exfoliatifs.*
 Medicamenta expectorantia. *Remedes expectorants.*
 Medicamenta febrifuga. *Remedes febrifuges.*
 Medicamenta galactophora. *Remedes galactophores.*
 Medicamenta glutinantia. *Remedes agglutinatifs.*
 Medicamenta hepatica. *Remedes hépatiques.*
 Medicamenta hydragoga. *Remedes hydragogues.*
 Medicamenta hypnotica. *Remedes hypnotiques.*
 Medicamenta hysterica. *Remedes hystériques, ou contre les vapeurs.*
 Medicamenta incarnantia. *Remedes incarnatifs ou sarcotiques.*

Medicamenta incidentia. *Remedes incisifs.*
 Medicamenta lithontriptica. *Remedes lithontriptiques.*
 Medicamenta masticatoria. *Remedes masticatoires.*
 Medicamenta maturantia. *Remedes maturatifs.*
 Medicamenta nasalia. *Remedes sternutatoires.*
 Medicamenta nervina. *Remedes nervins.*
 Medicamenta odontalgica. *Remedes odontalgiques.*
 Medicamenta ophthalmica. *Remedes ophtalmiques.*
 Medicamenta otalgica. *Remedes otalgiques.*
 Medicamenta porotica. *Remedes porotiques.*
 Medicamenta prophylactica. *Remedes prophylactiques.*
 Medicamenta purgantia. *Remedes purgatifs.*
 Medicamenta refrigerantia. *Remedes rafraîchissants.*
 Medicamenta repellentia. *Remedes répercussifs.*
 Medicamenta repercutientia. *Remedes répercussifs.*
 Medicamenta resolventia. *Remedes résolutifs.*
 Medicamenta roborantia. *Remedes fortifiants.*
 Medicamenta rubefacientia. *Remedes rubéfiants.*
 Medicamenta salivantia. *Remedes sialogogues.*
 Medicamenta sarcotica. *Remedes sarcotiques ou incarnatifs.*
 Medicamenta saxifraga. *Remedes lithontriptiques.*

Medicamenta sialogoga. *Remedes sialogogues.*

Medicamenta soporem inducentia. *Médicaments assoupissants.*

Medicamenta spermatopœia. *Remedes spermatopées.*

Medicamenta splenica. *Remedes spléniques.*

Medicamenta stomachica. *Remedes stomachiques.*

Medicamenta sudorifica. *Remedes sudorifiques.*

Medicamenta suppurativa vel suppurantia. *Remedes suppuratifs.*

Medicamenta tonica. *Remedes toniques.*

Medicamenta topica. *Remedes topiques.*

Medicamenta traumatica. *Remedes vulnéraires.*

Medicamenta urentia. *Remedes caustiques.*

Medicamenta urentia. *Remedes pyrotiques.*

Medicamenta vermifuga. *Remedes vermifuges.*

Medicamenta vulneraria. *Remedes vulnéraires.*

MEDICINA tingendo apta, HERM. *Achiott ; Urucu ; Roucou.*

MEDULLA. *Moëlle, suc huileux contenu dans les cavités des os.*

MEINENSES aquæ. *Eaux de Meine, à quatre lieues de Nismes.*

Μελαντηρία, DIOSCOR. *Mélanterie.*

MELANTHIUM ex tritico seu triticeum, HIPPOCRAT. *Nielle des bleds ; fausse*

Nielle ; Nielle bâtarde ; Alefne.

Melanthium sativum, seu Nigella romana, off. Melanthium calyce & flore minore, semine nigro & luteo, J. B. Melanthium, sive Nigella romana odora, LOBEL. *Nielle romaine ; Nielle des jardins ; Nielle cultivée ou domestique ; Cumin noir, ou faux Cumin.*

Melanthium sylvestre sive arvense, J. B. *Nielle des champs ; Nielle sauvage ou bâtarde ; Barbue ; Poivre commune.*

MELANTZANA, officin. *Mélongene ou Mélangene ; Maïenne ; Aubergine.*

MELANZENA fructu pallido, H. E. *Mélongene, ou Mélangene ; Maïenne ; Aubergine.*

MELEGUETTA & Maniguetta. *Méleguette ou Maniguette ; Graine de paradis.*

MELES unguibus anticis longissimis, LINN. Meles pilis ex sordide albo & nigro variegatis vestita, capite tæniis alternatim albis & nigris variegato, BRISSON. *Blaireau ou Bléreau ; Taisson ou Tesson ; Grisard ; Bédouault, ou Bédouan, Bédou.*

Meles unguibus uniformibus, LINN. *Zibet, animal quadrupède.*

Meles unguibus uniformibus, cinerea, LINN. *Meles fasciis & maculis albis,*

nigris, & rufescentibus variegata, BRISSON. *Civette*.

MELICA, off. Melica, sive Sorghum, DOD. *Grand Millet noir; Blé barbu; Sorgo*.

MELILOTUS, off. Melilotus vulgaris flore luteo, seu Trifolium odoratum, J. B. Melilotus germanica, LOBEL. Melilotus siliquis turgidis, brevibus, obscure transversis rugosis, HALLER. *Mélilot*, anciennement *Marlirot*.

Melilotus major odorata, violacea, MORIS. Melilotus vera, TABERN. *Lotier odorant; Trefle musqué; faux Baume du Pérou*.

Melilotus pentaphyllos minor glabra, sive Lotus, C. B. & TOURN. Melilotus germanica, FUCHS. *Petit Lotier*, ou *Trefle sauvage jaune*.

MELINE, NONNULL. *Panis*, ou *Panix*, ou *Panic*.

MELISSA, Græcis. *Abeille*.

Melissa, off. Melissa hortensis, C. B. Melissa vulgaris, odore citri, J. B. Melissa nostras, CAMER. Melissa floribus ex axillis inferioribus subsellibus, LINN. *Mélisse cultivée ou des jardins; Mélisse citronnée; Herbe de citron; Citronnade ou Citronnelle; Ponicirade; Piment des ruches*, ou *des mouches à miel*.

Melissa floribus ex axillis superioribus, pedunculo

communi confertis, LINNÆI. *Calament ordinaire*.

Melissa sylvestris, seu Melissophyllum, off. Melissa adulterina, quorumdam, amplis foliis & floribus non grati odoris, J. B. Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascens, TOURNEF. *Mélisse sauvage ou bâtarde; Mélisse de montagne ou des bois; Mélisse puante*, ou *qui sent la punaise*.

MELISSOPHYLLUM, off. seu Melissa sylvestris. *Mélisse sauvage ou bâtarde; Mélisse de montagne ou des bois; Mélisse puante*, ou *qui sent la punaise*.

Melissophyllum vulgare, H. L. *Mélisse cultivée ou des jardins; Mélisse citronnée; Herbe de citron; Citronnade ou Citronnelle; Ponicirade; Piment des ruches ou des mouches à miel*.

MELO vulgaris, C. B. Melo, sive Melopepo vulgò, Cucumis Galeni, DODON. *Melon commun*.

MELOLOUTHA, LINN. *Hanneton*.

MELONGENA, off. Melongena, veteribus, J. B. Melongena fructu oblongo violaceo, TOURNEF. *Mélongene ou Mélangene; Maïenne; Aubergine*.

MELOPEPO vulgò, Melo, Cucumis Galeni, DODON. *Melon commun*.

MELOSOMON, QUORUMDAM. *Polion de montagne à fleurs jaunes*.

MEMÆCYLON, Græcis. *Arbousfier* ; *Fraïfier en arbre*.

MEMBROCQ, BRASILIENSIB. *Pareira-brava* ; *Buuua*.

MENIANTHES palustre latifolium & triphyllum, TOURNEF. *Menianthes palustre Theophrasti*, L. H. *Menianthes foliis ternatis*, LINN. *Ménianthe* ; *Trefle de marais* ; *Trefle d'eau ou aquatique* ; *Trefle de castor*.

MENISPERMUM foliis cordatis retusis mucronatis, LINNÆI. *Arbre qui produit les coques du Levant*.

MENTHA alba, seu *Menthastrium*, off. *Mentha sylvestris rotundiore folio*, C. B. *Mentha caballina folio rotundiore*, sive *Menthastrium*, TRAGI. *Mentha agrestis*, sive *equina*, QUORUMD. *Menthe sauvage*, ou *Menthastre* ; *Baume d'eau à feuilles ridées*.

Mentha arvensis verticillata, hirsuta, J. B. & TOURN. *Calament des champs* ; *Pouliot-thym*.

Mentha cataria, sive *Nepeta*, OFF. *Herbe à chat ou au chat* ; *Cataire*.

Mentha corymbifera minor, CORDI. *Eupatoire de MÉSUÉ*.

Mentha crispa danica, sive *germanica speciosa*, MORIS. & PARK. *Mentha floribus spicatis*, foliis cordato-dentatis, undulatis, sessilibus, LINN. *Menthe frisée d'Allemagne*.

Mentha crispa verticillata, C. B. *Mentha crispa verticillata folio rotundiore*, J. B. *Mentha prima*, DODON. *Mentha cruciata*, LOBEL. *Mentha sativa rubra*, GERARD. *Menthe frisée ou crépue* ; *Baume frisé*.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, obtusis, subcrenatis, LINN. *Pouliot commun* ; *Pouliot royal*.

Mentha hortensis corymbifera, C. B. *Mentha corymbifera*, sive *Costus hortensis*, J. B. *Mentha græca*, CAMER. *Mentha romana*, LAC. *Tanaïse des jardins à feuilles de menthe* ; *le grand Baume* ; *la Menthe-coq* ; *la Menthe Notre-Dame* ; *le Coq* ; *le Pasté* ; *l'Herbe du coq ou au coq* ; *le Coq des jardins*.

Mentha hortensis rubra, off. *Mentha hortensis verticillata*, ocymi odore, C. B. *Mentha verticillata minor acuta*, non crispa, odore ocymi, J. B. *Mentha quarta*, DODON. *Mentha fusca* sive *vulgaris*, PARK. *Mentha cardiaca*, CAMER. *Mentha vulgaris serpens rotundifolia*, SCHWENCK. *Menthe commune* ; *Baume des jardins* ; *Herbe du cœur*.

Mentha romana ; *Mentha angustifolia* sive *acuta*, off. *Mentha angustifolia spicata*, C. B. *Mentha spicata*, folio longiore, acuto,

glabro, nigriori, J. B.
 Mentha romana angustifolia, sive cardiaca, PARK.
 Mentha acuta, TABERN.
 Menthe à épi & à feuille étroite; Menthe de Notre-Dame; Menthe romaine.
 Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major, C. B. Mentha aquatica, sive Sisybrium, J. B.
 Mentha floribus capitatis, foliis ovatis, serratis, petiolatis, LINN. Menthe aquatique; Menthe rouge; Baume d'eau à feuille ronde.
 Mentha farracenica MYCONI, L. Herbe à éternuer.
 MENTHASTRUM, off. Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato, odore gravi, J. B. Menthastrum foliis orbiculatis, GESN. Menthe sauvage, ou Menthastre; Baume d'eau à feuilles ridées.
 MERCURIALIS ANGLORUM. Bon-Henri.
 Mercurialis femina, off. Mercurialis spicata sive femina, Dioscoridis & Plinii; C. B. Mercurialis femina, J. B. Mercurialis vulgaris & prima, TRAGI. Mercurialis florens, CÆSALP. Mercuriale femelle ou à épi.
 Mercurialis mas, off. Mercurialis testiculata, sive mas, Dioscoridis & Plinii; C. B. Mercurialis mas, J. B. Mercurialis fructum erens, CÆSALP. Mercurialis caule brachiato, foliis glabris, LINNÆI.

Mercuriale mâle; Foirole; Vignoble ou Vignette.
 MERCURI herba, PLINII. Mercuriale mâle; Foirole; Vignoble ou Vignette.
 MERCURIUS vivens; Mercurius currens. Mercure; Vif-argent.
 MERIENSES aquæ. Eaux de Miers, dans le Querci.
 MERLANGIUS, sive Asellus marinus, I. M. Merlan.
 MERLANUS, secunda asellorum species, RONDEL. Merlan.
 MERLUCCIUS, Asellus, Cabeliau, MERIAN. Morue, poisson.
 MERULA, off. Merula nigra, BELON. Merle ordinaire ou commun.
 Merula, HOFFMAN. Nerprun; Noirprun; Bourg-épine.
 Merula fluviatilis seu lacustris, QUORUMD. Tanche ou Tenche.
 MERULIUS niger & albus, seu Fungus rugosus vel cavernosus, J. B. Morilles.
 MESPILUS aculeata amygdali folio, Tourn. Buisson ardent, ou Arbre de Moïse.
 Mespilus apii folio, sylvestris non spinosa, sive Sorbus torminalis, C. B. Alisier, ou Sorbier torminal; Tormigne; Anier ou Aigrettier.
 Mespilus apii folio, sylvestris, spinosa; sive Oxyacantha, C. B. Epine blanche; Aubépin; Aubépine; Noble-épine.

Mespilus vulgaris, off. *Mespilus germanica*, folio laurino non serrato, sive *Mespilus sylvestris*, C. B. *Mespilus foliis integris*, RAIH. *Mespilus foliis lanceolatis integerrimis subtrès tomentosis, calycibus tomentosis*, LINN. *Nefflier*; *Mesplier*; *Neslier*, ou *Meslier*.

METALLA. *Métaux*.

METALLICÆ substantiæ. *Substances métalliques*.

Μῆλον & Μῆλον, GRÆCOR. *Meu* ou *Méum*; *Meum athamantique*.

MEU & Meum, OFF. *Meu* ou *Méum*; *Méum athamantique*.

MEUM, off. *Meum foliis anethi*, C. B. *Meu* ou *Meum*; *Méum athamantique*.

MEZEREON, ARAB. LOBEL. *Camélée*, ou *Chamélée*; *Garoupe*; *Olivier nain* ou *bâtard*.

MEZEREUM & Mezereon, *Mezereon germanicum*, sive *Laureola folio deciduo*, J. B. *Lauréole femelle*; *Bois gentil*; *Thymélée femelle des pays froids*.

MIHA, ARABUM. *Storax liquide*, ou *Styrax*.

MILAX, GALEN. *Liseron rude*; *Liset piquant* ou *épineux*.

Milax arbor, CORD. *If*.

MILEROSA, MATTH. *Pommes d'apis*.

MILITARIS, sive *Millefolium flore albo*, LOBEL. *Mille-feuille*; *Herbe au charpentier*; *Herbe à la*

coupure, ou *aux coupures*.

MILIMUM agreste, sive *exiguum*, NONNULL. *Panis*, ou *Paniz*, ou *Panic*.

Milium arundinaceum subrotundo semine, *Sorgo nominatum*, C. B. *Milium indicum seu Sorgum*, RAIH. *Grand Millet noir*; *Blé barbu*; *Sorgo*.

Milium indicum maximum Mays dictum, seu *Fruementum indicum*, PARK. *Maïs*; *Blé de Turquie*.

Milium semine luteo vel albo, C. B. *Milium aureum & album*, CAMER. *Milium vulgare album*, PARK. *Millet commun jaune ou blanc*; *petit Millet*; *Mil commun*.

Milium solis, sive *Lithospermum*, J. B. *Milium aut Soler Mauritanis*, quod in montibus soler nascatur, SERAP. *Gremil* ou *Herbe aux perles*.

MILLEFOLIUM vulgare album, C. B. *Millefolium Stratiotes pennatum terrestre*, J. B. *Millefolium seu Achillea*, DODON. *Millefolium flore albo*, seu *Militaris*, LOBEL. *Millefeuille*; *Herbe au charpentier*; *Herbe à la coupure* ou *aux coupures*.

MILLEGRANA major glabra, sive *Polygonum minus*, C. B. *Turquette lisse*; *Herbe du Turc*; *Herniole*.

Millegrana major hirsuta, seu *Polygonum minus*, C. B.

Turquette lisse ; Herbe du Turc ; Herniole.

MILLEMORBIA, QUORUMD. Grande Scrophulaire commune.

MILLEPEDÆ, MATTH. Cloportes ; Pourcelets, ou Pourcelets de S. Antoine.

MILLEPORA rubra, striis obsoletis flexuosis, LINN. Corail rouge.

MILOS, THEOPHR. If.

MIMOSA, seu Frutex sensibilis. *Sensitive ; Herbe mimese ; Herbe sensible.*

Mimosa spinis geminatis distinctis, foliis duplicatopinnatis, particularibus utrinque quinis, pluribus, LINN. Mimosa spinis ternis, intermedio repleto, foliis bipennatis, floribus spicatis, LINN. *Acacia du Sénégal, lequel produit la gomme arabe.*

MINERALE regnum. *Regne minéral.*

MINERALES aquæ. *Eaux minérales.*

MIRABILIS peruana, HERN. Mirabilis floribus sessilibus, axillaribus erectis, solitariis, A. A. *Belle de nuit.*

MISSIO sanguinis. *Saignée.*

Miſu, DIOSCOR. & GRÆCORUM. Misy, substance jaune, &c....

MITELLA americana, maxima tinctoria, Tourn. *Achiote ; Urucu ; Roucou.*

MIZQUITL, HERM. *Acacia vrai,*

MOCHUS, sive Cicer sativum, DODON. *Orobe ; Ers ou Eres ; Pois de pigeon.*

MOKAICA, ARABUM. *Sébestes.*

MOLANGA aliis, seu Laga, sive Piper aromaticum, PISON. *Poivrier.*

MOLITOR, LEEWENH. *Hanneton.*

MOLLUGO montana angustifolia, C. B. Mollugo vulgarior. *Caille-lait à fleurs blanches.*

MOLON PLINII. *C'est peut-être, suivant G. BAUHIN, la Filipendule.*

MOLUA, RONDELET. *Morue, poisson.*

Moluscos, GRÆCOR. *Plomb.*

MOMORDICA, off. Momordica fructu luteo rubescente, HORT. EYST. Momordica pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris, patenti-palmatis, LINN. *Pomme de merveille ; Balsamine mâle ou rampante.*

Momordica absque cirrhis, LINN. *Concombre sauvage.*

MONFERINENSES aquæ. *Eaux de Montfrin, en Languedoc.*

MONOCEROS, sive Unicornu, off. *Narhwal ou Licorne de mer.*

MONODON, ARTEDI & LINN. *Narhwal ou Licorne de mer.*

MONTA PANNA, seu Todda panna, RHEED. *Arbre d'où l'on croit que se tire le sagou.*

MONTIS aurei aquæ. *Eaux du Mont d'or, en Auvergne.*

MOR, seu **Mur**, **ARABUM**. *Myrrhe.*

MORHUA, off. *Morhua vulgaris*, maxima asellorum species, **BELON**. *Morue, poisson.*

MORINGEOS, **LUSITANIS**. *Arbre qui produit l'espece de noix de ben appelée mouringou.*

MORINGHA zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloso, **BURM**. *Arbre qui produit l'espece de noix de ben qu'on appelle mouringou.*

MORIO mas foliis maculatis. *Orchis; Satyrion; Testicule ou Couillon de chien mâle, à feuilles étroites.*

MORSULI restaurantes **KUNKELI**. *Tablettes restaurantes de KUNKEL.*

MORSUS diaboli, vel *Succisa*, **J. B. & RAIL**. *Morsus diaboli vulgaris flore purpureo, PARK. Scabieuse des bois; Succise; Mors ou Remors du diable.*

Morsus gallinæ, off. & **J. B.** *Morsus gallinæ primum genus, TRAGI. Morgeline; Mouron.*

MORUS, sive *Rubus*, **ANGUILL**. *Ronce ordinaire ou commune; Mûre de renard ou de buisson; Mûre sauvage.*

Morus alba, **GER. & PARK. & RAIL**. *Morus fructu albo,*

C. B. *Morus alba, J. B. Morus fructu albo minori ex albo purpurascente, Tourn. Mûrier blanc.*

Morus fructu nigro, C. B. Morus nigra, J. B. Morus rubra, ANGUILL. Morus foliis cordatis hispidis, LINNÆI. Mûrier noir.

MOSCH, id est *Bamia moschata, ALP. Alcée indienne.*

Μοσχόφυον, **GRÆCOR. RECENTIOR.** *Muscade ou Noix muscade.*

MOSCHATELLINA foliis fumariz bulbosæ, **J. B.** *Moschatellina, CORDI. Moschatelline; Herbe du musc; Herbe musquée.*

MOSCHI capreolus, **SCHRODER.** *Moschi capra, ALDROV. Chevre d'Afrique, ou Gazelle; Chevre qui donne le musc.*

MOSCHIUS, sive *Moschi capreolus, SCHROD. Chevre d'Afrique, ou Gazelle; Chevre qui donne le musc.*

MOSCHUS, off. *Musc, substance d'une odeur balsamique.*

MOTACILLA, off. *Motacilla quam nostri albam cognominant, GESNER. Motacilla alba, ALDROV. Motacilla pectore nigro, LINNÆI. Hochequeue commun; Lavandiere.*

Motacilla grisea, alis nigro cæruleoque undulatis, LINN. Passereau troglodyte, ou Roitelet.

MOTHEICA, ARABUM. *Sebestes*.

MOTTENSES aquæ seu Thermæ. *Eaux de la Motte, en Dauphiné.*

MOURINGOU, H. M. *L'Arbre qui produit l'espece de noix de ben nommé mouringou.*

MU, ARABUM. *Meu ou Méum ; Meum athaman-tique.*

MUCAGO. *Mucilage.*

MUCILAGO. *Mucilage.*

MUKEITA, ARABUM. *Sebestes.*

MULUS, off. *Mulus & Mula, Semi-asinus, QUORUM D. Mulet.*

MUMIA. *Momie ou Mumie.*

Mumia. *Bitume de Judée.*

MUNDUY guacu *Brasilien-sium, MARCG. & PISON. Ricinoïde ; grand Ricin d'Amérique ; Médecinier ou Médecinier ; Arbrisseau qui produit la fève purgative.*

MUNGOS radix, KÆMPF. *Racine de serpents.*

MUR, seu Mor, ARABUM. *Myrrhe.*

MURÆNA unicolor, maxillâ inferiore longiore, ARTEDI & LINN. *Anguille, poisson.*

MURINA spina, sive Myrtus sylvestris, LOBEL. *Houx frêlon ; petit Houx ; Hous-son ; Fragon ; Myrte sauvage ou épineux ; Brusç ; Buis piquant.*

MUS, off. *Mus domesticus, SCHRODER. Mus minor ;*

Musculus vulgaris domesti-cus, caudâ tenui longâ, KLEIN. Mus caudâ longâ mediufculâ, corpore cine-reo fusco, abdomine subal-bescente, LINNÆI. Mus caudâ longissimâ, obscure cinereus, ventre subalbes-cente, BRISSON. Souris.

Mus alpinus, PLINII. Mus caudâ elongatâ, nudo cor-pore, rufo ; Marmota, LINN. Marmote.

Mus major, off. Mus do-mesticus major, Rattus vulgò, SCHWENCK. Mus caudâ longâ, subnudâ, corpore fusco cinerescence, LINN. Mus caudâ longif-simâ, obscure cinereus, BRISSON. Rat.

Mus terrenus, vel cæcus per-peram, NONNULL. Taupe.

MUSA caudice maculato, fructu recto, rotundo, bre-viore, odorato, SLOANE. *Le Bananier qui porte la figue-banane.*

Musa fructu cucumerina, lon-giori, BOERRH. *Musa ARAB. Le Bananier dont le fruit se nomme banane.*

MUSCULUS, BONAN. *Mus-culus maritimus vulgatissi-mus edulis, PETIV. Mus-culus ex cæruleo niger, LISTER. Moule ou Moucle de mer.*

Musculus PLINII, ait GESN. Baleine ordinaire, ou grande Baleine.

Musculus vulgaris domesti-cus, caudâ tenui longâ, KLEIN. Souris.

MUSCUS caninus. *Mousse contre la rage.*

MUSCUS capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus, **TOURNEF.** *Capillaire doré, ou Perce-mousse.*

MUSCUS catharticus; **MUSCUS** pulmonarius. *Lichen d'Islande; Mousse purgative; Mousse des phthifiques ou pulmoniques; Mousse de Suede ou de Laponie; Mousse des rennes; Mousse d'Islande des boutiques.*

MUSCUS cinereus terrestris, **RAII.** *Mousse contre la rage.*

MUSCUS coralloïdes squamis loricatus, **C. B.** *Coralline.*

MUSCUS ex cranio humano, **TABERN.** **MUSCUS** cranio humano innatus, **RAII.** *Mousse de crâne humain; Œsnée humaine.*

MUSCUS fugax membranaceus pinguis, **B. M.** *Mousse membraneuse; Nostoch des Allemands.*

MUSCUS pulmonarius, **C. B.** *Pulmonaire de chêne.*

MUSCUS terrestris repens, *sive* clavatus, **C. B.** **MUSCUS** terrestris repens à Tragopictus, **J. B.** **MUSCUS** squamosus vulgaris repens clavatus, **TOURN.** **MUSCUS** clavatus, *sive* Lycopodium, **GERARD. & PARK. & RAI.** *Mousse rampante à massue; Mousse des bois; Pied ou Patte de loup.*

MUSCUS terrestris vulgator; **MUSCUS** querno vilissimo

vilior, *off.* **MUSCUS** vulgatissimus, **C. B.** **MUSCUS** terrestris & hortensis, **J. B.** **MUSCUS** squamosus major *sive* vulgaris, **TOURNEF.** **MUSCUS** terrestris latioribus foliis major, *sive* vulgaris, **RAII.** *Mousse terrestre ordinaire; Mousse commune.*

MUSIA patre, **MALABAR.** *Especie d'armoïse qui donne le moxa.*

MUSTELA alba, **GESNER.** **MUSTELA** candida, *sive* Animal ermineum, *Recenitor.* **MUSTELA** armellina; **MUSTELA** alba, extremâ caudâ nigrâ, **KLEIN.** **MUSTELA** hyeme alba, æstate suprâ rutila, infrâ alba, caudâ apice nigro, **BRISSE.** *Belette à queue noire; Hermine ou Roselet.*

MUSTELA fulvo nigricans, gulâ pallidâ, **Martes, LINN.** **MUSTELA**, pilis in exortu albidis, castaneo colore terminatis, vestita, gutture albo, **Foyna, BRISSE.** *Fouine.*

MUSTELA vulgaris, **RAII & KLEIN.** **MUSTELA** suprâ rutila, infrâ alba.... **MUSTELA** vulgaris, **BRISSE.** *Belette.*

MUSTELA zibethi; **MUSTELA** odorata quam vulgus *Civetam* appellat, **NONNULL.** *Civette.*

MYAGRUM, *off.* **MYAGRUM** sativum, **C. B.** **MYAGRUM** dictum *Camelina*, **J. B.** **MYAGRUM** filiquis obversè ovatis pedunculatis, **LINN.**

Cameline ; Sésame d'Allemagne , ou bâtard.

MYAGRUS, veterum. *Serpent à collier.*

Μωῦζος, GRÆCOR. *Loir.*

MYRICA foliis lanceolatis, fructu sicco, LINN. *Myrte du Brabant ; Myrte bâtard des pays froids ; Piment royal ; Galé.*

Myrica sylvestris altera, CLUSII. *Myrica , seu Tamariscus altera , CAMER. Tamarisc ou Tamaris ; Tamarix d'Allemagne ; le petit Tamarisc.*

MYRISTICA, LINN. *Arbre qui porte la noix muscade femelle ou ordinaire.*

Μυριστικὸν ἀρωματικόν, GRÆCOR. RECENT. *Muscade ou Noix muscade.*

Μυρμηξ, GRÆCOR. *Fourmi.*

Μυροβάλανα βελιρική, ACTUAR. *Myrobalans bellirics ou belliriques.*

Μυροβάλανα ἐμπελιτικά vel ἐμπλικά, ACTUAR. *Myrobalans emblics ou embliques.*

Μυροβάλανα κεβάλια, ACTUAR. *Myrobalans chébules.*

Μυροβάλανα ινδικά ἢ δαμασώνια, ACTUAR. *Myrobalans indiens ou noirs.*

Μυροβάλανα ζανθα, ACTUARII. *Myrobalans citrins.*

MYROBALANI belliricæ, off. *Myrobalani rotundæ belliricæ, C. B. Myrobalans bellirics ou belliriques.*

Myrobalani chebulæ, offic. *Myrobalani maximæ oblongæ, angulosæ, puitam*

purgantes, C. B. Myrobalans chébules.

Myrobalani citrinæ, off. *Myrobalani teretes citrinæ, bilem purgantes, C. B. Myrobalans citrins.*

Myrobalani emblicæ in segmentis nucleum habentes, angulosæ, J. B. *Myrobalans emblics ou embliques.*

Myrobalani indicæ, seu nigra, off. *Myrobalani nigra octangulares, C. B. Myrobalani indæ nigra sine nucleis, J. B. Myrobalans indiens ou noirs.*

Μυροβάλανος, & Βάλανος αἰγυπτία, GRÆCOR. *Ben ou Noix de ben.*

MYROBALANUM & Glans ægyptia, PLIN. *Ben ou Noix de ben.*

MYRRHA, off. *Myrrhe.*

Μύρρα, HIPPOCR. *Myrrhe.*

MYRRHIS, off. *Myrrhis major, vel Cicutaria odorata, C. B. Myrrhis magno semine, longo, sulcato, J. B. Myrrhis italica, QUORUMDAM. Cerfeuil musqué ou anisé ; Cerfeuil d'Espagne ; Cicutaire odorante ; Persil d'âne de LOBEL.*

Myrrhis annua, semine striato villoso, incana, MORIS. *Daucus de Candie.*

MYRTACANTHA, Murina spina, sive Myrtus sylvestris, LOBEL. *Houx frêlon ; petit Houx ; Housson ; Fragon ; Myrte sauvage ou épineux ; Brusé ; Buis piquant.*

MYRTILLUS, off. *Myrtillus primus, TABERN, Myrtillus*

- niger minor, RUDB. Myrtillus minor baccis nigris, TILL. Myrtillus vulgaris Germanorum fructu nigro. *Airelle; Myrtille; Raisin de bois; Bluets; Morets; Mûres de ronces.*
- Myrtus americana Caninga dicta, HERMAN. Myrtus arborea foliis laurinis, aromatica pimienta, TRANS. PHIL. Myrtus foliis obversè ovatis, LINN. *Arbre qui produit la casse qui sent le clou de girofle.*
- Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus & subrotundis, SLOANE. Myrtus arborescens, citri foliis glabris, fructu racemoso, caryophylli sapore, PLUMM. *Arbre qui porte le poivre de la Jamaïque.*
- Myrtus brabantica, GER. Myrtus brabantica vel anglica, GERARD. *Myrte du Brabant; Myrte bâtard des pays froids; Piment royal; Galé.*
- Myrtus major, off. Myrtus communis italica, C. B. Myrtus vulgaris nigra & alba, sativa & sylvestris, J. B. Myrtus latifolia vulgaris, PARK. Myrtus floribus solitariis, calyce fructûs diphylo, LINNÆI. *Myrte commun à large feuille; grand Myrte.*
- Myrtus minor vulgaris, C. B. Myrtus tarentina, J. B. Myrtus minor, PARK. *Myrte commun; petit Myrte de Provence; Myrte de Tarente.*
- Myrtus nemoralis seu montana; Myrtus terrestris, seu pumila, vel humilis. *Airelle; Myrtille; Raisin de bois; Bluets; Morets; Mûres de ronces.*
- Myrtus sylvestris, Murina spina, Myrtacantha, LOBEL. *Houx frêlon; petit Houx; Housson; Fragon; Myrte sauvage ou épineux; Brusé; Buis piquant.*
- MYSTICETUS (Μυστικῆτος) ARISTOTELIS, ait GESNER. *Baleine ordinaire, ou grande Baleine.*
- MYTULUS, off. *Moule ou Moucle de mer; Caïeu.*
- MYXA, off. *Sébestes.*
- Myxa, sive Sebesten, J. B. *Arbre qui produit les Sébestes.*
- Μύξα, PAULI ÆGINET. *Sébestes.*
- MYXARIA, off. *Sébestes.*
- Μυξάρια, AETII & ACTUARI. *Sébestes.*



N A R

- N**ABCA, *Paliurus* ATHÆNEI credita, PROSP. ALPIN. *Jujubier d'Alexandrie*, à feuilles larges, dont le fruit est fort gros.
- NAMBUQUACU, sive *Ricinus americana*, PISON. *Arbre qui donne la graine de ricin*, ou *Pignon d'Inde*.
- NANA BRASILIENSIB. *Ananas*.
- NAPELLUS racemosus, L. *C'est peut-être l'arbre de S. Christophe*.
- Napellus verus, off. *Napellus cum cæsiis muscis*, THAL. *Napellus primus*, C. B. *Napellus*, DODON. *Napellus verus cæruleus*, GERM. *Napellus verus flore cæruleo*, PARK. *Napellus vulgaris*, LOBEL. *Aconit bleu*; *Tue-loup*; *Napel*; *Coqueluchon*; *Capuchon*; *Capuce de moine*; *Madriettes*.
- NAPHTHA. *Huile de pétrole*.
- Napus sativa, radice albâ, C. B. *Napus veterum*, TRAGI. *Napus sativa rotunda*, C. B. *Navet cultivé*; *Naveau*; *Navet domestique* ou *commun*.
- NARCISSO-LEUCOIUM vulgare, TOURNEF. *Perce-neige*; *Violette de Février* ou *de la Chandeleur*; *Violier bulbeux*; *Campanes blanches*; *Baguenaudier d'hiver* ou *de printemps*.
- NARCISSUS maritimus, C. B. & TOURN. *Narcissus maritimus*, DODON. *Scille blanche*, ou *petite Scille*. *Νάρδος ινδική*, DIOSCORID. *Nard indien*. *Νάρδος κελτική*, DIOSCORID. *Nard celtique*. *Νάρδος ὄρεινή*, DIOSCOR. *Nard de montagne*.
- NARDUS agrestis, seu *Valeriana vera*, TRAGI. *Valériane des jardins*; *Valériane franche*; *grande Valériane*.
- Nardus celtica*, DIOSCOR. *Nardus alpina*, CLUSII. *Plante qui donne le nard celtique*.
- Nardus celtica*, OFF. *Nard celtique*.
- Nardus indica*, OFF. *Nard indien*.
- Nardus italica*, Casia alba *Theophrasti*, DALECAMP. *Lavande mâle*; *Spic*; *Aspic*; *Nard commun*.
- Nardus montana*, OFF. *Nard de montagne*.
- Nardus montana radice olivari*, C. B. *Nardus montana radice oblongâ*, C. B. *Nardus montana longius radicata*, CAMER. *Autre plante qui donne le nard de montagne*.
- Nardus montana altera leonis*, H. L. *Plante qui donne le nard de montagne*.

Nardus rustica, OFFIC. *Cabaret*; *Oreille d'homme*; *Oreillette*; *Rondelle*; *Girard-rouffin*; *Nard sauvage*.

NASALIA medicamenta. *Remedes sternutatoires*.

NASICORNIS, QUORUM D. *Rhinocéros*; & par les Portugais, *Moine des Indes*.

NASTURTII genus sylvestre, GESNER. *Thalitron*; ou *Thaliætron*; *Science des chirurgiens*.

NASTURTIIUM aquaticum supinum, C. B. *Cresson d'eau* ou *aquatique*; *Cresson de fontaine* ou *des ruisseaux*.

Nasturtium hortense, offic. *Nasturtium* hortense vulgatum, C. B. & TOURN. *Cresson des jardins*; *Cresson alénois* ou *cultivé*; *Nastitor*.

Nasturtium hybernum, THAL. *Nasturtium* palustre, GESNER. *Herbe de sainte Barbe*, ou *Herbe aux charpentiers*.

Nasturtium indicum minus, OFF. *Petite Capucine*; *petit Cresson d'Inde*.

Nasturtium indicum, offic. *Nasturtium indicum majus*, C. B. *Capucine grande*; *grand Cresson des Indes* ou *du Pérou*.

Nasturtium palustre floribus luteis, GESNER. *Petit Cresson sauvage à fleurs jaunes*; *faux Cresson*.

Nasturtium filiquis verticaliter cordatis, HALLE-RII. *Tabouret*; *Bourse*,

Boursfette, ou *Mallette à berger*.

Nasturtium sylvestre scandulaceum, NONNULLOR. *Thlaspi* ou *Tharaspic des champs à larges filiques*.

Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum, C. B. *Thalitron* ou *Thaliætron*; *Science des chirurgiens*.

Nasturtium tectorum vel erraticum, NONNULLOR. *Thlaspi* ou *Tharaspic ordinaire*; *Moutarde* ou *Senevé sauvage*.

Nasturtium verrucarium, off. *Nasturtium verrucosum*, J. B. *Nasturtium* sylvestre, capsulis cristatis, TOURN. *Cresson sauvage*; *Corne de cerf d'eau*; *Ambrosie sauvage rampante*; *Pied de corneille* de RUEL.

NATRIX torquata, ALDROV. *Serpent à collier*.

NATSIATAM, RHEED. *Arbre qui produit les coques du Levant*.

NAVETA, RUEL. *Navet sauvage*; *Navette*.

NEFRIM, vel *Nerfin* aut *Nerfirim* Serapionis, ANGUILL. *Rose musquée* ou *de Damas*; *Rose muscate* ou *muscade*; *Rose muscatelle* ou *muscadelle*.

NENUPHAR album, BRUNSF. *Nénuphar* ou *Nénufar blanc*; *Blanc-d'eau*; *Lis d'eau* ou *d'étang*; *Volet*; *Plateau à fleurs blanches*.

Nenuphar luteum, BRUNSF. *Nénuphar jaune*; *Jaune*

d'eau ; Plateau à fleurs jaunes.

NEPETA ; Calamintha pulegii odore, C. B. Calament à odeur de pouliot.

Nepeta, off. Nepeta floribus interruptè spicatis pedunculatis, LINN. Herbe à chat ou au chat ; Cataire.

Nepeta agrestis, TRAGI. Calament des champs ; Pouliot-thym.

NEPHRITICUS lapis, OFFIC. Pierre néphrétique.

NERANTZIUM malum. Orange.

NERIS, NICAND. Laurier-rose ; Nérion ; Oléandre ; Rosage ou Rosagine.

NERIUM floribus rubescentibus, C. B. Nerion, sive Rhododendron, flore rubro, J. B. Nerion, sive Oleander, GER. & RAII. Nerion flore rubro, H. E. Laurier-rose ; Nérion ; Oléandre ; Rosage ou Rosagine.

Nerium indicum filiquis angustis, erectis, longis, geminis, BURM. Nerium foliis ovatis, acuminatis, petiolatis, LINN. Codagapala ou Cropal.

NERSIN, Nerfrim, vel Nerfrim Serapionis, ANGUILL. Rose musquée, ou de Damas ; Rose muscate ou muscade ; Rose muscatelle ou muscadelle.

NERVINA medicamenta. Remedes nervins.

NEX plantarum. QUORUMD. Coloquinte.

NICOTIANA femina, off. Nicotiana minor, C. B. & TOURN. Nicotiana minor, Priapeia QUIBUSDAM. Tabac femelle ; faux Tabac ; Tabac du Mexique ; Nicotiane à feuilles rondes ; petite Nicotiane.

Nicotiana major, off. Nicotiana major latifolia, C. B. & TOURN. Nicotiana major, sive Tabacum majus, J. B. Nicotiana foliis lanceolatis, LINN. Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.

Nicotiana major, seu Tabacum angustifolium, offic. Nicotiana major angustifolia, C. B. & TOURNEF. Nicotiana, sive Tabacum folio angustiore, J. B. Tabac de Virginie ; Péun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.

NIGELLA arvensis cornuta, C. B. Nigella sylvestris, TRAGI. Nielle des champs ; Nielle sauvage ou bâtarde ; Barbue ; Poivrete commune.

Nigella arvensis falso, Loliolum, QUORUMD. Nielle des bleds ; fausse Nielle ; Nielle bâtarde ; Alesne.

Nigella cretica, C. B. Nielle de Candie ou du Levant.

Nigella romana, off. Nigella flore minore simplici candido, C. B. Nigella vulgaris semine nigro & subflavo, GESN. Nigella romana, odora, LOBEL. Nigella petalis subtricuspidatis, foliis

- foliis subpilosis, LINN. *Nielle romaine*; *Nielle des jardins*; *Nielle cultivée ou domestique*; *Cumin noir*, ou *faux Cumin*.
- NIGELLASTRUM, off. Nigellastrum, aut Lychnis, seu Lychnoides segetum, PARK. *Nielle des bleds*; *fausse Nielle*; *Nielle bâtarde*; *Alesne*.
- NIL, vel Anil, CAMER. *Anil*, plante du Brésil.
- NINDSIM. *Ninzin*.
- NINZIN, off. *Ninzin*.
- Ninzin majus. *Gins-eng*, ou *Ginseng*.
- NISII, *Ninzin*.
- NISUS vulgò. *Epervier*, oiseau de proie.
- NITRUM humi, LINN. Nitrum terrâ mineralisatum, WALLER. *Nître*.
- Nitrum japonicum. *Nître du Japon*.
- Nitrum quartzosum aqueum, LINNÆI. *Crystal de Roche*.
- NOCHEZNOPALI, seu Nopalnochaztli, id est Coccus indicus in tunis quibusdam nascens, HERNAND. *Cochenille*.
- NOCTUA templorum alba, QUORUMDAM. *Frésaie*; *Effraie*, ou *Orfraie*; *Hibou des clochers*; *petit Chat-huant plombé*; *Chouart*; *Lucheron*.
- NOLI ME TANGERE, officin. *Balsamine jaune*; *Balsamine sauvage ou des bois*; *Merveille à fleurs jaunes*; *Herbe impatiente*.
- NOPAL, AMERICANORUM. Plante sur laquelle s'élevaient les cochenilles; elle se nomme encore Opuntia, Figuier d'Inde, Raquette, Cardasse, Nopal.
- NOPALLI. Plante sur laquelle s'élevaient les cochenilles; on la nomme aussi Opuntia, Figuier d'Inde, Raquette, Cardasse, Nopal.
- NOPALNOCHAZTLI, id est Coccus indicus in tunis quibusdam nascens, HERNAND. *Cochenille*.
- NOSTOCH, off. Nostoch cinniflorum, H. P. *Mouffe membraneuse*; *Nostoch des Allemands*.
- NUCES avellanæ. *Avelines*.
- Nuces è Barbados, Anglorum, DALE. & RAIL. *Fève purgative*: à Saint-Domingue, *Noix de médecine*; *Amande du ricin d'Amérique*, ou *Ricinoïde*, nommé aussi *Médecinier* ou *Pignon de Barbarie*.
- Nuces cupressi. *Fruits du cyprès*.
- Nuces heracleoticæ. *Avelines*.
- Nuces pistaciæ, off. *Pistaches*.
- Nuces ponticæ. *Avelines*.
- Nuces prænestinæ. *Avelines*.
- NUCLEI pinei moluccani sive purgatorii, off. *Graine du ricin indien*; *Pignons d'Inde*; *Pignons de Barbarie*; *Grains de Tilli* ou *des Moluques*.

NUCLEUS ricini vulgaris ,
OFF. *Graine de ricin* , ou
Pignon d'Inde.

NUCULA cathartica tertia ,
Avellana purgatrix , C. B.
Graine du médicinier d'Es-
pagne , ou *Noix purgative*.

NUMMULARIA major lutea ,
C. B. Nummularia , sive
Centimorbia , J. B. Num-
mularia supina , sive Num-
mularia , off. RUPP. Num-
mulaire ; *Herbe aux écus* ;
Monnoyere ; *Herbe à cent*
maux ; *Herbe qui tue les*
moutons.

NUX aquatica vel lacustris ,
NONNULLORUM. *Tribule*
aquatique ; *Macre* ou *Ma-*
cle ; *Cornouelle* ; *Cornuelle* ;
Cornicle ou *Corniche* ; *Châ-*
taigne d'eau , ou *Châtaigne*
cornue ; *Truffe d'eau* ; *Sal-*
ligot ou *Escarbot*.

Nux ben. *Ben* ou *Noix de ben*.

Nux juglans , sive regia vul-
garis , C. B. *Noyer*.

Nux metella , seu Stramo-
nium , OFF. *Pomme épi-*
neuse ; *Noix mételle* ; *Herbe*
aux sorciers ; *Herbe des*
magiciens ou *des démonia-*
ques ; *Herbe du diable* ;
Herbe à la taupe.

Nux moschata , OFF. *Muscade*
ou *Noix muscade*.

Nux moschata fructu oblon-
go , C. B. *Arbre qui porte*
la noix muscade mâle ou
sauvage.

Nux moschata fructu rotun-
do , C. B. *Arbre qui donne*
la noix muscade femelle ou
ordinaire.

Nux myristica & aromatica ,
OFF. *Muscade* ou *Noix*
muscade.

Nux vomica , OFF. *Noix vo-*
mique.

Nux vomica legitima , seu
Igasur Serapionis , CA-
MELLI. *Fève de S. Ignace*.

Nux vomica major , P. B.
Nux vomica vulgò , off.
compressa , hirsuta , J. B.
Arbre qui porte la noix vo-
mique.

Nux vomica minor moluc-
cana. *Arbre d'où se tire le*
bois de couleuvre.

NYMPHÆA alba major ,
C. B. Nymphæa alba ,
J. B. Nymphæa flore albo ,
CLUSII. Nymphæa can-
dida , TRAGI. Nymphæa
foliis integerrimis corda-
tis , calyce tetraphyllo ,
corollâ multiplici , LINN.
Nénuphar , ou *Nénuphar*
blanc ; *Blanc-d'eau* ; *Lis*
d'eau ou *d'étang* ; *Volet* ;
Plateau à fleurs blanches.

Nymphæa lutea major , C. B.
Nymphæa citrina , CORDI.
Nymphæa flore ex toto luteo , CÆSALP. Nymphæa
calyce magno pentaphyllo ,
LINN. *Nénuphar jaune* ;
Jaunet d'eau ; *Plateau à*
fleur jaune.

O L E

- O**CELLUS cervi, NONNULL. *Persil de montagne ou sauvage.*
- O**CHRA rubra cretacea, WALTER. *Craie rouge ; Crayon rouge ; Sanguine.*
- O**CIMUM, vel Ocimum, vel Ozimum, off. Ocimum caryophyllatum, C. B. Ocimum foliis ovatis glabris, LINN. *Basilic commun ou moyen ; Basilic aux sauces ou des cuisiniers.*
- O**cimum minimum, off. Ocimum caryophyllatum minus, TABERN. *Petit Basilic.*
- O**COCOTL Indorum, MONARD. *Arbre des incisions duquel découle le liquidambar.*
- O**CULARIA, sive Ophthalmica, CORDI. *Euphrase.*
- O**CULI cancrorum. *Yeux d'écrevisses ; dénomination fausse, car ce qui porte ce nom sont des pierres qu'on trouve dans leur estomac.*
- O**culi indi aromatici. *Baies rondes du caninga, lesquelles ont une odeur & une saveur de girofle.*
- O**CULUS bovis, BRUNSE. *Grande Marguerite ; grande Pâquerette ; Œil de bœuf.*
- O**culus bovis, sive Bupthalmum, CLUSII. *Œil de bœuf ; fausse Camomille jaune.*
- O**culus luciae vel marinus, NONNULL. *Nombril marin ; Ombrilic marin ; Nombril ou Fève de mer ; Limaçon de mer.*
- O**CYMASTRUM alterum, TRAGI. *Grande Scrophulaire commune.*
- O**cymastrum majus, GESN. *Scrophulaire aquatique ; Herbe du siège ; Bétoine d'eau ou aquatique.*
- O**cymastrum verrucarium, J. B. *Herbe de S. Etienne, ou Herbe enchanteresse.*
- O**CYMUM veterum, TRAGI. *Ocimum cereale, CLUS. & TABERN. Sarrazin, ou Blé sarrazin, ou Blé noir.*
- O**δονταλγικὰ φάρμακα. *Remedes odontalgiques.*
- O**DONTALGICA medicamenta. *Remedes odontalgiques.*
- O**ENANTHE apii folio, C. B. & TOURN. *Œnanthe, sive Filipendula monspessulana, folio apii, J. B. Œnanthe species DALECAMPII, Scrophularia, QUORUMDAM. Œnanthe ; Filipendule aquatique ; Persil de marais.*
- O**EPATA, RHEED. *Anacarde.*
- O**LCACATZAN pahua tanica, HERNAND. *Plante dont la racine est la squine d'Occident.*
- O**LEA major, sive hispanica, off. Olea sativa, C. B. *Olea fructu maximo, TOURN.*

- Olea foliis lanceolatis, ramis teretiusculis, LINN. Olivier à gros fruit.*
- Olea minor, off. Olea fructu oblongo minori, TOURN. Olea communis seu vulgarior, NONNULL. Olivier à petit fruit.*
- OLEANDER**, *sive Nerion, GER. & RAII. Oleander, Laurus rosea, LOBEL. Laurier-rose; Nérion; Oléandre; Rosage ou Rosagine.*
- OLEASTER rhodius.** *On croit que c'est l'arbre d'où vient le bois de Rhodes ou de rose.*
- OLEOSA.** *Oléagineux ou Huileux.*
- OLEUM minerale.** *Pétrole.*
- Oleum sanctæ Catharinæ.** *Pétrole.*
- Oleum sancti Barbari.** *Pétrole.*
- Oleum sanctum.** *Pétrole.*
- OLIBANUM, off.** *Oliban, ou Encens.*
- OLIVA crassior, circa Hispalim nascens, CLUS.** *Olivier à gros fruit.*
- Oliva minor oblonga, B. M.** *Olivier à petit fruit.*
- OLIVELLA, off.** *Camélée ou Chamélée; Garoupe; Olivier nain ou bâtard.*
- OLOR, SCHRODER.** *Cygne, oiseau.*
- OLUS calappoides, RUMPH.** *Arbre d'où l'on croit que se tire le sagou.*
- Olus cervinum, NONNULLOR.** *Panais ordinaire des jardins; Panais domestique ou cultivé; Pastenade ou Pastenaille; Grand Chervi cultivé.*
- Olus hispanicum, Spinacia vulgaris, TRAGI.** *Epinaud mâle, dont la graine est épineuse.*
- OLUSATRUM, CORDI.** *Maceron; gros Persil de Macédoine.*
- OLYRA, CORDI.** *Seigle ou Segle.*
- OMNIA sanans, DRUIDARUM.** *Gui commun; Gui de chêne.*
- OMNIMORBIA, NONNULL.** *Mauve commune, ou grande Mauve.*
- OMPHALOCARPOS, officin.** *Gratteron; Rieble.*
- ONAGRA latifolia, TOURN.** *ONAGRA foliis ovato-lanceolatis planis, HALLER. Herbe aux ânes.*
- ONISCUS, off. DALE.** *Merlan.*
- Oniscus, sive Asellus, ALDROV.** *Oniscus caudâ obtusâ bifurcâ, LINN. Cloporte; Pourcelet ou Porcelet de S. Antoine.*
- ONISIS major, sive Agrioriganum, LOBEL.** *Origan commun, ou grand Origan; Marjolaine sauvage ou bâtarde; Marjolaine d'Angleterre.*
- ONOBRYCHIS, off.** *Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major, floribus dilutè rubentibus, C. B. & TOURNEF. Onobrychis*

quibusdam flore pallido ;
vel Polygalon, RAIL. Sain-
foin ; gros Sain-foin.

ONOBROCHYS tertia purpu-
rea, DAL. *Polygala* ou
Polygalon ; *Herbe à lait*.

ONONIS, off. Ononis flo-
ribus subsessilibus, solita-
riis, lateralibus, caule spi-
noso, LINN. *Bugrande* ou
Bugrane ; *Arrête-bœuf*.

ONOPORDON *Athenæi*, AN-
GUILL. & GESN. Onopor-
dum foliis decurrentibus
margine spinosis, LINN.
Onopordon foliis tomen-
tosis, obiter laciniatis,
caule alato brachiato,
HALL. *Chardon commun* ;
grand Chardon aux ânes ;
Artichaut sauvage ; *Epine*
blanche, *sauvage* ou *des*
champs.

ONOSMA, MATTH. *Vipé-
rine* ou *Herbe aux vipères*.

ONYCHITES, SCHW. *Onyx*,
pierre précieuse.

ὄνυξ, GRÆCORUM. *Onyx*,
pierre précieuse.

ONYX, off. *Onyx*, *Pierre*
précieuse.

ὄνυξις, ACTUAR. & GRÆ-
CORUM RECENTIOR. *Ta-
marins*.

OPALIS, seu Opalus. *Opale*,
pierre précieuse.

OPERCULUM, officinis. *Um-
bilicus marinus* dictum,
BELLON. *Nombril marin* ;
Ombilic marin ; *Nombril* ou
Fève de mer ; *Limaçon de mer*.

OPHIOCTONUM, NONNULL.
*Panais ordinaire des jar-
dins* ; *Panais domestique*

ou *cultivé* ; *Pâstenade* ou
Pâstenaille blanche ; *grand*
Chervi cultivé.

OPHIOGLOSSUM, off. Ophio-
glossum vulgatum, C. B.
Ophioglossum, sive Lin-
gua serpentina, PARK. &
CÆSALP. Ophioglossum
folio ovato, spicâ distichâ ;
LINN. *Petite Serpentaire* ;
Ophioglosse ; *Langue de ser-
pent* ; *Herbe sans couture*.

OPHIORRHIZA, LINN. Ra-
cine de serpent.

OPHIOSCORODORUM, off.
Rocambole.

ὄφιόμαχος, GRÆCORUM VE-
TERUM. *Lézard verd*, ou
grand Lézard.

OPHRIS bifolia, C. B. Ophris
major quibusdam, C. B.
Ophris foliis ovatis, LINN.
Double-feuille ; *Herbe à*
deux feuilles ; *Herbe au*
charpentier, ou *aux cou-
pures*.

OPHTHALMICA, sive Ocu-
laria, CORDI. *Euphrase*.

Ophthalmica medicamenta.
Remedes ophthalmiques.

OPIATA. *Opiats*.

OPIUM. *Opium*, *suc épaissi*
du pavot.

OPOBALSAMUM, off. ὀπο-
βάλαμον, GRÆCOR. *Baume*
de Judée ; *Baume du Grand-
Caire* ; *Baume de Constan-
tinople* ; *Baume de la Mec-
que* ; *Baume blanc*.

ὀποπαναξ, GRÆCOR. *Opopa-
nax*, *suc résineux-gommeux*.

OPOPANAX ; *Opopanax*,
OFF. *Opopanax*, *suc rési-
neux-gommeux*.

Ο'πός , HIPPOCR. Ο'πός μὲνδ-
κός ; Ο'πός πῶπδύκος ; Ο'πός
κρηναίκος. *Assa-fœtida* ;
Merde au diable des Euro-
péens ; *Manger des dieux*
des Asiatiques.

OPULUS Ruellii, TOURN. &
LINN. *Obier* ou *Opier* ;
Sureau d'eau ou *aquatique*.

OPUNTIA maxima, folio ob-
longo rotundo majore, spi-
nulis obtusis, mollibus &
innocentibus obsito, flore
striis rubris variegato ,
SLOANE. *Plante sur la-*
quelle s'élevent les coche-
nilles ; *elle se nomme en-*
core Figuier d'Inde, *Ra-*
quette, *Cardasse*, *No-*
pal.

ORCHIS, off. Orchis, Mo-
rio mas foliis maculatis,
J. B. & TOURNEF. Orchis
major tota purpurea, ma-
culoso-folio, J. B. Orchis ;
Satyrion ; *Testicule* ou
Couillon de chien, *mâle*, à
feuilles étroites.

Orchis latifolia seu major,
OFFIC. & TOURN. Orchis
strateumatica major, J. B.
Orchis strateumatica, *vel*
Stratiotes major, *sive mi-*
litaris, C. GEMM. Orchis ;
Satyrion à larges feuilles ;
grand Testicule de chien.

ORELLANA folliculis lappa-
ceis, HERM. Orellana, seu
Urucu, P. B. P. *Achiote* ;
Urucu ; *Roucou.*

OREOSELINUM, sive Apium
montanum, off. Oreose-
linum apii folio majus ,

TOURN. *Grand Persil de*
montagne ou *sauvage.*

Oreoselinum, sive Apium
montanum minus, officin.
Oreoselinum, sive Veel-
gutta, DODON. Oreose-
linum apii folio minus ,
TOURN. *Petit Persil sau-*
vage ou *de montagne.*

Oreoselinum africanum gal-
baniferum frutescens, anisi
folio, TOURNEF. Oreose-
linum anisoïdes arboref-
cens ligustici foliis & fa-
cie, flore luteo, Capitis
Bonæ Spei, BREYN. *Arbre*
d'où découle la gomme ré-
sine appelée galbanum.

ORIGANUM creticum, lati-
folium, tomentosum, seu
Dictamnus creticus, TOUR-
NEF. Origanum foliis to-
mentosus, spicis nutanti-
bus, LINN. *Plante dont*
les feuilles sont le dictame
de Crete.

Origanum foliis ovatis obtu-
sis, spicis confertis, com-
pactis, pubescentibus, LIN-
NÆI. *Marjolaine vulgaire.*

Origanum minus, off. Ori-
ganum sylvestre humile,
C. B. & TOURNEF. Ori-
ganum repens villosum *Au-*
relianensium, H. R. P. Ori-
ganum sylvestre minus,
sive Agrioriganum, NON-
NULL. *Petit Origan* ; *petite*
Marjolaine sauvage.

Origanum vulgare, off. Ori-
ganum sylvestre, Cunila
bubula Plinii, C. B. &
TOURN. Origanum vul-
gare spontaneum, J. B.

- Origanum foliis ovatis , spicis laxis , erectis , confertis , paniculatis , LINN. Origanum spicis foliosis , brevissimis , coloratis , umbellatis , HALLER. Origan commun ou grand Origan ; Marjolaine sauvage ou bâtarde ; Marjolaine d'Angleterre.*
- ORLEANA , off. Orleana , seu Orellana folliculis lappaceis , HERM. Orleana , seu Orellana , seu Urucu , P. B. P. *Achiotl ; Urucu ; Roucou.*
- ORMINUM , offic. *Orvale ; Toute-bonne.*
- ORNITHOGALUM maritimum , *seu Scilla radice albâ , TournEF. Scille rouge ; grande Scille ; Oignon marin.*
- Ornithogalum maritimum , *seu Scilla radice rubrâ , TournEF. Scille rouge ; grande Scille ; Oignon marin.*
- ORNITHOPODIUM , off. Ornithopodium majus , C. B. Ornithopodium flore flavescente , J. B. Ornithopodium tuberosum , DALECAMP. *Pied d'oiseau , Griffes d'oiseau.*
- ORNITHOPUS , LINN. *Pied d'oiseau ou Griffes d'oiseau ; Ornithopode.*
- ORNUS , L. *Seconde espece de frêne qui donne la manne.*
- Ornus , *seu Fraxinus sylvestris , PARK. Sorbier ou Cormier sauvage.*
- OROBUS . off. Orobus filiquis articulatis , semine majore , C. B. Orobus , *seu Ervum multis , J. B. Orobus receptus herbariorum , GER. Orobus vulgaris herbariorum , PARK. Orobus verus , seu genuinus creditus , NONNULL. Orobe ; Ers ou Eres ; Pois de pigeon.*
- Orobus sativus , & Vicia major prima , TRAGI. Orobis perperam officinis , NONNULL. *Vesce noire ou commune.*
- ORVALA , off. & DODON. *Orvale ; Toute-bonne.*
- Orvala sylvestris , OFFICIN. *Orvale ; Toute-bonne des prés ou sauvage ; Sclarée.*
- ORVALLA , officin. *Orvale ; Toute-bonne.*
- ORYSON peregrinum , NONNULL. *Ris ou Riz.*
- ORYZA , off. Oryza italica , C. B. Oryza peregrina , TRAGI. *Ris ou Riz.*
- OS mundi , NONNULL. *Vesce noire ou commune.*
- OSMUNDA vulgaris & palustris , Tourn. Osmunda vulgaris *seu Filix florida , PARK. Fougere fleurie , ou Osmonde.*
- OSSAR. *Mot égyptien qui désigne une espece d'apocyn d'où se tire le sucre d'Egypte.*
- OSSICULA granatorum. *Semences de grenades.*
- OSSIIFRAGUS lapis , BOET. *Ostéocolle.*

OSTEOCOLLA, officin. *Ostéocolle.*

OSTEOCOLLUS, ALDROV.
Osteocollus crustaceus,
GESNER. *Ostéocolle.*

OSTERITIUM montanum,
Sanicula altera, QUORUMD.
Sanicle femelle ou de mon-
tagne.

OSTREA, SCHRODER. *Huître.*

Ostrea margaritarum mater,
seu Margaritigena, QUO-
RUMD. *Nacre de perles ;*
Mere de perles ; Mere-
perle ; Huître à l'écaille na-
crée.

OSTREUM, off. Ostreum
testâ inferiore elatiore, AR-
GENV. *Huître.*

OSTRUTIUM, DALE. *Impé-*
ratoire.

OSYRIS, MATTH. & FUCHS.
Osyris major, TABER-
NÆMONT. *Linairé ou Lin*
sauvage.

OTALGICA medicamenta. *Re-*
medes otalgiques.

OTIS, off. Otis, tetraonis
altera species, avis tarda,
BELON. Otis, seu Tarda
avis, QUORUMDAM. *Ou-*
tarde ; Otarde ; Bitarde.

ΟυσΙΑΙ ΣΗΠΤΙΚΑΙ. *Septiques,*
ou Substances septiques.

OVARIA, GESNER. *Tanaïsie*
des jardins, à feuilles de
menthe ; le grand Baume ;
la Menthe-coq ; la Menthe
Notre-Dame ; le Coq ; le
Pasté ; l'Herbe du coq ou
au coq ; le Coq des jar-
dins.

OVILLUM aut Ovinum pecus.
On désigne par ces termes,
le béliér, le mouton, la
brebis & l'agneau

OVIS, off. Ovis domestica,
cujus mas aries dicitur,
foetus agnus, RAIL. Ovis
cornibus compressis luna-
tis, LINN. *Brebis, nom*
sous lequel on entend encore
le béliér, le mouton, l'a-
gneau.

OXALIS pratensis, off. Oxa-
lis vulgaris, folio longo,
J. B. Oxalis, DODON.
Oseille ordinaire ; Oseille
longue ; Vinette.

Oxalis rotundifolia seu hor-
tensis, off. Oxalis folio
rotundiore repens, J. B.
Oseille ronde.

Oxalis scapo unifloro, foliis
ternatis, radice squamoso-
articulatâ, LINN. *Pain à*
coucou, Alleluia.

OXYACANTHA, DIOSCOR.
Buisson ardent, ou Arbre
de Moïse.

Oxyacantha putata. *Epine-vi-*
nette.

Oxyacantha vulgaris, sive
Spinus albus, J. B. Oxya-
cantha vera veterum,
SCHWENC. *Epine blanche ;*
Aubépin ; Aubépine ; No-
ble-Epine.

OXYCOCCUS, off. Oxy-
coccus, sive Vaccinia pa-
lustris, DODONÆI. *Can-*
neberge ; Cousines ; Cou-
sinettes, Coussinets des ma-
rais.

OXYCRATUM. *Oxyerat,*

OXYLAPATHUM, *sive* **LAPATHUM acutum**, J. B. & DODON. *Parelle*, ou *Patientie sauvage ordinaire*.

OXYMYRSINE, ANGUILL. *Houx frêlon*; *petit Houx*; *Housson*; *Fragon*; *Myrte sauvage* ou *épineux*; *Brusc*; *Buis piquant*.

OXYS, off. *Oxys flore albo*, TOURN. *Pain à coucou*; *Alleluia*.

OXYTRIPHYLLON *Dioscoridis*, *seu Asphaltion*, NONNULL. *Trefle odorant* ou *bitumineux*.

OXYTRIPHYLLUM, officin. *Pain à coucou*; *Alleluia*.

Oxytriphyllum alterum SCRIBONII, *herbariorum*, LOBEL. & GER. & VALER. DOUREZ. *Trefle hémorrhoidal*; *Lotier hémorrhoidal*.



P A L

PABULUM cervi, OFF. *Panaïs ordinaire des jardins ; Panaïs domestique ou cultivé ; Pastenade ou Pastenaille blanche ; grand Chervi cultivé.*

PACO caatinga BRASILIENSIBUS, MARCG. *Plante dont la racine est le costus.*

PACOCEROCA Brasiliensibus, PISON. & MARCG. *Plante dont la racine est le zérumbeth.*

PADUS foliis semper virentibus lanceolato-ovatis, LINN. *Laurier-rose ; Nérion ; Oléandre ; Rosage ou Rosagine.*

PÆONIA femina, off. *Pæonia femina, altera, DODON. Pivoine femelle.*

Pæonia mas, off. Pæonia folio nigricante, splendido, quæ mas, C. B. Pæonia mas præcocior, J. B. Pæonia mas foliis nucis, GESNER. Pivoine mâle ; Pione ou Péone.

PAGURUS, BELON. *Crabe ; Cancre de mer ; Cancre marin.*

PALA, PISON. *Arbre qui porte la noix muscade femelle ou ordinaire.*

PALAMET firi, Nux moschata mas dicta, PISON. *Arbre qui porte la noix muscade mâle ou sauvage.*

PALEA de Mechâ, NONNULOR. *Jonc odorant.*

PALIURUS folio jujubino, J. B. *Paliurus, DODON. Paliurus, sive Rhamnus tertius, Dioscoridis, PARK. Epine de Christ ; Paliure ; Porte-chapeau ; Argalon des Provençaux.*

PALMA amboïnenfis sanguinem draconis fundens altera, foliis & caudice undique spinis longis, acutissimis, nigris, armata, D. SHERARD. *Palma-pinus sive conifera, J. B. Palma conifera spinosa, seu Arundo facta, KÆMPFF. Seconde espece de palmier qui donne le sang-dragon.*

Palma americana spinosa, C. B. Arbre d'où se tire le bois d'ébene.

Palma Christi, Ricinus, vel Kiki, GERARD. Arbre qui donne la graine de ricin ou pignon d'Inde.

Palma cujus fructus sessilis Fausel dicitur, C. B. Cachou ; Catéchu ; Caetchu ; Castjoe ; Cate, Khaath ; & improprement Terre du Japon.

Palma humilis, longis latisque foliis, C. B. Le Bananier dont le fruit se nomme banane.

Palma indica caudice in annulos protuberante distincto, RAIH. Espece de palmier d'où l'on croit que se tire le sagou.

Palma major, C. B. **Palma** dactylifera major vulgaris, JONST. **Palma** drachel, PROSP. & ALP. **Palma** hortensis, KÆMPF. *Palmier-dattier.*

Palma pinus sive conifera, J. B. *Seconde espece de palmier qui donne le sang-dragon.*

Palma prunifera foliis yuccæ, è quâ sanguis draconis officinarum, COMMEL. **Palma** prunifera foliis yuccæ, fructu racemoso cerasiformi, officulo duro cinereo, pisi magnitudine, lacrymam sanguinis draconis fundens, BEAUMONT. *Premiere espece d'arbre qui donne la résine nommée sandaraque.*

PALO de la calenturas. *Nom que les Espagnols donnent à l'arbre dont l'écorce est le quinquina.*

PALUDAPIUM. *Ache.*

PALUS sanctus, QUORUMD. *Gaiac; Bois de gaiac; Bois saint.*

PANAX chironium, sive Flos solis, MATTH. *Hyssope des Gariques; Herbe d'or; Héliantheme.*

Panax coloni, Marrubium aquaticum, GERARD. *Petite Ortie puante.*

Panax costinum, C. B. **Panax** heracleum, MORIS. *Plante d'où découle l'opopanax.*

Panax foliis ternatis quinatis, GRONOV. & LINN. *Ginseng ou Ginseng.*

PANCRATIUM, DODON. **Pancrati**um verum, seu Scilla rubra, PARK. *Scille rouge, grande Scille; Oignon marin.*

Pancratium monspessulanum, multis Scilla alba parva, J. B. **Pancrati**um marinum, GERARD. *Scille blanche, ou petite Scille;*

PANICUM germanicum, sive paniculâ majore, flavâ, C. B. & TOURN. **Panicum** vulgare, J. B. **Panicum**, DODON. **Panicum** album vulgare, PARK. *Panis, ou Panix, ou Panic.*

Panicum paniculâ laxâ, flacidâ, foliorum vaginis pubescentibus, LINN. *Millet commun, jaune ou blanc; petit Millet; Mil commun.*

Panicum indicum, GESNER. **Panicum** locale, QUORUMD. *Grand Millet noir; Blé barbu; Sorgo.*

PANIS. *Pain.*

Panis cuculi, OFF. *Pain à coucou; Alleluia.*

Panis porcinus, & Arthanita, Rapum terræ, LOBEL. *Pain de pourceau.*

PANSI PANSI, G. CAMELLI. *Arbre qui porte l'anis de la Chine.*

PAO de aquila, DES PORTUGAIS. *Seconde espece de bois d'aloës, ou d'agalochum, suivant G. BAUHIN.*

PAPAS, off. **Papas** americanum, J. B. **Papas** Hispanorum; **Papas** seu **Papas** indicum vulgò, NONNULL. *Truffe rouge; Pomme de*

terre ; *Artichaut des Indes* ; *Battate commune des jardins*.

PAPAVER corniculatum luteum , *Ceratitis Dioscoridis*, & *Theoph. sylvestre*, *Ceratitis Plinio*, C. B. Papaver cornutum flore luteo, GERARD. & GESN. *Pavot cornu* ; *Glaucium à fleurs jaunes*.

Papaver corniculatum luteum , *Chelidonia dictum*, RAIL. *Grande Chélidoine* ; *Eclaire* ; *Félougne*.

Papaver erraticum majus , *Rhœas Dioscoridi* , *Theophrasto* , *Plinio* , C. B. Papaver erraticum rubrum campestre , J. B. Papaver rhœas , *sive caduco* flore puniceo , LOBEL. Papaver caule multifloro , folioso , hispido , foliis pinnatifidis , capsulis lævibus , LINN. *Pavot rouge des champs* ou *sauvage* ; *Coquelicot* ; *Ponceau*.

Papaver hortenfe , nigro semine , sylvestre *Dioscoridi*, nigrum *Plinio* , C. B. Papaver fimbriatum , flore purpureo & albo , J. B. Papaver nigrum sativum , DODON. Papaver minus nigro semine , GESNER. *Pavot noir*.

Papaver hortenfe semine albo , sativum *Dioscoridi* , album *Plinio* , C. B. Papaver album , J. B. Papaver album sativum , LOBEL. Papaver caule multifloro , foliis simplicibus ,

glabris , incisifs , caulinis , LINN. *Pavot blanc*.

PAPILIO bombycum , CHARLET. *Papilio bombyx*, QUORUMD. *Ver à soie* , ou *Chenille filant la soie*.

PAPILLARIS herba , QUORUMD. *Lampfane* ; *Herbe aux mammelles*.

PAPPUS , vel *Herba pappi* , NONNULL. *Senegon* ou *Senesson*.

PARADISI lignum. *Agallochum* ; *Bois d'aloës*.

PARALYSIS vulgaris pratensis , flore flavo simplici odorato , PARK. *Primevere* ; *Primerole* ; *Fleurs de coucou* ; *Braies de cocu* ; *Herbe à la paralysie*.

PARDALION. *Agate*.

PAIREIRA-BRAVA & Butua , OFF. *Paireira-brava* ; *Butua*.

PAIRELLA , off. *Patience* ou *Parelle*.

PARIETARIA , off. & *Diosc.* C. B. *Parietaria vulgaris* & *major* , TRAGI. *Parietaria foliis lanceolato-ovatis* , LINN. *Pariétaire* ; *Pariroire* ; *Vitriole* ; *Cassepierre* ; *Perce-muraille*.

PARIX major , NONNULL. *Grande* ou *grosse Mésange*.

PARNASSIA palustris & vulgaris , TOURNEF. *Parnassia* ; *Hépatique Blanche*.

PARONYCHIA , MATTH. *Capillaire blanc à feuille de rue* , ou *Sauve-vie*.

Paronychia , off. *Paronychia rutaceo folio* , GERARD. *Paronychia foliis incisifs* ,

- PARK.** *Paronychia lacinata*, NONNULL. *Petite Saxifrage rouge.*
- PARRA** PLINII. *Vanneau.*
- PARRUS & Capella**, BEL-LON. *Vanneau*, oiseau.
- PARTHENION**, seu *Linozostis*. *Mercuriale mâle*; *Foirole*; *Vignoble* ou *Vignette.*
- PARTHENIUM minus.** *Matricaire* ou *Espargoute.*
- PARUS**, off. *Parus major*, GESNER. *Parus carbonarius*, SCHWENCK. *Parus capite nigro*, temporibus *albis*, nuchâ *luteâ*, LINN. *Grande* ou *grosse Mésange.*
- PASSER TROGLODYTES**, off. & GESNER. & ALDROV. *Passereau troglodyte*, ou *Roitelet.*
- Passer vulgaris**, off. *Passer domesticus*, ALDROV. & WILLUGHBY. *Passer domesticus*, Strouthos, RAII. *Passereau*; *Moineau franc*, *domestique* ou *commun.*
- PASSERCULUS** qui dicitur *troglo-dytes*, sive in cavernis degens, NONNULL. *Passereau troglodyte*, ou *Roitelet.*
- PASSIANÆ** aquæ. *Eaux de Passy*, près *Paris.*
- PASSIPOMA**, seu *Calvilæa*, P. GONTHIER. *Pommes de calvilles.*
- PASSULÆ** corinthiacæ, OFF. *Raisins de Corinthe.*
- Passulæ** damascenæ, OFFIC. *Raisins de Damas.*
- Passulæ** massilioticæ, QUORUM D. *Raisins-passes*, ou *Passerilles*; *Raisins de Provence.*
- PASTINACA** aquatica, LOBEL. *Berle* ou *Ache d'eau.*
- Pastinaca* foliis decompositis pinnatis, LINN. *Pastinaca olusatris* folio, BOERH. *Plante d'où découle par incision l'opopanax.*
- Pastinaca* sativa latifolia, C. B. *Pastinaca sativa latifolia*, germanica, luteo flore, J. B. *Panais ordinaire des jardins*; *Panais domestique* ou *cultivé*; *Pastenade* ou *Pastenaille blanche*; *grand Chervi cultivé.*
- Pastinaca* sylvestris latifolia, C. B. & TOURN. *Pastinaca sylvestris*, QUIBUS DAM. *Elaphoboscum*, J. B. *Pastinaca latifolia sylvestris*, DODON. & GERARD. & PARK. & RAII. *Pastinaca foliis simpliciter pinnatis*, LINN. *Panais sauvage*; *petit Panais.*
- Pastinaca tenuifolia*, sativa, radice luteâ vel albâ, C. B. *Pastinaca sativa*, sive *Carotta lutea* vel *alba*, J. B. *Carotte des jardins.*
- Pastinaca tenuifolia sylvestris*, DIOSCOR. vel *Daucus* off. C. B. *Pastinaca sylvestris*, sive *Staphylinus* GRÆCOR. J. B. *Daucus vulgaire*; *Chirouis*; *Carotte sauvage.*
- PASTUS & Fenum** camelorum, NONNULLOR. *Jonc odorant.*
- PATIENTIA**, off. & culin. *Patientie* ou *Parelle.*
- Patientia*, sive *Lapathum sativum*, PARK. *Rhubarbe des moines.*

PAVO, off. Pavo & Pavus, BELLON. Pavo caudâ longâ, LINN. *Paon ordinaire ou commun.*

Pavo sylvestris, Kyvitta GERMANORUM. *Vanneau.*

Παχυντικὰ φάρμακα. *Remedes incrassantis.*

PECTEN Veneris, off. & PARK.

Pecten Veneris vulgi, seu Scandix sylvestris, CLUS. *Aiguille, ou Peigne de Vénus; Aiguille à berger.*

PEDICULUS, off. Pediculus humanus, LINN. *Pou humain, commun ou ordinaire.*

PEGANIUM veterum, QUORUMD. *Grande rue sauvage ou de montagne.*

PELA, H. M. *Guaiavier ou Goyavier, arbre des Indes occidentales.*

Πελαργός, GRÆCORUM. *Cigogne blanche ou commune.*

PELLA & ARDEA, BELON. *Héron gris ou cendré, oiseau.*

PENÆA foliis ovatis planis, LINN. *Arbrisseau d'où découle la sarcocolle.*

PENTAPHYLLUM, sive Quinquefolium vulgare repens, J. B. *Quintefeuille commune.*

Pentaphyllum, potius Hepataphyllum flore aureo tetrapetalo, *Tormentilla dictum, MOR. Tormentille.*

Πέπερι, GRÆCOR. *Poivre.*

PEPITA de Bisayas, HISPANOR. *Fève de S. Ignace.*

PEPO, MATTH. *Melon commun.*

PERCA fluviatilis, BELLON.

Perca fluviatilis major, ALDROV. Perca lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris, ARTEDI. Perca pinnis dorsalibus distinctis secunda radiis sedecim, LINN. *Perche de riviere, poisson.*

PERDICIUM, sive Helxine, Urccolaris, CÆSALP. *Parriétaire; Paritoire; Vitrivole; Cassé-pierre; Perce-muraille.*

PERDIX, off. Perdix minor fulva, BELLON. Perdix minor seu cinerea, SCHWENCH. *Perdrix grise ordinaire.*

PEREBECENUC, Oviedo, L. H. *Tabac mâle ou vrai; Nicotiane à larges feuilles.*

PERFOLIATA nostras, Cistus humilis palustris hederæ folio, PLUCK. *Parnassia; Hépatique blanche.*

Perfoliata sylvestris mas, BRUNSF. *Double-feuille; Herbe à deux feuilles; Herbe au charpentier, ou aux coupures.*

Perfoliata vulgatissima sive arvensis, C. B. Perfoliata simpliciter dicta, vulgaris, annua, J. B. Perfoliata vera seu genuina, Diaphyllum, QUORUMDAM. *Perce-feuille annuelle; vraie Perce-feuille.*

PERFOLIATUM vulgatius, flore luteo, folio umbilicato, LOBEL. *Perce-feuille annuelle; vraie Perce-feuille.*

PERFORATA caule rotundo , foliis glabris , J. B. Millepertuis , ou *Herbe à mille pertuis*.

PERICLYMENUM non perfoliatum germanicum , C. B. *Chevre-feuille*.

Periclymenum perfoliatum , C. B. **Periclymenum** rectum , TABERN. *Chevre-feuille qui se cultive dans les jardins*.

PERIGUA , off. *Alaterne* , troisième espece.

PERIPLOCA monspeliaca foliis rotundioribus , C. B. *Scammonée de Montpellier ; Apocyn à longues feuilles*.

PERISTEREON , seu *Verbenacea recta Dioscoridis* , HOFFM. *Verveine*.

PERISTERONA Crateræ , ANGUILL. *Ivette ordinaire*.

PERSEA , CLUSII. *Avocatier* , arbre.

PERSICA molli carne , & vulgaris , viridis & alba , C. B. *Pêcher ordinaire*.

PERSICARIA mitis maculosa & non maculosa , C. B. & Tourn. **Perficaria** vulgaris mitis seu maculosa , PARK. **Perficaria** maculis nigris , GESN. **Perficaria** florum staminibus senis , stylo duplici , LINN. **Perficaria** floribus hexandris digynis , LINN. **Perficaria** foliis non ferratis , penè glabris , vaginis foliorum ciliaribus , spicis densioribus , HALLER. *Perficaire douce maculée ou tachée ; Perficaire ordinaire*.

Perficaria urens , seu *Hydropiper* , C. B. & TournEF.

Perficaria vulgaris acris sive minor , PARK. **Perficaria** mascula , BRUNSE. **Perficaria** acris , spicis longis strigosioribus , vaginis non ciliatis , HALLER. *Perficaire âcre ou brûlante ; Piment* , ou *Poivre d'eau ; Curage*.

PERSONATA , off. *La Bardane* , ou *Glouteron*.

PERVINCA latifolia , off. **Pervinca** vulgaris latifolia , flore cæruleo vel albo , Tourn. *Grande Pervenche ; Pervenche à larges feuilles ; grand Pucelage*.

Pervinca vulgaris , off. **Pervinca** vulgaris angustifolia , flore cæruleo vel albo , TournEF. **Pervinca** quod semper vireat , TRAGI. **Pervinca** foliis ovato-lanceolatis , LINN. *Pervenche commune à feuilles étroites ; petite Pervenche ; petit Pucelage ; Violette des sorciers*.

PES avis , seu *Ornithopodium* , OFFIC. *Pied d'oiseau* ou *Griffe d'oiseau ; Ornithopode*.

PES cati , OFF. *Pied de chat* , plante.

PES columbinus , DODON. *Bec de grue* , ou *Pied de pigeon*.

PES corvinus , NONNULLOR. *Renoncule bulbeuse ; Bacinet ; Pied de corbin ; Pied de coq à racine ronde , ou à tubercule charnu*.

- Pes gallinaceus*, NONNULL. *Thlaspi* ou *Tharaspic* des champs, à larges filiques.
- Pes leonis*, off. *Pes leonis*, sive *Alchimilla*, J. B. *Pied de lion*; *Alchimille*.
- Pes leporinus*, sive *Lagopus*, MATTH. *Petit Trefle des champs*; *Pied de lièvre*.
- Pes leporis*, sive *Lagopodium*, GERARD. *Petit Trefle des champs*; *Pied de lièvre*.
- Pes milvinus*, NONNULLOR. *Renoncule des prés*; *Bacinet rampant & velu*.
- Pes milvinus*, COLUMELLÆ. *Cresson sauvage*; *Corne de cerf d'eau*; *Ambroisie sauvage rampante*; *Pied de corneille de RUEL*.
- PETASITES* major & vulgaris, C. B. & TOURN. *Petasites vulgaris*, rubens, rotundiore folio, J. B. *Petasites magnus perperam Tussilage major Matthioli*, L. H. *Petasites floribus spicatis*, flosculis omnibus androgynis, HALLER. *Pétasite*; *Herbe aux teigneux* ou à la teigne; *grand Pas d'âne*.
- Petasites minor*, C. B. *Petasites albus*, anguloso folio, J. B. *Petasites flore albo*, CAM. *Pétasite à fleurs blanches*.
- Petasites scapo unifloro*, flosculis in ambitu ligulatis, HALLER. *Tussilage*; *Pas d'âne*.
- PETI* tertium genus, NONNULL. *Tabac femelle*; faux

- Tabac*; *Tabac du Mexique*; *Nicotiane à feuilles rondes*; *petite Nicotiane*.
- PETIVERIA* solani foliis, loculis spinosis, PLUMM. *Petiveria*, LINN. *Chamaras*, ou faux *Scordium*; *Sauge des bois* ou *sauvage*.
- PETRAPIUM*, seu *Apium saxatile*, NONNULL. *Perfil de Macédoine*; *Ache* ou *Perfil des rochers*.
- PETREOLUM*. *Huile de pétrole*.
- PETRIFICATA* animalia vermium olothuriorum, WALLER. *Bélemnite*, ou *Pierre de lynx*.
- PETRIFICATUM* vegetabile radices arborum vel plantarum, WALL. *Ostéocolle*.
- PETRIFINDULA*, NONNULL. *Petite Saxifrage*; *petite Pimprenelle-Saxifrage*; *petite Bouquetine* ou *Boucage*; *petit Perfil de bouc*.
- PETROSELINI* vitium, TRAG. *Petite Ciguë*.
- PETROSELINUM* alexandrinum, TRAGI. *Macéron*; *gros Perfil de Macédoine*.
- Petroselinum crispum*, C. B. *Perfil frisé*.
- Petroselinum exoticum*, NONNULLOR. *Sison*, ou faux *Amome*.
- Petroselinum macedonicum*, seu *Apium*, off. *Petroselinum verum* seu legitimum, antiquorum, NONNULLOR. *Perfil de Macédoine*; *Ache* ou *Perfil des rochers*.

Petroselinum

Petroselinum vulgare, offic.
Petroselinum vulgò, seu
Apium hortense, C. B. &
TOURN. Persil commun ou
 ordinaire; Persil des jar-
 dins ou domestique.

PE-TSI, seu Gins-eng, SI-
 NENSIBUS. Gins-eng ou
 Ginseng.

PETUM angustifolium, CLUS.
 Tabac de Virginie; Petun
 des Amazones; Nicotiane
 à feuilles étroites.

Petum quartum, CLUS. Pe-
 tum minus folio rotundio-
 re, NONNULL. Tabac fe-
 melle; faux Tabac; Ta-
 bac du Mexique; Nico-
 tiane à feuilles rondes; pe-
 tite Nicotiane.

Petum Theveti latifolium,
 CLUSII. Tabac mâle ou
 vrai; Nicotiane à larges
 feuilles.

**PETUNUM alterum paulò mi-
 nore folio**, NONNULLOR.
 Tabac de Virginie; Petun
 des Amazones; Nicotiane
 à feuilles étroites.

PEUCEDANUM, offic. Peuce-
 danum germanicum, C. B.
 & **TOURN.** Peucedanum
 minus germanicum, J. B.
 Peucedanum, Feniculum
 porcinum, LOBEL. Peuce-
 danum foliis quintuplicato-
 tripartitis, linearibus subula-
 tis, integerrimis, LINN.
 Peucedanum primis dupli-
 catis pinnatis, foliis la-
 tiusculis, longè trifidis,
 HALLER. Queue de pour-
 ceau; Fenouil de Porc;
 Peucedane.

Tome VIII.

**Peucedanum foliis pinnatim
 divisis, laciniis oppositis**,
 LINN. Saxifrage des An-
 glois, ou des prés.

PEOFIST. Nom que les Alle-
 mands donnent à une espèce
 de Vesse de loup.

PHALÆNA pectinicornis clin-
 guis, Bombyx dicta, LINN.
 Ver à soie, ou Chenille
 filant la soie.

Φάρμακα ἀντ'ἀρμενικὰ. Remedes
 vermifuges.

Φάρμακα γαλακτοφόρα. Remedes
 galactophores.

Φάρμακα δραστικά. Remedes
 drastiques ou actifs.

Φάρμακα ἐκβολικά. Remedes
 echoliques.

Φάρμακα ἐμμεναγωγὰ. Remedes
 emmenagogues.

Φάρμακα ἐπιδροτικά. Remedes
 epulotiques.

Φάρμακα ἐρρηκτικά. Remedes ster-
 nutatoires.

Φάρμακα ἐσχαροτικά. Remedes
 escharotiques.

Φάρμακα ἥπατικά. Remedes hé-
 patiques.

Φάρμακα καθαιρετικά. Remedes
 cathérétiques ou rongeurs.

Φάρμακα καθάρτικά. Remedes
 cathartiques ou purgatifs.

Φάρμακα καυστικά. Remedes
 caustiques.

Φάρμακα καταγματικά. Remedes
 catagmatiques, ou con-
 tre les fractures.

Φάρμακα λεπυστικά. Remedes
 résolutifs ou atténuants.

Φάρμακα ὀδονταλγικά. Remedes
 odontalgiques.

Φάρμακα παχυντικά. Remedes
 incrassants.

A a

Φάρμακα προφυλακτικά. *Remedes prophylactiques.*

Φάρμακα πυροτικά. *Remedes pyrotiques.*

Φάρμακα πυροτικά. *Remedes pyrotoiques.*

Φάρμακα ρυπτικά. *Remedes deterfifs.*

Φάρμακα σπληνικά. *Remedes spléniques.*

Φάρμακα τραυματικά. *Remedes vulnérables.*

Φάρμακα χαλαστικά. *Remedes relâchants.*

Φάρμακα χολαγωγά. *Remedes cholagogues.*

Φάρμακα ψιλωτρά. *Remedes depilatoires.*

PHASEOLUS ægyptiacus, nigro semine, C. B. Phaseolus niger Lablab vocatus, PROSP. ALPIN. Lablab, espece de féverole ou haricot.

Phaseolus major, seu Bona, DODON. Fève de marais.

Phaseolus siliquis latis hispidis & rugosis, PLUMM. & CHEVALIER. Liane à canconne.

Phaseolus vulgaris, off. Phaseolus major, seu Smilax hortensis, C. B. Fève; Féverole; Haricot; Phaséole ou Phasiole; Fève peinte ou à visage; Fève ou Pois de mer.

PHASIANUS, off. Phasianus à Phaside Colchidis fluvio dictus. Faisan ordinaire ou commun.

PHASSACHATES. Agate qui représente un pigeon.

PHATZISIRANDA, seu Apoyamatli, cyperus americanus, HERNAND. Souchet d'Amérique.

PHELLOS, sive Suber, DODON. Liege.

PHILADELPHUS Athenæi, sive Syringa alba, C. B. Philadelphus flos, NONNULLOR. Syringa, ou Syringa commun.

PHILANTHROPOS, off. Grateron; Rieble.

PHILICA elatior & humilior, C. B. & JONST. Alaterne, premiere espece.

PHILLYREA, DODON. Troëne.

Phillyrea vulgaris, off. Phillyrea folio ligustri, C. B. & TOURN. Phillyrea latiusculo folio, J. B. Phillyrea latifolia foliis ferè non serratis, PARK. Filaria ou Philaria.

Φιλύρα, GRÆCORUM. Tilia Latinis, GUIL. Tilleul; anciennement Tillau ou Tillot.

Φλεβοτομία. Saignée.

PHOCA, off. Phoca, seu Vitulus marinus, GESNER. & ALDROV. & JONST. Phoca dentibus caninis tectis, LINN. Phoca seu Bos marinus, NONNULLORUM. Veau marin, ou Phocas.

PHÆNIX frondibus pinnatis, foliolis alternis ensiformibus, basi complicatis, petiolis compressis, dorso rotundatis, LINN. Palmier-dattier.

PHOSPHORUS bononiensis,
MONT. Phosphorus Kir-
cheri, QUIBUSDAM. Pierre
lumineuse, ou Phosphore
de Bologne.

PHU folio olusatrici Diosco-
ridis, Valeriana hortensis,
C. B. & TOURN. Phu ma-
jus, sive Valeriana major,
PARK. Phu magnum,
MATTH. Phu ponticum,
sive Valeriana pontica, TA-
BERN. Valériane des jar-
dins; Valériane franche;
grande Valériane.

Phu minimum alterum, LO-
BEL. Mâche; Blanchette;
Poule grasse; Clairette;
Doucette; Accroupie; Sa-
lade de chanoine.

Phu minimum palustre sive
aquaticum, NONNULLOR.
Valériane des prés ou des
marais; petite Valériane
aquatique.

Phu parvum, MATTH. Phu
Dioscoridis, BRUNSE. Phu
germanicum, FUCHS. Va-
lériane sauvage ou aes bois;
Valériane commune; petite
Valériane.

Φυκὸς θαλασσίον, DIOSCOR.
Algue commune.

Φύλλον Ἰνδικόν, ACTUAR.
Feuille indienne, ou Ma-
labathrum.

Φύλλον μαλαβαθρῶν, DIOSCOR.
& GALENI. Feuille indien-
ne, ou Malabathrum.

PHYCIS vel Merula fluviatilis
seu lacustris, QUORUMD.
Tanche ou Tenche.

PHYLLANTUS foliis pinnatis,
floribus pedunculatis, caule

arboreo, fructu baccato,
LINN. Arbre qui porte les
myrobolans emblics ou em-
bliques.

PHYLLIREA, CAST. Tilleul;
anciennement Tillau ou
Tillot.

PHYLLITIS, off. Phyllitis,
sive Lingua cervina, J. B.
Scolopendre vulgaire, ou
Langue de cerf.

PHYLLON thelygonum,
Theophrasti, CORDI. Mer-
curiale femelle ou à épi.

PHYLLUM, off. Phyllon ar-
renogonon, THEOPHR.
Mercuriale mâle; Foirole;
Vignoble ou Vignette.

PHYSALIS caule simplici, ra-
dice annuâ, foliis integer-
rimis geminatis, floribus
solitatis, LINN. Alké-
kenge; Coqueret; Coque-
relle.

PHYTEUMA DIOSCOR. & AN-
TIQUORUM. Herbe maure;
Rêfêda.

PHYTOLACCA americana
majori fructu, TOURNEF.
Phytolacca mexicana, bac-
cis sessilibus, DILLON.
Phytolacca foliis integerri-
mis, LINN. Morelle à
grappe; grande Morelle des
Indes; Vermillon ou Herbe
de la laque; Méchoacan du
Canada.

PICA, off. Pica varia caudata,
GESNER. Corvus caudâ cu-
neiformi, LINN. Pica rusti-
corum vulgaris, KLEIN.
Pica varia, longâ caudâ
insignis, QUORUMD. Pie;
Agace.

PICATIO. *Dropacisme.*

PICEA, MATTH. *Seconde espece de pin d'où découle la térébenthine commune.*

PICIELT *Mexicanorum*, HERNAND. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*

PICUS martis, LEMERI. *Picus martius major*, BELLON. *Picus viridis*, GESN. *Picus viridis nostras*, ALDROV. *Picus viridis*, vertice coccineo, *Picus arborarius*, sive *arborum excavator*, QUORUMD. *Pic-verd* ou *Piverd* ; *Pic-mart* ou *Pimart* ; *Grimpereau.*

PIEDRA di cobra de Capelos. *Pierre de serpent.*

PIETRA lucida, o Fosforo, di Bologna, BOCCONE. *Pierre lumineuse*, ou *Phosphore de Bologne.*

PILOSELLA, sive *Auricula muris* ; *Pilosella major repens hirsuta*, C. B. *Pilosella majori flore*, sive *vulgaris repens*, J. B. *Piloselle* ; *Oreille de rat* ou de *souris.*

Pilosella major, quibusdam ; *aliis Pulmonaria flore luteo*, J. B. *Pulmonaire des François* ; *Herbe à l'épervier à feuilles tachées.*

Pilosella major quibusdam, aliis *Gnaphalii genus*, J. B. *Pied de chat*, plante.

PILULÆ *Pilules.*

Pilulæ cupressi. *Fruits du cyprès.*

PIMENTA, off. ANGLIC. *Poivre de la Jamaïque.*

PIMIENTE de chiapa, FR. RHEDI. *Baies rondes du caninga*, lesquelles ont une odeur & une saveur de girofle.

PIMPINELLA saxifraga major, umbellâ candidâ, C. B. *Pimpinella saxifraga*, GERARD. & RAIL. *Pimpinella saxifraga hircina major*, PARK. *Pimpinella Germanorum* ; *Pimpinella alba* ; *Pimpinella major splendens* sive *umbellifera*, NONNULL. *Grande Saxifrage* ; *Pimprenelle blanche* ; *grande Pimprenelle saxifrage* ; *grande Bouquetine* ; *Boucage* ; *grand Persil de bouc.*

Pimpinella saxifraga minor, B. C. *Pimpinella saxifraga hircina minor*, PARK. *Pimpinella foliolis subrotundis*, LINN. *Petite Saxifrage* ; *petite Pimprenelle saxifrage* ; *petite bouquetine* ou *Boucage* ; *petit Persil de bouc.*

Pimpinella vulgaris, off. *Pimpinella sanguisorba minor hirsuta & lævis*, C. B. & TOURNEF. *Pimpinella tetrastemon*, foliis oblongè cordatis, spicâ brevi, HALLER. *Pimprenelle* ; *Pimpernelle* ; *Pimpinelle* ; *Pimpenelle* ; *Bipinelle.*

PINAS Hispanis. *Ananas.*

PINEI nuclei moluccani, sive purgatorii, OFF. *Graine du ricin indien* ; *Pignons d'Inde* ; *Pignons de Barbarie* ; *Grains de Tilli* ou des *Moluques.*

PINGUEDO. *Graisse.*

PINGUICULA, *off.* *Pinguicula*,
GESNERI, J. B. *Pinguicula*
nectario cylindraceo
longitudine petali, LINN.
Grassette; *Herbe grasse* ou
huileuse.

PINUNG, BONT. *Cachou*; *Catéchu*; *Caetchu*; *Cast-joe*; *Cate*; *Khaath*; &
improprement *Terre du Japon*.

PINUS indica *nucleo purgante*,
C. B. *Arbrisseau qui produit*
ce qu'on appelle Graine du
ricin indien, ou *Pignons*
d'Inde, ou *Pignons de Bar-*
barie, ou *Grains de Tilli*
ou des *Moluques*.

Pinus sativa, C. B. *Pinus* *offi-*
culis duris, *foliis longis*,
J. B. *Pinus foliis quinis*,
cono erecto, *nucleo eduli*,
HALLER. *Pinus foliis ge-*
minis, *primordialibus soli-*
tariis ciliatis, LINN. *Pin.*

Pinus sylvestris, C. B. *Pinus*
sylvestris vulgaris, *genuen-*
sis, J. B. *Pinus foliis ge-*
minis primordialibus soli-
tariis glabris, LINN. *Pre-*
miere espece de pin d'où dé-
coule la térébenthine com-
mune.

PIPER, **LATINOR.** *Poivre.*

Piper æthiopicum, *sive* *Piper*
nigrum & *Granum Zelim*,
SERAP. *Piper æthiopicum*,
MATTH. *Piper æthiopicum*
siliquosum, J. B. *Poivre*
d'Ethiopie.

Piper album & *Leuco-piper*,
off. *Piper rotundum album*,
C. B. *Poivre blanc*.

Piper aromaticum, *seu* *Lada*,
aliis *Molanga*, PISON.
Poivrier.

Piper Chiapæ, FR. RHEDI.
Baies rondes du caninga,
lesquelles ont une odeur &
une saveur de girofle.

Piper Germanorum, NON-
NULLOR. *Petite Saxifrage*;
petite Pimprenelle saxifra-
ge; *petite Bouquetine* ou
Boucage; *Petit Persil de*
bouc.

Piper indicum vulgare, *off.*
Piper indicum vulgatissi-
imum, C. B. *Piper indi-*
cum, sive calecuticum, sive
Piper siliquastrum, J. B.
Piper indicum longioribus
siliquis, LOBEL. *Poivre*
d'Inde, *de Guinée* ou *du*
Brésil; *Piment* ou *Poivre*
d'Espagne, ou *de Portu-*
gal, *en gouffes*; *Corail de*
jardin.

Piper jamaïcense. *Baie ronde*
du caninga, *laquelle a une*
odeur & une saveur de gi-
rofle.

Piper jamaïcense quibusdam;
DALE. *Piper odoratum ja-*
maïcense, *nostratibus*,
RAII. *Piper Tavasci*,
HERNAND. *Piper Chiapæ*,
RHEDI. *Piper THEVETI.*
Poivre de la Jamaïque;
Poivre de Thevet; *Amomi*;
Toutes-épices.

Piper longum & *Macropiper*,
off. *Piper longum orien-*
tale, C. B. *Piper foliis*
cordatis petiolatis sessili-
busque, LINNÆI. *Piper*
longum pistolochiæ foliis

- abſque pediculis, Maderaspatanum, PLUCK. *Poivre long.*
- Piper montanum, GESNER. *Laureole femelle; Bois gentil; Thymelée femelle des Pays-bas.*
- Piper murorum, ſeu murale. *Joubarbe âcre; Vermiculaire âcre ou brûlante; Pain d'oifeau; Poivre des murailles.*
- Piper nigrum, off. Piper rotundum, C. B. Piper foliis ovatis, petiolis ſimpliciſſimis, LINN. *Poivre noir.*
- Piper tavaſci, FR. RHEDI. *Baies rondes du caninga, lesquelles ont une odeur & une ſaveur de girofle.*
- PIPERITIS, ſive Lepidium vulgare, PARK. *Passe-rage.*
- PISA majora alba, J. B. Piſa majora fructu albo, MATTHIOLI. *Pois blanc; Pois commun des jardins; petit Pois cultivé.*
- PISCATOR regis. *Martin-pêcheur; Oifeau de ſaint Martin, ou ſimplement Martin; Alcyon muet; Piverd d'eau; Merle bleu.*
- PISCIS exos, ſive exoffis; Piſcis major Danubii, QUORUMD. *Grand Eſturgeon, poiſſon à colle.*
- Piſcis feſtuarius, NONNULL. *Morue, poiſſon.*
- PISEOLUS vulgò, CÆSALP. *Pois commun des jardins; petit Pois cultivé.*
- PISSASPALTUS; Piſſaſphaltos. *Piſſaſphalte, ou Poix minérale.*

- Πιſτᾱκια, DIOSCORID. *Piſtaches.*
- PISTACIA; Piſtacea, OFF. *Piſtaches.*
- Piſtacia, DIOSCOR. Piſtacia foliis imparipinnatis, foliis retroſum ſubſalcatis, LINN. *Piſtachier, arbre.*
- Piſtacia foliis abruptè pinnatis. *Lentisque, arbre.*
- Piſtacia foliis pinnatis deciduis, foliolis ovatis, LINNÆI. *Simarouba, arbre de l'Amérique.*
- Piſtacia foliis impare pinnatis, foliis ovato-lanceolatis, LINN. *Arbre d'où découle la térébenthine de Chio.*
- PISTACIÆ nuces. *Piſtaches.*
- PISTOLOCHIA, off. *Petite Ariſtoloche.*
- Piſtolochia virginiana, OFF. *Serpentaire de Virginie; Vipérine de Virginie.*
- PISUM columbinum, NONNULLOR. *Orobe; Ers ou Eres; Pois de pigeon.*
- Piſum vulgare, off. Piſum hortenſe majus, flore fructuque albo, C. B. & TOURNEF. Piſum vulgatiuſ majus, LOBEL. Piſum majus album; Piſum verum; Piſum romanum; Piſum rotundo & candido ſemine, QUORUMD. *Pois blanc; Pois commun des jardins; petit Pois cultivé.*
- PITYUSA grandis ſeu major, QUORUMD. *Tithymale des marais; grande Eſule; Turbith noir ou bâtard.*

PIX Burgundix. *Poix de Bourgogne.*

Pix mineralis. *Pissasphalte ; Poix minérale.*

PLANTAGO major, seu Septinervia, off. Plantago latifolia sinuata, C. B. Plantago major, folio glabro non laciniato, ut plurimum, J. B. Plantago latifolia vulgaris, PARK. & RAIL. Plantago scapo spicato, foliis ovatis, LINN. *Grand Plantain ; Plantain large ; Plantain ordinaire à larges feuilles.*

Plantago media seu quinque-nervia, off. Plantago latifolia incana, C. B. Plantago major hirsuta, media à nonnullis cognominata, J. B. Plantago major incana, PARK. Plantago foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, LINNÆI. *Plantain moyen ; Plantain blanc.*

Plantago minor seu trinervia, Plantago angustifolia major, C. B. Plantago lanceolata, J. B. Plantago minor longa, MATTH. Plantago foliis lanceolatis, spicâ ferè ovatâ, LINN. *Petit Plantain ; Plantain étroit ; Plantain rond ; Lancéole ou Lancelée.*

PLATANUS virginiana styracem fundens, seu Arbor virginiana, RAIL. *Arbre d'où découle le liquidambar.*

PLICARIA, officin. *Mousse rampante à massue ; Mousse*

des bois ; Pied ou Patte de loup.

PLUMBERIANÆ aquæ. *Eaux de Plombières, en Lorraine.*

PLUMBUM, off. Plumbum nigrum, PLINII. *Plomb.*

Plumbum album ; Plumbum candidum, PLINII. *Etain.*

Plumbum cinereum, AGRICOL. *Bismuth, demi-métal.*

POCGEREBA cortex. *Ecorce nommée Pocgereba.*

POINCIANA flore pulcherrimo, *Poincillade.*

POLION, seu Polium montanum flore albo, QUORUMD. *Polion de montagne à fleurs blanches.*

Polion flore luteo ; Polion vulgatus, QUORUMDAM. *Polion de montagne à fleurs jaunes.*

POLIUM album, off. Polium montanum album, C. B. & TOURN. Polium montanum monspeliacum, PARK. Polium alterum, seu candidum ; Polium seu Polion montanum flore albo, QUORUMDAM. *Polium de montagne à fleurs blanches.*

Polium creticum, OFF. *Polion de Crete.*

Polium luteum, off. Polium montanum luteum, C. B. Polium luteum vulgare, PARK. *Polion de montagne à fleur jaune.*

POLYCNEMON, LOBEL. *Calament des champs ; Pouliot-thym.*

POLYGALA, off. Polygala vulgaris, C. B. & Tourn. Polygala cærulea, purpurea, alba, TABERN. Polygala floribus imberbibus sparsis, carinæ apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis, LINN. *Polygala* ou *Polygalon*; *Herbe à lait*.

Polygala, GESNER. *Pied d'oiseau* ou *Griffe d'oiseau*; *Ornithopode*.

Polygala caule simplici erecto, foliis ovato lanceolatis, alternis, integerrimis, racemo terminatrice erecto, GRONOV. Polygala floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis, LINN. *Polygala de Virginie*.

POLYGALON, GESNER. & J. B.

Polygalon multis, J. B. *Polygala*, ou *Polygalon*; *Herbe à lait*.

POLYGALOIDES, HALLER. *Polygala*, ou *Polygalon*; *Herbe à lait*.

POLYGONATUM, seu Sigillum Salomonis, off. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. & TOURNEF. Polygonatum vulgare omnibus provinciis familiare, CLUSII. Polygonatum foliis alternis, petiolis multifloris, HALLER. *Sceau de Salomon*; *Signet*; *Genouillet*.

Polygonatum bifolium, scapo florifero aphylo,

HALLER. *Muguet*; *Lis des vallées*.

POLYGONIUM femina, FUSCH. *Grande Prêle*.

POLYGONUM foliis lanceolatis, floribus hexandris semi-digynis, LINN. *Persicaire âcre* ou *brûlante*; *Piment* ou *Poivre d'eau*; *Curage*.

Polygonum latifolium, C. B. Polygonum, sive Centinodia, J. B. Polygonum mas, DODON. Polygonum caule decumbente herbaceo, foliis lanceolatis, integerrimis, LINNÆI. *Renouée*; *Traînasse*; *Centinode*; *Corrigiole*.

Polygonum minus, sive Millegrana major glabra, C. B. *Turquette lisse*; *Herbe du Turc*; *Herniole*.

POLYPODIUM fronde duplicato-pinnatâ, foliolis obtusis, crenulatis, petiolo strigoso, LINN. *Fougere mâle*.

Polypodium quercinum vel quernum, off. Polypodium vulgare, C. B. Polypodium Filicula, Herba radioli Apulei, LOBEL. Polypodium fronde pinnatâ, foliis lanceolatis integris serrulatis alternis connato-sessilibus, LINNÆI. *Polypode de chêne*.

POLYTRICHUM, off. *Capillaire rouge*, ou *Polytric*. Polytrichum aureum, offic. Polytrichum aureum majus, C. B. Polytrichum capsulâ parallelipipedâ,

LINN. Polytrichum vulgare & majus, capsulâ quadrangulâri, HALLER. *Capillaire doré*, ou *Perce-mousse*.

POMA apiana; Poma rosea. *Pommes d'apis*.

Poma capendua, RUELL. Poma capendua, curtispēdia sive curtipēda, CAR. STEPH. Poma castiana, QUIBUSDAM. Poma curtispēdula. *Pommes de bardin*, ou *Pommes de court-pendu* ou *de capendu*.

Poma castinia, RUELL. *Pommes de châtaigne* ou *de martrange*.

Poma feniculata. *Pommes d'anis*, ou *Fenouillettes*.

Poma francatura. *Pommes de francatu*.

Poma paradisi, LUD. ROM. *Le Bananier dont le fruit se nomme banane*.

Poma renerea, aut praemila; Poma renetia, CAROL. STEPH. *Pommes de reinettes*.

POMIFERA seu potius Prunifera indica, nuce reniformi, summo pomo incrasscente, cajous dicta, RAI. *Acajou*.

POMUM mirabile, seu Momordica, OFF. *Pomme de merveille*; *Balsamine mâle* ou *rampante*.

PONVO bramanum, Costus iridem redolens seu indicus, C. B. *Plante dont la racine est le Costus*.

POPULO albæ similis in Alpibus, CÆSALP. *Bouleau*.

POPULUS alba majoribus foliis, C. B. & TOURN. Populus alba, λευκή, J. B. Populus alba latifolia, LOBEL. Populus foliis subrotundis, dentato-angulatis, subtus tomentosis, LINN. *Peuplier blanc*; *Peuplier à larges feuilles*; *Obeau*; *Aubel* ou *Obel*; *Orme blanc des Parisiens*.

Populus nigra, off. C. B. Populus foliis deltoïdibus, acuminatis, serratis (lævibus) LINNÆI. *Peuplier noir*.

PORCASTRUM sativum, NON-NULLOR. *Pourpier des jardins*, domestique ou commun; *Pourcellane* ou *Pourcellaine à larges feuilles*.

PORCELLANA hortensis, NON-NULLOR. *Pourpier des jardins*, domestique ou commun; *Pourcellane* ou *Pourcellaine à larges feuilles*.

PORCUS, off. Porcus domesticus, RAI. *Cochon*; *Porc* ou *Pourceau domestique*.

Porcus aculeatus, seu Hystrix malacensis, SEBA. *Porc-épic*.

Ποροτικά Φάρμακα. *Remedes porotiques*.

POROTICA medicamenta. *Remedes porotiques*.

PORRUM, off. Porrum commune capitatum, C. B. & TOURN. *Porreau* ou *Poireau*.

PORRUS communis seu capitatus. *Porreau*, ou *Poireau*.

PORTULACA sativa, off. Portulaca latifolia, seu sativa, C. B. & TOURNEF. Portulaca hortensis latifolia, J. B. Portulaca latioribus foliis, CÆSALP. Portulaca foliis cuneiformibus sessilibus, LINNÆI. *Pourpier des jardins, domestique ou cultivé; Pourcellane ou Pourcellaine à larges feuilles.*

Portulaca sylvestris, off. Portulaca angustifolia, sive sylvestris, C. B. & TOURNEF. Portulaca sylvestris minor, sive spontanea, J. B. Portulaca sponte nascens, CORD. Portulaca angustioribus foliis, CÆSALP. Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus, floribus sessilibus, LINN. *Petit Pourpier, ou Pourpier sauvage; Porcellane, Pourcellane ou Pourcellaine à feuilles étroites.*

PORUS igneus lapidis asbesti, WALL. *Pierre-ponce.*

POTENTILLA, off. Potentilla foliis pinnatis, caule repente, LINN. Potentilla repens scapo nudo unifloro, pinnis plurimis confertis, minoribus, intermistis, HALL. *Argentine.*

Potentilla foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris, LINN. Potentilla foliis quinatis, longè petiolatis, caule repente, HALL. *Quintefeuille commune.*

Potentilla foliis quinatis flore tetrapetalo, caule erecto, HALLER. *Tormentille.*

POTERIUM inerme filamentis longissimis, VAN. ROYEN. *Pimprenelle; Pimpernelle; Pimpinelle; Pimpenelle; Bipinelle.*

POTIO. *Potion.*

PRASIMUM, ANGUILL. *Mar-rube blanc.*

PRASOMILA mala. *Pommes de reinettes.*

PRASSIUM album, seu Mar-rubium, TABERN. *Mar-rube blanc.*

PRIAPEIA quibusdam, Nicotiana minor, J. B. *Tabac femelle; faux Tabac; Tabac du Mexique; Nicotiane à feuilles rondes; petite Nicotiane.*

PRIMI generis fungorum esculentorum tertia species, CLUS. *Morilles.*

PRIMULA veris, off. Primula veris odorata, flore luteo simplici, J. B. Primula veris flavo flore elatior, CLUSII. Primula foliis denticulatis rugosis, limbo corollarum concavo, LINN. Primula foliis rugosis, hirsutis, spicâ inclinâtâ, flore flavo, majori, odore, HALLER. *Primevere; Prime-rose; Fleur de coucou; Braies de cocu; Herbe à la paralysie.*

Primula veris, CÆSALP. *Petite Marguerite; petite Pâquerette.*

Προφυλακτικὰ Φάρμακα. *Remedes prophylactiques.*

PROPHYLACTICA medica-
menta. *Remedes prophylactiques.*

PROSCARABÆUS, off. Proscarabæus, sive Anticantharus, CHARLET. Scarabée onctueux; Proscarabée; Escarbot onctueux.

PROTEUS, CHYMICOR. Mercure; Vif argent.

PROVINENSES aquæ. *Eaux de Provins, dans la Brie champenoise.*

PRUNA claudiana vulgò. *Reine-claude.*

Pruna coloris ceræ ex candido in luteum pallescentis, C. B. Pruna cerea, sive Cereola, TABERN. Pruna sanctæ Catharinæ vulgò. *Prunes de sainte Catherine.*

Pruna ex flavo rufescentia, mixti saporis gratissima, C. B. Pruneola Brignolæ; Pruna brignolina, seu briolentia, seu brignolentia. *Prunes de Brignoles.*

Pruna magna, dulcia, atrocærulea, C. B. Pruna damascena, L. H. *Prune de Damas, ou gros Damas; Prune de Saint-Cyr; gros Damas violet de Tours.*

Pruna parva ex viridi flavescencia, C. B. Pruna parva ferotina, cereola, GESN. Pruna mirabilia vulgò, sive mirè bella. *Mirabelle.*

Pruna rotunda flava, dulcia, mali amplitudine, C. B. Pruna rubicunda instar mali armeniaci. *Damas gris; Prune d'abricot ou abricotée.*

Pruna subrotunda flavescencia; Pruna domini, PARI-SIENS. *Perdrigon de Cernai; double Damas; Passe-velours; Prune de Monsieur.*

PRUNELLA, off. Prunella flore minore, vulgaris, J. B. Brunelle.

PRUNIFERA indica, nuce reniformi, summo pomio incrassante, Cajous dicta, RAI. *Acajou.*

PRUNO vel evonymo affinis Arbor, folio alato, buxco, subrotundo; flore pentapetalo, cæruleo, racemoso; fructu aceris cordato, cujus cortex luteus, corrugatus, semen unicum, majusculum, nigricans, nullo osficulo rectum operit, SLOANÉ. *Gaiac à fleurs bleues dont le fruit est arrondi.*

PRUNUS brignoniensis, fructu suavissimo, TOURN. *Prunier qui porte la prune de Brignoles.*

Prunus fructu cerei coloris, TOURN. *Prunier qui porte la prune de sainte Catherine.*

Prunus fructu magno, dulci, atrocæruleo, TOURNEF. *Le Prunier qui porte le gros damas violet de Tours.*

Prunus fructu majori, virescente, suavissimo, JUS-SIEU. *Prunier qui porte la reine-claude.*

Prunus fructu maximo rotundo, flavo & dulci, TOURN. *Prunier qui porte*

le damas gris , ou prune d'abricot.

Prunus fructu ovato , maximo , flavo , **TOURNEF.** *Prunier qui porte le perdrigon de Cernai , ou prune de Monsieur.*

Prunus fructu parvo ex viridi flavescente , **TOURNEF.** *Prunier qui porte la mirabelle.*

Prunus malabarica fructu racemoso , calyce excepto , **RAII.** *Arbre qui produit les sébastes.*

Prunus sativa , **off.** **Prunus inermis , foliis lanceolato-ovatis ,** **LINNÆI.** *Prunier cultivé.*

Prunus brasiliensis fructu racemoso , ligno intus pro officulo , **RAII.** *Arbre qui porte un fruit nommé Prunes de Monbain.*

Prunus sylvestris , **C. B.** **Prunus spinosa , foliis lanceolatis ,** **LINNÆI.** *Acacia de notre pays ; Prunellier ; Prunier sauvage.*

PSEUDO-ACACIA vulgaris , **I. R. H.** *Acacia commun ; grand Acacia ; Acacia en arbre d'Amérique ; faux Acacia.*

PSEUDO-ACORUS. *Le faux Acorus.*

PSEUDO-CHAMÆDRYS , **TILL.** *Véronique des bois ou des haies.*

Pseudo-chamædrys , *seu Chamædrys sylvestris ,* **NONNULLOR.** *Véronique des prés , ou Germandrée bâtarde.*

PSEUDO-CHINÆ RADIX **Clusii ,** **J. B.** *Squine d'Occident.*

PSEUDO-HEPATORIUM alterum , *seu femina ,* **TRAGI.** *Chanvre aquatique , ou Eupatoire femelle bâtarde.*

PSEUDO-IRIS , **PARK.** *Le faux Acorus.*

PSEUDO-LYSIMACHIMUM purpureum alterum , **DODON.** *Salicaire commune ; Lysimachie rouge.*

PSEUDO-MELANTHIUM , *seu Nigellastrum ,* **OFF.** *Nielle des bleds ; fausse Nielle ; Nielle bâtarde ; Alesne.*

PSEUDO-MELILOTUS , **CAMER.** *Petit Lotier , ou Trefle sauvage jaune.*

PSEUDO-MYRSINE , **QUORUMDAM.** *Myrte du Brabant ; Myrte bâtard des pays froids ; Piment royal ; Galé.*

PSEUDO-MYRTUS , **QUORUMDAM.** *Myrte du Brabant ; Myrte bâtard des pays froids ; Piment royal ; Galé.*

PSEUDO-NARCISSUS marinus albus , *Pancratium vulgò ,* **PARK.** *Scille blanche , ou petite Scille.*

PSEUDO-NARDUS *quæ Lavandula vulgò ,* **J. B.** *Pseudonardus femina ,* **MATTH.** *Lavande femelle.*

Pseudo-nardus , *quæ vulgò Spica ,* **J. B.** *Lavande mâle ; Spic ; Aspic ; Nard commun.*

PSEUDO-ORCHIS , *Bifolium ,* **DODON.** *Double-feuille ;*

- Herbe à deux feuilles ;*
Herbe au charpentier , ou
aux coupures.
- PSEUDO-RHA, off. & RECEN-
 TIORUM. *Rhubarbe bâ-*
tarde , ou fausse Rhubarbe.
- PSEUDO-RHABARBARUM ,
 off. *Rhubarbe bâtarde , ou*
fausse Rhubarbe.
- PSEUDO-SENNA , sive Senna
 europæa, BOERH. *Bague-*
naudier , ou Déné bâtard.
- PSIDIUM. *Ecorce de grenade.*
 Ψιδίωτρα φάρμακα. *Remedes dé-*
pilatoires.
- PSILOTHRUM. *Dépilatoire.*
- PSORA, QUORUMDAM. *Sca-*
bieuse ordinaire des prés ou
des champs.
- PSYLLIUM annuum , officin.
 Psyllium majus erectum ,
 C. B. Psyllium vulgare ,
 PARK. *Herbe aux puces*
annuelle.
- Psyllium perenne , off. Psyl-
 lium majus supinum , C. B.
 Psyllium majus semper vi-
 rens , PARK. Psyllium pli-
 nianum fortè , radice pe-
 renni , supinum , LOBEL.
Herbe aux puces.
- PTARMICA, off. Ptarmica
 vulgaris , folio longo , ser-
 rato , flore albo , J. B. &
 TOURN. *Herbe à éternuer.*
- Ptarmica lutea suaveolens ,
 TOURNEF. *Eupatoire de*
MÉSUE.
- PTERIS fronde suprâ decom-
 positâ , foliis pinnatis , pin-
 nis lanceolatis , infimis pin-
 natifidis , superioribus mi-
 noribus , LINNÆI. *Fou-*
gere commune ou femelle.
- PTISANA ; græcè , πτισανή.
Ptisane.
- PULEGIUM agreste , SERA-
 PIONIS, TRAGI. *Pouliot*
des champs.
- Pulegium regale , vel regium ,
 off. Pulegium latifolium ,
 C. B. Pulegium vulgare ,
 PARK. Pulegium femina ,
 FUCHS. Pulegium floribus
 subrotundis , verticillis nu-
 dis , HALL. *Pouliot com-*
mun , ou Pouliot royal.
- Pulegium sylvestre , sive Ca-
 lamintha altera , DOD. Ca-
 lament à odeur de pouliot.
- PULEIUM CICERONI & CO-
 LUMELLÆ. *Pouliot com-*
mun ; Pouliot royal.
- PULICARIS , seu Pulicaria
 herba. *Herbe aux puces.*
- PULMONARIA angustifolia ;
 off. Pulmonaria angustifo-
 lia , rubente cæruleo flore ,
 C. B. Pulmonaria rubro
 flore , foliis echii , J. B.
 Pulmonaria quinta panno-
 nica , CLUS. Pulmonaria
 foliis radicalibus lanceola-
 tis , LINN. Pulmonaria mi-
 nor vulgaris , QUORUMD.
Petite Pulmonaire ; Pul-
monaire à feuilles étroites.
- Pulmonaria arborea , off. Pul-
 monaria , DODON. Pul-
 monaria fungosa , L. *Pul-*
monaire de chêne.
- Pulmonaria Gallorum , off.
 Pulmonaria flore lutco ,
 quorumdam , J. B. Pulmo-
 naria gallica sive aurea ,
 TABERN. *Pulmonaire des*
François ; Herbe à l'éper-
vier à feuilles tachées.

Pulmonaria latifolia, off. & C. B. *Pulmonaria Italorum* ad buglossum accedens, J. B. *Pulmonaria vulgaris*, maculoso folio, CLUS. *Pulmonaria maculosa*, GER. & RAII. *Pulmonaria latifolia maculosa*, PARK. *Pulmonaria foliis radicalibus ovato-cordatis*, LINNÆI. *Grande Pulmonaire*; *Pulmonaire à feuilles larges*; *Herbe au lait de Notre-Dame*; *Herbe aux poumons*; *Herbe du cœur*.

PULMONARIÆ genus. *Lichen d'Islande*; *Mousse purgative*; *Mousse des phthysiques ou pulmoniques*; *Mousse de Suede*, ou de *Laponie*; *Mousse des rennes*; *Mousse d'Islande des boutiques*.

PULSATILLA, off. *Pulsatilla folio crassiore & majore flore*, C. B. & TOURNEF. *Pulsatilla purpurea caruleave*, J. B. *Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore nutante, limbo recto*, LINN. *Coquelourde*; *Pulsatile*; *Passe velours*.

PULVERES. *Poudres*.

PUMEX, off. & SCHROD. *Pumex pyritæ cinereus*, LINN. *Pierre ponce*.

PUNICA flore pleno majore, TOURNEF. *Grenadier-balaustier*, & *Paparoi*.

Punica, vel *Granata malus sativa*, OFFIC. *Grenadier domestique*.

Punica quæ malum granatum fert, CÆSALP. *Grenadier domestique*.

PUNICUM malum. Grenade, fruit du grenadier.

PURGANTIA medicamenta. *Remedes purgatifs*.

PUSILLUS frutex aculeatus, QUORUMDAM. *Soude épineuse*; *Salicote épineuse*; *Marie épineuse*.

PUSTECH & FESTUCH, ARABUM. *Pistaches*.

PYCNOCOMON, COLUMN. *Scabieuse des bois*; *Succise*; *Mors ou Remors du diable*.

PYRA, MATTH. *Poirier domestique*, franc ou cultivé.

Pyra insana, CÆSALP. *Mélongene* ou *Melangene*; *Maïenne*; *Aubergine*.

Pyra strangulonea, seu *strangulatoria*, NONNULLOR. *Poirier sauvage*, ou des bois.

PYRACANTHA, off. *Buïsson ardent*, ou *Arbre de Moïse*.

PYRASTA, seu *Pyrus sylvestris*, J. B. *Poirier sauvage* ou des bois.

PYRETHRUM, BRUNSE. *Herbe à éternuer*.

Pyrethrum vulgò, & *veteribus Arabibus Guntuff*, D. SHAW. *Pyrethre*, première espece.

PYRMONTANÆ aquæ. *Eaux de Pyrmont*, en *Westphalie*.

PYROLA, officin. *Pyrola rotundifolia major*, C. B. *Pyrola nostras vulgaris*, PARK. *Pyrola à pyri folio*, LOBEL. *Pyrola staminibus ascendentibus, pistillis declinatis*, LINNÆI. *Pyrola vulgatio*, satis amplo

mollique folio, CLUSII.

Pyrole; *Verdure d'hiver*.

Pyrola rotundifolia palustris nostras, flore unico ampliore, H. O. *Parnassia*,

Hépatique blanche.

Πυρολίνα Φάρμακα. Remedes pyroïques.

PYRUM, TURN. *Poirier domestique*, franc ou cultivé.

PYRUS, off. *Pyrus sativa*;

C. B. *Pyrus foliis serratis*, pomis basi productis, LINNÆI. *Poirier domestique*, franc ou cultivé.

Pyrus sylvestris, off. *Pyrus sylvestris major*, C. B. *Pyrus sylvatica*, NONNUL-LORUM. *Poirier sauvage* ou des bois.



Q U I

QUABEBÆ, ARABUM. *Cubebes.*

QUADRUPES naso cornigero,
QUORUMD. *Rhinocéros ;*
& par les Portugais, *Moine*
des Indes.

QUAUHAYOHUATLI secunda,
sive Cassia fistula, HER-
NAND. *Arbre dont le fruit,*
ou la gousse, est la casse so-
lutive.

QUERCULA calamandrina,
GERMANORUM. *Petit*
Chêne ; Chénette ; Ger-
mandrée.

QUERCUS, officin. *Quercus*
latifolia mas quæ brevi

pediculo est, C. B. *Quercus*
vulgaris brevibus ac longis
pediculis, J. B. *Quercus*
foliis annuis oblongis su-
perne latioribus, sinibus
acutioribus, angulis ob-
tusis, LINN. *Chêne com-*
mun à larges feuilles.

QUINQUEFOLIUM, off. *Quin-*
quefolium majus repens,
C. B. & TOURN. *Quinque-*
folium vulgare repens,
J. B. *Quintefeuille com-*
mune.

QUINQUINA, RAIH. *Arbre*
dont l'écorce est le quin-
quina.



RADICULA,

R A I

RADICULA, seu Radix dulcis, QUORUMD. Polypode de chêne.

Radícula palustris, off. Radícula sylvestris, sive palustris, J. B. Radícula palustris vulgaris, QUORUMDAM. Raifort d'eau ou aquatique; Cresson à feuilles de raifort.

Radícula sativa minor, DON. Raifort cultivé ou des jardins; Rave des Parisiens.

Radícula sylvestris foliis profundè laciniatis, QUORUMDAM. Raifort d'eau, ou de marais, à feuilles laciniées.

RADIX, seu Radícula dulcis, QUORUMD. Polypode de chêne.

Radix cava minima viridi flore, GER. Moscatelline; Herbe du musc; Herbe musquée.

Radix cervina nigra, NONNULLOR. Grand Persil de montagne ou sauvage.

Radix dulcis, OFFICIN. Réglisse.

Radix idæa fructu nigro, ANGUILL. Airelle; Myrtille; Raisin de bois; Bleuets; Morets; Mûres de ronces.

Radix lupi, seu Luparia. Aconit bleu; Tue-loup; Napel; Coqueluchon; Capuchon; Capuce de moine; Madriettes.

Tome VIII.

Radix idæa putata, & Uva ursi, J. B. Vigne d'ours, ou Boufferole.

Radix pseudo-chinæ Clusii, J. B. Squine d'Occident.

Radix mechoacan. Méchoacan; Rhubarbe blanche.

Radix rhodia, OFF. Orpinrose.

Radix rubra, QUORUMDAM. Tormentille.

Radix rubra, NONNULLOR. Garance ordinaire ou cultivée; Garance des teinturiers.

Radix sanctæ Helenæ, galangæ species, J. B. Souchet d'Amérique.

Radix serpentum, Radix mungos, KÆMPF. Racine de serpents.

Radix snakeroot novæ Angliæ, CORN. Serpenteaire de Virginie; Vipérine de Virginie.

Radix spiritûs sancti agyrtarum, C. HOFFM. Angélique.

Radix tuberosa nucis juglandis magnitudine, NONNULLOR. Renoncule bulbeuse; Bacinet; Pied de corbin; Pied de coq à racine ronde, ou à tubercule charnu.

RAFAS, ARABUM. Plomb.

RAIZ de oro, HISPANOR. seu Bexuguillo. Ipécacuanga gris.

Raiz de safro, LUSITANOR. Curcuma rond.

B b

RAMUS aureus, VIRGILII, nonnullor. *Gui commun ; Gui de chêne.*

RANA aquatica & innoxia, GESNER. Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice longiori, LINN. Rana viridis, amphibia, edulis; Rana vulgaris, remigans, in aquis degens, seu paludum incola, NONNULL. *Grenouille.*

Rana terrestris omnium maxima, QUORUMD. Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice breviori, LINNÆI. *Crapaud.*

Rana viridis. *Grenouille de S. Martin ; Martinolle ; Rainette ; Grenouillette ; Raine-verte ; Grenouille de buisson.*

RANUNCULUS aquaticus umbilicato folio, CLUSII. Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio, C. B. *Hydrocotyle, ou Ecuelle d'eau.*

Ranunculus bulbosus seu tuberosus, off. Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundâ, C. B. Ranunculus tuberosus major, J. B. Ranunculus bulbosus, LOBEL. Ranunculus *Flammula* dictus, GESN. Ranunculus radicibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis, LINN. Ranunculus radice bulbosâ vel tuberosâ flore simplici, CAMER. *Renoncule*

bulbeuse ; Bacinet ; Pied de corbin ; Pied de coq à racine ronde, ou à tubercule charnu.

Ranunculus feniculaceis foliis, hellebori nigri radice, TOURN. & H. R. M. *Ellébore noir à fleur d'œil de bœuf.*

Ranunculus longifolius, aliis *Flammula*, J. B. Ranunculus longifolius minor, C. B. Ranunculus foliis ovato-lanceolatis (integerimis) petiolatis, caule declinato, LINN. & HALL. *Renoncule à longue feuille.*

Ranunculus nemorosus, off. Ranunculus phragmites albus & purpureus vernus, J. B. & TOURN. Ranunculus nemorosus albus simplex, PARK. *Renoncule des bois ; Bacinet blanc ou purpurin ; fausse Anémone printanière des forêts.*

Ranunculus nemorosus, *Moschatellina* dictus, C. B. Ranunculus minimus Septentrionalium herbido muscoso flore, LOBEL. *Moscatelline ; Herbe du musc ; Herbe musquée.*

Ranunculus palustris, off. Ranunculus palustris apii folio, lævis, C. B. & TOURNEF. Ranunculus palustris flore minimo, J. B. Ranunculus sylvestris primus, DODON. Ranunculus palustris rotundiore folio, LOBEL. Ranunculus palustris rotundifolius, GERARD. & RAII. Ranunculus

palustris, sardonius, lævis, PARK. Ranunculus fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis summis digitatis, LINN. *Renoncule des marais*; *Grenouillette d'eau* ou *aquatique*; *Herbe sardonique*.

Ranunculus pratensis, off. Ranunculus pratensis repens hirsutus, C. B. Ranunculus hortensis primus, DODON. Ranunculus dulcis, Batrachium saluterum, TABERN. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis, LINNÆI. *Renoncule des prés*; *Bacinet rampant & velu*.

Ranunculus pratensis, erectus, acris, C. B. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis bipartito-multifidis, summis linearibus, LINN. Ranunculus caule erecto, multifloro, folio pentagono, lobis sessilibus, HALLERII. *Renoncule âcre des prés*.

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cæruleo, I. R. H. *Hépatique des fleuristes*, ou *belle Hépatique*.

Ranunculus vernus rotundifolius minor, TOURNEF. Ranunculus præcox, rotundifolius, granulata radice, MORIS. Ranunculus foliis cordatis, angulatis, petiolatis, LINNÆI. *Petite*

Chélidoine; *petite Scrophulaire*.

RAPA oblonga sive femina, off. Rapa sativa oblonga seu femina, C. B. *Rave femelle* ou *oblongue*; *Rave & Navet*.

Rapa rotunda sive mas, off. Rapa sativa, rotunda, radice candida, C. B. & TOURNEF. *Rave mâle* ou *ronde*; *Rave ordinaire*; *vraie Rave*.

RAPHANUS aquaticus, off. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis, C. B. Raphanus aquaticus, TABERN. Raphanus sylvestris cum filiquis curtis, QUORUMD. *Raisfort d'eau*, ou *de marais*, à *feuilles laciniées*.

Raphanus aquaticus alter, C. B. Raphanus aquaticus rapistri folio, QUORUMD. *Raisfort d'eau* ou *aquatique*; *Cresson à feuilles de raisfort*.

Raphanus major orbicularis, C. B. Raphanus filiquis teretibus torosis bilocularibus, LINN. *Raisfort noir*.

Raphanus minor, off. Raphanus minor oblongus, C. B. & TOURN. Raphanus minor præcox; Raphanus domesticus esculentus, NONNULL. *Raisfort cultivé* ou *des jardins*; *Rave des Parisiens*.

Raphanus rusticanus, officin. C. B. Raphanus sylvestris, sive *Armoracia multis*, J. B. Raphanus rusticanus crassa

- radice, lapathi folio, LOBELII. *Raisort sauvage; grand Raisort; Cram; Moutardelle.*
- Raphanus sylvestris, off. LOBEL.
- RAPISTRUM vulgò Armora-cia, GESNER. *Raisort sauvage; grand Raisort; Cram; Moutardelle.*
- Rapistrum aquaticum, raphani folio, filiquâ breviori, Tourn. *Raisort d'eau ou aquatique; Cresson à feuilles de raisort.*
- RAPUM longum minus, TABERN. *Navet sauvage; Navette.*
- Rapum rubrum sativum, FUSCH. *Bette-rave.*
- Rapum sativum oblongum, J. B. Rapum oblongius, DODON. Rapum minus radice oblongâ, GERARD. Rapum radice tereti; Rapum exiguum, NONNULL. *Rave femelle ou oblongue; Rave en navet.*
- Rapum sativum, rotundum, J. B. Rapum vulgare, DODON. Rapum majus, GERARD. Rapum orbiculatum, TABERN. Rapum rotundum sive sessile, MATTHIOLI. *Rave mâle ou ronde; Rave ordinaire; vraie Rave.*
- Rapum sativum alterum, & Napus veterum, TRAGI. *Navet cultivé; Naveau; Navet domestique ou commun.*
- Rapum sylvestre, flore calathi cæruleo, GESNER.

- Raiponce; Campanule-Raiponce; petite Raiponce de carême.*
- RAPUNCULUM alopecuron, DODON. *Raiponce sauvage ordinaire; grande Raiponce.*
- Rapunculum vulgare, TRAGI. *Raiponce; Campanule-Raiponce; petite Raiponce de carême.*
- RAPUNCULUS esculentus, off. Rapunculus vulgaris campanulatus, J. B. *Raiponce; Campanule-Raiponce; petite Raiponce de carême.*
- Rapunculus spicatus, officin. Tourn. Rapunculus spicatus sive comosus, albus & cæruleus, J. B. Rapunculus spicatus alopecuroïdes, PARK. Rapunculus sylvestris communior, THAL. *Raiponce sauvage ordinaire; grande Raiponce.*
- RAPUNTIIUM majus alopecuri comoso flore, LOBEL. *Raiponce sauvage ordinaire; grande Raiponce.*
- RATINEZJOUN, ARAB. *Sarcocolle.*
- RATINOUN, ARAB. *Sarcocolle.*
- RATIO victus; Diæta. *Diète.*
- RATTLE-SNAKEROOT. Nom que les Anglois donnent à la racine du polygala de Virginie.
- RATTUS, vulgò. *Rat.*
- REALGAR, off. & ARABUM. *Réalgar; Orpiment rouge; Sandaraque.*

- REFRIGERANTIA medicamen-
ta. *Remedes rafraîchissants.*
- REGALIOLOUS avis, NONNUL-
LORUM. *Passereau troglo-
dyte, ou Roitelet.*
- REGINA prati, DODONÆI. *Reine des prés; petite Barbe
de chevre; Vignette.*
- REGINENSES aquæ. *Eaux de
Sainte-Reine, en Bour-
gogne.*
- REGNUM animale. *Regne
animal.*
- Regnum minerale. *Regne mi-
néral.*
- Regnum vegetabile. *Regne
végétal.*
- REGULUS apricus, NON-
NULLOR. *Passereau troglo-
dyte, ou Roitelet.*
- REMORA aratri. *Bugrane
ou Bugrane; Arrête-bœuf.*
- RENETIA, seu Renetia mala
aut poma. *Pommes de rei-
nettes.*
- Ρῆον, DIOSCOR. *Rhapontic.*
- REPELLENTIA medicamenta.
Remedes répercussifs.
- REPERCUTIENTIA medica-
menta. *Remedes répercus-
sifs.*
- RESEDA, off. *Reseda vulga-
ris, C. B. & TOURN. Re-
seda PLINII neotericorum,
BELGIS. Eruca peregrina,
italica vel cantabrica, LO-
BEL. Reseda foliis omnibus
trifidis, inferioribus laci-
niatis, LINNÆI. Herbe
maure; Réseda.*
- Reseda foliis simplicibus lan-
ceolatis integris, LIN-
NÆI. Gaude jaune ou à
jaunir.*
- RESEGAL, ARAB. *Réalgar;
Orpiment rouge; Sanda-
raque.*
- RESINA pinea, OFF. *Téré-
benthine commune.*
- RESINÆ. *Résines.*
- RESOLVENTIA medicamenta.
Remedes résolutifs.
- RESTA bovis, OFFIC. *Bu-
grande ou Bugrane; Ar-
rête-bœuf.*
- Ρῆτινὴ ἐλατίνη, GRÆCORUM.
Térébenthine de sapin.
- Ρῆτινὴ πικρὴ καὶ στροβιλίνη, GRÆ-
COR. *Térébenthine com-
mune.*
- Ρῆτινὴ τερευνθίνη, GRÆCOR.
Térébenthine de Chio.
- REX metallorum, CHYMI-
COR. *Or, métal.*
- Ρῆζ, DIOSCORIDIS. *Rha-
pontic.*
- RHABBARBARUM fortè DIOS-
CORIDIS & ANTIQUORUM,
TOURN. *Rhapontic.*
- Rhabarbarum album, QUO-
RUMD. *Méchoacan; Rhu-
barbe blanche.*
- Rhabarbarum monachorum,
off. *Rhabarbarum mona-
chorum, sive Lapathum
majus, J. E. Rhabarba-
rum monachorum, sive
Hippolapathum, DODONÆI. Rhubarbe des moi-
nes.*
- Rhabarbarum sinense folio
crispo, flagellis rarioribus
& minoribus, AMMAN.
Rhabarbarum folio lon-
giori hirsuto crispo, flo-
rum thyrso longiori & te-
nuiori, AMMAN. *Rhubarbe
vraie.*

RHAMNUS aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis, LINNÆI. *Jujubier, arbre.*

Rhamnus catharticus seu solutivus, DODON. Rhamnus solutivus, seu Spina infectoria vulgaris, PARK. Rhamnus ramis spinâ terminatis, floribus quadridis, LINNÆI. Rhamnus spinosus, foliis ovatis, acuminatis serratis, HALLER. *Nerprun; Noirprun; Bourguépine.*

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso, C. B. Rhamnus, sive Paliurus, folio jujubino, J. B. Rhamnus tertius *Dioscoridis*, PARK. Rhamnus aculeis geminatis, inferiore reflexo, floribus trigynis, LINN. *Epine de Christ; Paliure; Porte-chapeau; Argalou des Provençaux.*

Rhamnus inermis floribus monogynis hermaphroditis, LINN. *Bourgene, ou Aune noir.*

RHAPHANITIS, QUORUMD. *Grande Lunaire; Bulbonach; Médaille; Satinée; Sain blanc; Passe-satin.*

RHAPONTICA quæ hodiè Centaurea major, TRAGI. *Grande Centaurée; Rhapontic vulgaire.*

RHAPONTICOIDES lutea, foliis inferioribus dissectis, cæteris connatis, A. A. P. *Plante dont la racine se nomme Béhen blanc.*

Rhaponticoïdes nemorosa; *Serratula dicta, VAILLANT. Serrette ou Sarrette.*

RHAPONTICUM, officin. & PROSP. ALPIN. Rhaponticum folio lapathi majoris glabro, C. B. *Rhapontic.*

Rhaponticum vulgare seu pharmaceuticum, officin. *Grande Centaurée; Rhapontic vulgaire.*

RHEUM foliis glabris, petiolis subsulcatis, LINN. *Rhapontic.*

Rheum foliis subvillosis petiolis æqualibus, LINNÆI. *Rhubarbe vraie.*

RHINOCEROS, off. Rhinoceros, cornu unico, LINNÆI. *Rhinocéros; & par les Portugais, Moine des Indes.*

RHIZOPHORA foliis acutis, fructibus subulato-clavatis, LINN. *Mangle.*

RHODIA radix, OFF. *Orpinrose.*

RHODIALA, LINN. *Orpinrose.*

RHODODAPHNE, GESNER. *Laurier-rose; Nérion; Oléandre; Rosage ou Rosagine.*

RHODODENDRON flore rubro, J. B. *Laurier-rose; Nérion; Oléandre; Rosage ou Rosagine.*

RHUS, sive Sumach, officin. J. B. Rhus folio ulmi, C. B. Rhus coriaria, DODON. Rhus obsoniorum, LOBEL. Rhus foliis pinnatis serratis, subtus villosis, LINN.

Sumac ordinaire ou commun ; Roux ou Roure des corroyeurs.

Rhus foliis pinnatis integerrimis , petiolo integro , LINN. Arbre dont le suc est le vernis de la Chine.

Rhus myrtifolia belgica, C. B. Rhus sylvestris , sive Myrtus brabantica vel anglica , PARK. Rhus herba , PLIN. Myrte du Brabant ; Myrte bâtard des pays froids ; Piment royal ; Galé.

Rhus obsoniorum similis americana , non ferrata , foliorum rachi medio alata , PLUCK. Rhus foliis pinnatis , petiolo membranaceo articulato , R A I I. Rhus elatior , foliis impari-pinnatis , petiolis membranaceis articulatis , GRONOV. Arbre qui donne la résine appelée Copal.

Rhus virginianum , off. C. B. & Tourn. Rhus sive Sumach virginiana , PARK. Rhus sativum vel majus , NONNULLORUM. Sumach des jardins , ou de Virginie.

RIBES nigrum vulgò dictum , folio olente , J. B. Ribes inerme folio & nigro fructu maximis , olentibus , HALLER. Ribes inerme , floribus oblongis , LINNÆI. Groseiller noir ; Cassis ou Cassier des Poitevins.

Ribes vulgaris acidus , albas baccas ferens , J. B. Ribes vulgaris albo fructu , CLUSII. Groseiller blanc.

Ribes vulgaris acidus , ruber , J. B. Ribes inerme , floribus planiusculis , racemis pendulis , LINN. Groseiller rouge.

RIBESIIUM fructu nigro , DODON. Groseiller noir ; Cassis ou Cassier des Poitevins.

Ribesium fructu rubro , DODON. Groseiller rouge.

RICINOIDES , arbor americana , folio multifido , TOURN. Médecinier d'Espagne.

Ricinoïdes elæagni folio , CATESB. Arbre dont l'écorce se nomme Cascarille & Chacril.

Ricinoïdes gossypii folio , TOURN. Ricinoïde ; grand Ricin d'Amérique ; Médecinier ou Médecinier ; Arbrisseau qui produit la feve purgative.

Ricinoïdes indica , folio lucido , fructu glabro , BURM. Arbrisseau qui produit ce qu'on appelle Graine du ricin , ou Pignons d'Inde , ou Pignons de Barbarie , ou Grains de Tilli ou des Moluques.

RICINUS americanus major semine nigro , C. B. Ricinoïde ; grand Ricin d'Amérique ; Médecinier ou Médecinier ; Arbrisseau qui produit la feve purgative.

Ricinus americanus tenuiter diviso folio , BREYN. Médecinier d'Espagne.

Ricinus arbor fructu glabro , grana tiglia officinis dicto , PARAD. BAT. Arbrisseau

qui produit ce qu'on appelle
Graine du ricin indien, ou
Pignons d'Inde, ou Pignons
de Barbarie, ou Grains de
Tilli ou des Moluques.

RICINUS vulgaris, C. B. Ri-
cinus, *sive* Palma Christi,
vel Kiki, GERARD. Ri-
cinus americana, vel Nam-
bar quacu, PISON. Arbre
qui donne la graine de ricin
ou pignon d'Inde.

RISALGAR, off. Réalgar;
Orpiment rouge; Sanda-
raque.

RISUM, *seu* Rizum, NON-
NULL. Ris ou Riz.

ROBINIA, LINN. Acacia
commun; grand Acacia;
Acacia en arbre d'Améri-
que; faux Acacia.

ROBORANTIA medicamenta.
Remedes fortifiants.

ROBUR. Chêne commun à lar-
ges feuilles.

ROÇA malha Sinensium,
GARZ. Storax liquide, ou
Styrax.

ROGGA, *sive* Secale Plinii,
DODON. Seigle ou Segle.

RONDER, ARABUM. Oliban
ou Encens.

RORELLA caule simplici, fo-
liis rotundis, retusis seu
ellipticis, HALLER. Rosée
du soleil; Rossolis; Herbe
de la rosée; Herbe de la
goutte.

RORIDA, *sive* Ros solis ma-
jor, LOBEL. Rosée du so-
leil; Rossolis; Herbe de la
rosée; Herbe de la goutte.

ROS calabrinus, OFFICIN.
Manne.

Ros marinus, *seu* Anthos,
off. Ros marinus hortensis
angustiore folio, C. B. &
TOURNEF. Ros marinus
coronarius fruticosus *sive*
nobilior, angustiore folio,
J. B. & RAI. Ros marinus
coronarius, GERARD. Ros
marinus sativus minor seu
tenuifolius, NONNULLOR.
Romarin; Encensier.

Ros solis, off. Ros solis folio
rotundo, C. B. & TOURN.
Ros solis major, *seu* Ro-
rida, LOBEL. Rosée du so-
leil; Rossolis; Herbe de
la rosée; Herbe de la goutte.

ROSMARINUM stœchados fa-
cie, PROSP. ALPIN. Po-
lion de Crete.

Rosmarinum coronarium,
DODON. & MATTH. &
LOBEL. & CAMER. Rosma-
rinum vulgare, *sive* Liba-
notis coronaria, PARK.
Romarin; Encensier.

ROSEA, RUPP. Orpin-rose.
Rosea mala aut poma. Pom-
mes d'apis.

ROSA alba, off. Rosa alba
vulgaris major, C. B. &
TOURNEF. Rosa candida
plena & semiplena, J. B.
Rosa alba, TABERN. Rosa
anglica alba, PARK. Rosa
candida simplex & plena,
CAMER. Rosa flore albo
pleno & simplici, HORT.
EYST. Rose blanche ordi-
naire ou commune.

Rosa moscata, officin. Rosa
moscata simplici flore, C. B.
& TOURNEF. Rosa mos-
cata minor flore simplici,

- J. B. Rosa moscata, alba, TABERN. Rosa damascena quam *coroneolam* vocant, L. H. Rosa alba alexandrina, QUORUMD. Rose musquée ou de Damas; Rose muscate ou muscade; Rose muscatelle ou muscadelle.
- Rosa pallida sive incarnata, off. Rosa rubra pallidior, C. B. & TOURN. Rosa rubello flore majore multiplicata sive pleno, incarnata vulgò, J. B. Rosa sativa quarta, DODON. Rosa holoserica, LOBEL. Rosa holosericea simplex & multiplex, PARK. & RAIL. Rose pâle ou incarnate.
- Rosa rubra seu provincialis, off. Rosa rubra multiplex, C. B. Rosa rubra flore valdè pleno & semipieno, J. B. Rosa provincialis major, TABERN. Rose rouge ou de Provins.
- Rosa solis, sive Sponsa solis, THAL. Rosée du soleil; Rossolis; Herbe de la rosée, Herbe de la goutte.
- Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato, C. B. & TOURN. Rosa sylvestris alba cum rubore, folio glabro, J. B. Rosa canina vulgò dicta, DODON. Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis, LINN. Rosa folio & fructu rotundo levibus, calycis foliolis divisiss, HALLER. Rose sauvage;
- Rose de chien; Eglantier; Grattecul.
- ROTANI dsjerenand, IND. Seconde espece d'arbre qui donne le sang-dragon.
- ROVELLA minor, TABERN. Rosée du soleil; Rossolis; Herbe de la rosée; Herbe de la goutte.
- RUBEFACIENTIA medicamentata. Remedes rubéfiants.
- RUBEOLA montana odora, sive Asperula, C. B. Muguet des bois; petit Muguet; Hépatique étoilée.
- Rubeola vulgaris quadrifolia, levis, floribus purpurascens, TOURN. Petite Garance; Rubéole, ou Herbe à l'esquinancie.
- RUBIA, off. Rubia tinctorum sativa, C. B. & TOURN. Rubia major sativa sive hortensis, PARK. Rubia foliis senis, LINN. Garance ordinaire ou cultivée; Garance des teinturiers.
- Rubia cynanchica, off. C. B. Petite Garance; Rubéole, ou Herbe à l'esquinancie.
- RUBIÆ parvum genus, NON-NULLOR. Petite Garance; Rubéole; Herbe à l'esquinancie.
- RUBIIS accedens; Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris, J. B. Muguet des bois; petit Muguet; Hépatique étoilée.
- RUBINUS. Rubis, pierre précieuse.
- RUBUS, off. Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro,

- C. B. & TOURN. *Rubus* major fructu nigro, J. B. *Rubus*, *sive* *Morus*, ANGUILL. *Rubus* caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis, LINN. *Ronce ordinaire* ou *commune*; *Mûre de renard* ou *de buisson*; *Mûre sauvage*.
- Rubus idæus*, officin. *Rubus idæus spinosus*, C. B. & TOURN. *Rubus idæus spinosus* fructu rubro & albo, J. B. *Rubus idæus vulgaris* rubro & albo fructu, CLUS. *Rubus* foliis quinato-spinatis ternatisque, caule hispido, LINN. *Rubus cervinus*, QUORUMD. *Framboisier*; *Ronce du mont Ida*.
- RUMEX floribus divisis, foliis oblongo-sagittatis, LINN. *Oseille ordinaire*; *Oseille longue*; *Vinette*.
- Rumex floribus hermaphroditis, foliis hastatis, LINN. *Oseille ronde*.
- Rumex floribus hermaphroditis, valvulis crenatis, granulo incumbente, LINN. *Parelle*, ou *Patience sauvage ordinaire*.
- Rumex hortensis vel secundus, TRAGI. *Patience* ou *Parelle*.
- Rumex unctuosus, TRAGI. *Bon-Henri*.
- RUPICAPRA, SCHROD. & BELON. & ALDROV. *Chevre des Alpes*, nommée ordinairement *Chamois* ou *Ysard*.
- RUSCUS, C. B. *Ruscus myrsifolius aculeatus*, TOURN. *Ruscus* foliis supinè floribus nudis mas & femina, LINNÆI. *Houx frêlon*; *Petit-Houx*; *Housson*; *Fragon*; *Myrte sauvage* ou *épineux*; *Brusc*; *Buis piquant*.
- Ruscus latifolius*, fructu folio innascente, TOURN. *Ruscus* foliis supinè floriferis sub foliole, LINN. *Laurier alexandrin* ou *d'Alexandrie*.
- RUTA, off. *Ruta hortensis latifolia*, C. B. & TOURNEF. *Ruta sativa* vel *hortensis*, J. B. *Ruta graveolens* vel *hortensis*, DODONÆI. *Ruta domestica*, TRAGI. *Ruta* foliis decompositis, LINNÆI. *Rue des jardins*; *Rue domestique* ou *cultivée*; *Rue ordinaire* ou *commune*.
- Ruta capraria*, Fenum græcum sylvestre, TABERN. *Galega*.
- Ruta muraria*, off. C. B. *Capillaire blanc* à feuille de rue, ou *Sauve-vie*.
- Ruta pratensis*, GESNER. *Ruta pratensis Herbariorum*, LOBEL. *Ruta sylvestris*, CÆSALP. *Thaliætron*, ou *Thaliætron commun*; *Rue des prés*.
- Ruta solis perforata*, NONNULLORUM. *Millepertuis*, ou *Herbe à mille pertuis*.

Ruta sylvestris, *off.* Ruta
sylvestris major, C. B.
Ruta sylvestris graveolens,
DODON. Ruta montana,
GER. Ruta sylvestris, ma-
joribus foliis, GESN. Ruta
sylvatica sive agrestis,

QUORUMD. *Grande Rue*
sauvage ou de montagne.
Ρύτις ἡ Φάρμακον. *Remedes dé-*
tersifs.

RYSAGON, M. R. S. *Cassum-*
muniar ou Casmunar des
Anglois.



S A L

- S**ABADILLI semen. *Graine du sabadilli.* Σαβάπιλον, GRÆCOR. *Sagapenum.*
- SABINA** femina, off. *Sabina folio cupressi, C. B. Sabina femina, T A B E R N. Sabina baccifera, MATTH. & CAMER. & RAUWOLF. Sabina major, GESNER. Sabina fructifera, CAST. Sabina genuina baccifera atro-cærulea, LOBEL. Sabine, ou Sabinier à feuilles de cyprès.* SAGAGENUM, officin. *Sagapenum.*
- SABINA** mas, officin. & T A B E R N. *Sabina folio tamarisci Dioscoridis, C. B. Sabina baccifera & sterilis, J. B. Sabina vulgaris, PARK. Sabina myricæ folio, C O R D. Sabine, ou Sabinier à feuilles de tamarisc; Savinier.* SAGINA, vel Panicum loculare, QUORUMD. *Grand Millet noir; Blé barbu; Sorgo.*
- SACAL.** *Mot égyptien par lequel on désignoit le succin ou karabé.* SAL armeniacum. *Sel ammoniac.*
- SACCHARIFERA** arundo. *Roseau d'où l'on tire le sucre.* SAL cædium. *Sel gemme, ou Sel naturel.*
- SACCHARINUS** calamus, T A B E R N. *Roseau d'où l'on tire le sucre.* SAL, CHYMICOR. *Or, métal.*
- SACCHARUM.** *Sucre.* SAL commune. *Sel gemme, ou Sel naturel.*
- SACCULI.** *Sachets.* SAL culinare. *Sel gemme, ou Sel naturel.*
- SACHABENI**, ARAB. *Sagapenum.* SAL cyrenaicum. *Sel ammoniac.*
- SACHMUNIA** ARABUM. *Scammonée.* SAL fossile. *Sel gemme, ou Sel naturel.*
- SADEGI**, AVICENN. *Feuille indienne, ou Malabathrum.* SAL gemmeum. *Sel gemme, ou Sel naturel.*
- SADENEGI** & Scedenegi, ARABUM. *Pierre hématite.* SAL hermaphroditum, CHYMICOR. *Nître.*
- SALAMANDRA**, officin. *Salamandra sylvestris, maculis luteis distincta, CHARLET. Salamandra terrestris vera, nigra, maculis luteis*

variegata, NONNULL. *Salamandre terrestre ou commune.*

Salamandra aquatica, RONDELET. *Salamandra aquatica*, *aliis* Lacertus aquaticus, JONSTON. *Salamandre aquatique.*

SALICARIA vulgaris, purpurea, foliis oblongis, TOURNEF. *Salicaire commune; Lysimachie rouge.*

SALICASTRUM, PLINII. *Morrelle; Douce-amere.*

SALICORNIA articulis apice crassioribus obtusis, LINN. *Grande Soude; Salicote; Marie vulgaire.*

SALIUNCA, PLIN. *Nard celtique.*

SALIVA. *Salive.*

Saliva fiderum PARACELSI-TARUM. *Mousse membraneuse; Nostoch des Allemands.*

SALIVANTIA medicamentum. *Remedes sialogogues.*

SALIX alba seu major, off. *Salix vulgaris alba arborescens*, C. B. & TOURN. *Salix maxima fragilis alba hirsuta*, J. B. *Salix prima vel major*, DODON. *Salix arborea angustifolia alba vulgaris*, PARK. *Salix alba perticalis vulgaris*, MATTH. *Salix alba primarborescens vulgaris & perticalis*, THEOPHR. & PLINII. *Salix Dioscoridis*, LOBEL. *Salix foliis linearilanceolatis, acuminatis, serratis, utrimque pubescentibus, infimis ferraturis*

glandulosis, LINN. *Saule vulgaire, ou grand Saule.*

Salix amerina, MATTHIOLI. *Agnus castus.*

Salix caprea seu minor, off.

Salix folio ex rotunditate acuminato, C. B. & TOURNEF. *Salix caprea latifolia*, TABERN. *Salix latifolia infernè hirsuta*, J. B. & RAI. *Salix latifolia rotunda & latifolia oblongior*, PARK. *Salix caprea rotundifolia & caprea latifolia*, GERARD. *Salix platyphyllos*, Leucophlæos, L. H. *Salix foliis serratis, glabris, subovatis, sessilibus appendiculatis*, LINN. *Saule marseau, ou petit Saule.*

SALMO, off. & omnium auctororum. *Salmo rostro ultra inferiorem maxillam sæpè prominente*, ARTEDI. *Saumon.*

Salmo maxillâ inferiore paulò longiore, maculis rubris, ARTEDI, & GESN. & LINN. *Truite ordinaire ou des rivières.*

SALPA, NONNULL. *Morue, poisson.*

SALPETRA, Salpestra. *Nitre.*

SALSAPARILLA & Sarsaparilla. Salsapareille.

SALSIFICA Italorum, sive GERONTOPOGON, L. B. *Sersifis; Cercifis; Salsifis; Sarsifis blanc commun des jardins ou d'Italie.*

Salsifica Italorum flore aureo, NONNULLORUM,

- Sercifis sauvage* ou des prés ; *Barbe de bouc*.
SALSOLA foliis pungentibus ,
 LINN. *Soude épineuse* ;
Salicote épineuse ; *Marie épineuse*.
SALSOLÆ genus in hortis ,
 Isgarum vulgò , CÆSALP.
Grande Soude ; *Salicote* ;
Marie vulgaire.
SALUSANDRIA , DODON.
Nielle romaine ; *Nielle des jardins* ;
Nielle cultivée ou domestique ;
Cumin noir , ou faux Cumin.
SALVIA agrestis , BRUNSE.
Salvia foliis ovatis , incisocrenatis ,
 verticillis subnudis , LINN. *Salvia foliis*
ovato-lanceolatis , ferratis , verticillis
 raris & diffitis , HALLER. *Orvale* ;
Toute-bonne des prés ou *sauvage* ;
Sclarée.
Salvia agrestis , vel *Scordium alterum* ,
 C. B. *Chamaras* , ou faux *Scordium* ;
Sauge des bois ou *sauvage*.
Salvia indica , GER. *Salvia minor aurita* ,
 odoratissima , hispanica , PARK. *Salvia*
hispanica flore albo , H. E. *Sauge de Catalogne*
 ou d'*Espagne à fleurs blanches*.
Salvia major , off. *Salvia major* ,
 an *Sphacelus Theophrasti* ? C. B. & TOURN.
Salvia latifolia , J. B. *Salvia foliis*
lanceolato-ovatis , crenulatis , floribus
 spicatis , calycibus acutis , LINNÆI.
Grande Sauge ; *Sauge franche* ou
ordinaire.

- Salvia minor* , off. & DOD.
Salvia minor aurita & non aurita ,
 C. B. & TOURN. *Salvia minor auriculata* ,
 J. B. *Salvia minor sive pinnata* ,
 PARK. *Salvia nobilis* , BRUNSE. & GESN.
Salvia angustifolia & minor ,
 TRAGI. *Petite Sauge* ; *Sauge de Provence*.
Salvia sylvestris , CÆSALP. *Epi fleuri* ;
Sauge sauvage ou de montagne.
Salvia vitæ , OFF. *Capillaire blanc*
 à feuille de rue , ou *Sauve-vie*.
SAMBUCUS , off. *Sambucus fructu*
 in umbellâ nigro , C. B. & TOURN. *Sambucus*
vulgaris , J. B. *Sambucus* , DODON. *Sambucus*
domestica , CAST. *Sambucus umbellifera* ,
 ANGUILL. *Sambucus campestris* ,
 CAMER. *Sambucus flore arboreo*
floribus umbellatis , VAN ROYEN. *Sambucus*
caule perenni ramoso , LINNÆI. *Sambucus*
arborea umbellatis floribus , HALLER.
Sureau commun , ou *grand Sureau*.
Sambucus aquatica flore simplici ,
 C. B. *Sambucus palustris* , DOD. *Sambucus*
aquatilis , sive *palustris* , GER. & RAII.
Obier ou *Opier* ; *Sureau d'eau* ou
aquatique.
Sambucus humilis , sive *Ebulus* ,
 C. B. & TOURN. *Sambucus herbacea* ,
 sive *Ebulus* , J. B. *Sambucus caule*
herbaceo simplicissimo ,

- LINN. Sambucus herba-
cea, floribus umbellatis,
HALLER. *Ieble*.
- SAMOLUS Valerandi D. Sa-
molus Plinii, QUORUMD.
C. B. *Mouron d'eau*.
- SAMPSUCUS, sive Amaracus,
Latinis Majorana, CORDI.
Marjolaine vulgaire.
- SANAMUNDA, QUORUMDAM.
*Benoîte; Herbe de S. Be-
noît; Galiot; Gariot; Ré-
cife*.
- SANA sancta Indorum, GER.
*Tabac de Virginie; Pétun
des Amazones; Nicotiane
à feuilles étroites*.
- Sana sancta Indorum, LO-
BEL. *Tabac mâle ou vrai;
Nicotiane à larges feuilles*.
- SANCTÆ crucis herba femina,
CAST. *Tabac mâle ou
vrai; Nicotiane à larges
feuilles*.
- Sanctæ crucis lignum. *Agal-
lochum; Bois d'aloës*.
- SANDARACHA, off. Sanda-
raque des Arabes; *Gomme
ou Résine de genévrier;
Vernis*.
- SANDARAX, ARABUM. San-
daraque des Arabes; *Gom-
me ou Résine des Arabes;
Vernis*.
- Σανδαράχη, GRÆCOR. *Réal-
gar; Orpiment rouge; San-
daraque*.
- SANGUINARIA, off. *Bec de
grue sanguin, ou Bec de
grue à grandes fleurs*.
- Sanguinaria, QUORUMDAM.
Tormentille.
- Sanguinaria, seu Centumno-
dia, LOBEL. *Renouée;*
- Trainasse; Centinode; Cor-
rigiole*.
- SANGUINIS arbor, seu Ezqua-
huitl, HERNAND. *Troi-
sième espece d'arbre qui
donne le sang-dragon*.
- Sanguinis missio. *Saignée*.
- SANGUIS draconis, OFFIC.
Sang-dragon.
- Sanguis draconis herba, sive
Lapathum sanguineum,
J. B. *Patience rouge, ou
Sang-dragon*.
- SANGUISORBA spicis ovatis,
LINN. *Pimprenelle; Pim-
pernelle; Pimpinelle; Pim-
penelle; Bipinelle*.
- SANGUISUGA, off. *Sang-sue*.
- SANICULA, off. Sanicula mas
Fuschii, sive Diapensia,
J. B. Sanicula foliis radi-
calibus simplicibus, flos-
culis omnibus sessilibus,
LINN. *Sanicle commune
ou mâle*.
- Sanicula femina, off. Sani-
cula femina quibusdam,
aliis Elleborus niger, J. B.
Sanicula altera, Osteri-
tium montanum, QUO-
RUMD. *Sanicle femelle ou
de montagne*.
- Sanicula montana, flore cal-
cari donato, C. B. *Gras-
sette; Herbe grasse ou hui-
leuse*.
- SANKIRA, vulgò Quaquara;
Smilax minus spinosa,
fructu rubicundo, radice
virtuosâ, China dicta,
KÆMPF. *Plante dont la ra-
cine se nomme squine*.
- SANTALUM album, off. &
C. B. *Santal blanc*.

Santalum flavum vel citrinum, *off.* Santalum pallidum, C. B. Santalum flavum, TABERN. Santalum citrinum, J. B. *Santal citrin.*

Santalum rubrum, *officin.* & C. B. *Santal rouge.*

SANTERNA, PLIN. *On croit que c'est le borax.*

SANTOLINA. *Santoline; Barbotine; Sementine ou Sementencine; Poudre à vers.* Santolina, *off.* *Aurône femelle; Santoline; petit Cyprès; Garderobe.*

SANTONICUM, LINN. *Plante dont la graine tue les vers; elle est connue sous le nom de santoline ou poudre à vers.*

SAPHIRUS, PLIN. *Saphir, pierre précieuse.*

SAPŌ. *Savon.*

SAPONALIS, QUORUMD. *Savonniere ou Savonnaire; Saponniere ou Saponnaire.*

SAPONARIA, *off.* Saponaria major lævis, C. B. Saponaria vulgaris, J. B. Saponaria vulgi foliis plantaginis aut gentianæ flore ocymoidis, LOBEL. Saponaria calycibus monophyllis cylindræis, foliis ovato-lanceolatis, LINN. Saponaria foliis trinerviis, floribus umbellatis, HALLER. *Savonniere ou Savonnaire; Saponnaire.*

SAPOTA fructu ovato-majori, PLUMER. *Sapotille, ou Sapotillier, grand arbre.*

SARCOCOLLA, *off.* *Sarcocolle.*

Σαρκοκόλλη, GRÆCOR. *Sarcocolle.*

SARCOTICA medicamenta. *Remedes sarcotiques ou incarnatifs.*

SARDACHATES. *Agate.*

SARGAZO, PISON. *Herbe flottante, ou Lentille de mer.*

SARSAPARILLA & Salsaparilla, *off.* *Salsepareille.*

SASSAFRAS, *off.* Sassafras, *sive* Lignum pavanum, J. B. *Sassafras.*

Sassafras arbor ex Floridâ ficulneo folio, C. B. Sassafras major, *sive* Anhuiba, PISON. *Arbre dont le bois se nomme sassafras.*

SATUREIA, *off.* Satureia hortensis, *sive* Cunila fativa, PLIN. C. B. Satureia fativa, J. B. & TOURN. Satureia æstiva hortensis, GERARD. Satureia, *sive* Thymbra fativa, CORD. Satureia vulgaris hortensis, MATTH. Satureia pedunculis bifloris, LINN. *Sarriette; Sadrée, ou Savourée commune & annuelle des jardins.*

Satureia, *seu* Thymbra vera, *off.* Satureia spicata, C. B. Satureia foliis tenuibus, *sive* tenuifolia sancti Juliani, QUORUMD. Satureia spicata sancti Juliani, PARK. *Sarriette vivace, ou Herbe de S. Julien.*

SATURNUS, CHYMICORUM. *Plomb.*

Saturnus

Saturnus philosophorum. Nom
que les chymistes ont donné
à l'antimoine.

SATYRIUM, off. *Orchis* ; Sa-
tyrion ; Testicule de chien ,
mâle , à feuilles étroites.

SAVINERA , vel Savinera se-
cunda seu cyparissias, QUO-
RUMD. *Sabine* ou *Sabinier*
à feuilles de cyprès.

SAVINIA , vel Savinera pri-
ma , QUORUMD. *Sabine*
ou *Sabinier* à feuilles de ta-
marisc ; *Savinier*.

SAXIFRAGA , sive Hepatica
aurea , off. *Saxifraga* ro-
tundifolia aurea , C. B. Sa-
xifraga aurea *Dodonæi* ,
J. B. *Saxifraga aurea* li-
chenis facie & natalitiis ,
LOBEL. *Saxifraga romana* ,
vel alpina , vel sabauda ,
QUORUMD. *Saxifrage* do-
rée , ou *Hépatique* do-
rée.

Saxifraga , seu *Empetrum* ,
FUSCH. *Capillaire blanc* à
feuille de rue , ou *Sauve-*
vie.

Saxifraga alba , off. *Saxi-*
fraga rotundifolia alba ,
C. B. *Saxifraga alba* radice
granulosâ , J. B. *Saxifraga*
alba chelidonides , LOBEL.
Saxifraga alba tuberosâ ra-
dice , CLUS. *Saxifraga* fo-
liis reniformibus lobatis ,
caule ramoso , radice gra-
nulosâ , LINN. *Saxifrage*
blanche ; *Casse-pierre* , ou
Rompt-pierre.

Saxifraga altera CÆSALPINI ,
seu *Asperula repens* GES-
NERI , PARK. *Petite*
Tome VIII.

Garance ; *Rubéole* ; *Herbe*
à l'esquinancie.

Saxifraga magna , off. *Saxi-*
fraga hircina major , J. B.
Saxifraga magna , DOD.
Saxifraga hircina major
pimpinellæ similis ; *Saxi-*
fraga hircina vulgò , NON-
NULL. *Grande Pimprenelle*
blanche ; *grande Pimpre-*
nelle saxifrage ; *grande Bou-*
quetine ; *Boucage* ; *grand*
Perfil de bouc.

Saxifraga parva , off. & DO-
DON. *Saxifraga hircina mi-*
nor foliis sanguisorbæ , J. B.
Saxifraga minor , seu *Bi-*
pinnella , GER. *Saxifraga*
pimpinella germanica mi-
nor , CLUS. *Petite Saxi-*
frage ; *petite Pimprenelle*
saxifrage ; *petite Bouque-*
tine ou *Boucage* ; *petit Per-*
fil de bouc.

Saxifraga rubra & quarta ,
BRUNSF. *Alkekenge* ; *Co-*
queret ; *Coquerelle*.

Saxifraga verna annua hu-
milior , TOURN. *Saxifraga*
alba petræa , PON. *Saxi-*
fraga foliis cuneiformibus
trifidis , alternis , caule erec-
to ramoso , LINN. *Petite*
Saxifrage rouge.

Saxifraga medicamenta. Re-
medes lithontriptiques.

SCABIOSA , off. *Scabiosa pra-*
tensis hirsuta quæ off. C. B.
& TOURN. *Scabiosa major*
communior , hirsuta , folio
laciniato , J. B. & RAII.
Scabiosa vulgaris major ,
DODON. *Scabiosa vulgaris*
pratensis , PARK. *Scabiosa*

arvensis seu segetalis, TABERN. Scabiosa vulgarior inter segetes nascens, CLUS. Scabiosa scisso folio, CÆSALP. Scabiosa major factorum vulgarior, LOBEL. Scabiosa corollulis quadrifidis, corollis radiatis, caule hispido, LINN. Scabiosa caule & foliis subhirsutis, imis, ovatis, superioribus semipinnatis, HALLER. Scabiosa scabra sive hirsutior, NONNULL. *Scabieuse ordinaire des prés ou des champs.*

Scabiosa folio integro, CÆSALP. Scabiosa folio integro hirsuto, Tourn Scabiosa corollulis quadrifidis, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis, LINN. *Scabieuse des bois; Succise; Mors ou Remors du diable.*

SCAMMONEA & Scammonia, off. Scammonea & Sackmunia, ARABUM. *Scammonée.*

Enapparia, DIOSCORIDIS, *Scammonée.*

SCAMMONIA americana, sive Convolvulus catharticus americanus. *Liane à médecine de MINGUET.*

Scammonia monspeliaca foliis rotundioribus, C. B. Scammonia monspeliaca flore parvo, J. B. Scammonia maritima monspeliaca, RICHIER. Scammonia monspeliensis, floribus exiguis, NONNULLORUM. *Scammonée de*

Montpellier; Apocyn à larges feuilles.

Scammonia parva, ANGUILL. *Petit Liseron ou Liset; Campanette ou Clochette; Vrillée commune.*

Scammonia syriaca & Convolvulus syriacus, MORIS. *La plante dont le suc se nomme scammonée.*

SCAMMONEUM, sive Scammonium monspeliacum, OFF. *Scammonée de Montpellier; Apocyn à larges feuilles.*

SCAMMONIUM, off. *Scammonée.*

Scammonium orientale: *Gomme-gutte.*

SCANDIX semine rostrato vulgaris, C. B. Scandix vulgaris, seu Pecten Veneris, PARK. Scandix sylvestris, CLUS. Scandix feminibus rostro longissimo extensis, LINN. Scandix arvensis. *Aiguille ou Peigne de Vénus; Aiguille à berger.*

Scandix feminibus nitidis ovato-subulatis, LINN. *Cerfeuil.*

SCANDULACEA, NONNULLOR. *Thlaspi ou Tharaspic des champs à larges filiques.*

SCARABÆOLUS hemisphæricus cochineelifer, GAZ. PETIV. *Cochenille.*

SCARABÆUS cornutus, off. Scarabæus maximus platyceros, Taurus volans, RAI. Scarabæus cornibus duobus mobilibus æqualibus, apice bifurcis, introrsum ramo

denticulisque instructis ,
 LINN. *Cerf-volant ; grand*
Escarbot ; Scarabée cornu.
 Scarabæus nigricans alarum
 aliàs rubicundis limbis ,
 MER. *Cochenille.*
 Scarabæus onctuosus, SCHRO-
 DER. Scarabæus mollis ex
 nigro violâ nitens, LISTER.
Scarabée onctueux ; Pro-
scarabée ; Escarbot onc-
tueux.
 Scarabæus pilularis, officin.
 SCHROD. Scarabæus pilu-
 larius melanocyaneus, ME-
 RIAN. Scarabæus magnus
 ex purpurâ niger , tibiis
 omnium pedum serratis ,
 LIST. Scarabæus stercora-
 rius niger major , FRISCH.
 Scarabæus major niger vul-
 gatissimus , antennis glo-
 bosis, elytris lævibus, RAII.
 Scarabæus ater, dorso gla-
 bro , elytris fulcatis , ca-
 pitis clypeo rhomboïde ,
 centro prominulo , LINN.
Fouille-merde ; Escarbot
pilulaire ; Scarabée pilu-
laire.
 Scarabæus stridulus , off. Sca-
 rabæus arboreus , JONST.
 Scarabæus maximus rufus ,
 uropygio deorsum inflexo ,
 LIST. Scarabæus maialis
 foliaceus , JOH. DE MU-
 RALT. Scarabæus testaceus
 thorace villosus , abdominis
 incisuris lateralibus albis ,
 caudâ inflexâ , LINN. *Han-*
neton.
 SCARIOLA & Serriola, CORD.
Laitue sauvage.

Scariola latifolia & Seriola ,
 OFF. *Chicorée blanche , ou*
Endive commune.
 Scariola vulgaris, seu angusti-
 folia , OFFIC. *Chicorée à*
feuilles étroites , ou petite
Endive.
 SCEDENEGI & Sadenegi, ARA-
 BUM. *Pierre hématite.*
 SCHACARILLA. *Cascarille ou*
Chacril.
 SCHADIDICALLI, H. M.
Plante qui produit la gom-
me-résine appelée euphorbe.
 SCHISMUS. *Fouine.*
 Σχοίνανθος, ACTUAR. *Jonc odo-*
rant.
 SCHÆNANTHOS, sive Juncus
 odoratus , J. B. *Plante*
qui donne le jonc odorant.
 SCHÆNANTHUS, off. *Jonc*
odorant.
 Σχοίνος, DIOSCOR. & GALEN.
 Σχοίνος ἡδυόσμος, & εὐόσμος,
 & εὐώδης, HIPPOCR. Σχοίνος
 ἀρωματικός & μυρσίνος, GRÆ-
 COR. RECENT. *Jonc odo-*
rant.
 SCHWALBACENSES aquæ.
Eaux de Schwalbach, assez
près de Francfort sur le
Mein.
 SCILLA, seu Squilla, officin.
 Scilla vulgaris radice ru-
 brâ , C. B. Scilla ruffa ,
 magna, vulgaris, J. B. &
 RAII. Scilla rubra, sive
 Pancratium verum, PARK.
 Scilla radice tunicatâ, LIN-
 NÆI. Scilla rubentibus ra-
 dicis tunicis, LOBEL. *Scille*
rouge ; grande Scille ; Qi-
gnon marin.

Scilla alba, off. *Scilla radice albâ*, C. B. & RAIL. *Scilla magna alba*, J. B. *Scilla hispanica*, CLUSII. *Scille blanche*.

Scilla parva, OFFIC. *Scille blanche*, ou *petite Scille*.

SCINCUS, off. *Scincus lacerti* specie, I. M. *Scincus marinus*, MONT. *Scincus*, quem & *Crocodylum terrestrium* vocant, GESNER. *Scinc marin*.

Scincus aquaticus quibusdam, *Cordulus Bellonio*, NONNULL. *Salamandre aquatique*.

SCIRPUS americanus, caule geniculato, cavo, D. LIGNON. *Souchet d'Amérique*.

Σκίρπος, GRÆCOR. *Ecureuil*.

SCIURUS, LATINOR. *Sciurus palmis solis saliens*, LINN. *Sciurus rufus*, quandoque griseo admixto, BRISSON. *Ecureuil*.

SCLAREA, off. & TOURN. & TABERN. *Orvale*; *Toutebonne*.

Sclarea sylvestris flore purpureo cæruleove magno, sive *Gallitrichum sylvestre* vulgò, J. B. *Sclarea pratensis foliis ferratis*, flore cæruleo, TOURN. *Orvale*; *Toute bonne des prés* ou *sauvage*; *Sclarée*.

SCOLOPENDRIA, LOBEL. *Cétérach*.

Scolopendria vulgaris, OFF. *Scolopendre vulgaire*, ou *Langue de cerf*.

SCOLOPENDRIUM vulgare, officin. *Scolopendrium*, BRUNSE. *Scolopendre vulgaire*, ou *Langue de cerf*.

SCOLYMUS aculeatus, TABERN. *Artichaut épineux*, ou *Cardons*.

Scolymus sativus non spinosus, J. B. *Artichaut*.

SCOPARIA vulgaris flore luteo, (*Cytiso-genista*) TOURN. *Genêt commun*.

SCORDIUM, off. *Scordium verum*, GESNER. *Chamaras*, ou *vrai Scordium*; *Germandrée d'eau* ou *aquatique*.

Scordium alterum, sive *Salvia agrestis*, C. B. *Chamaras*, ou *faux Scordium*; *Sauge des bois* ou *sauvage*.

SCORODONIA, officin. *Chamaras*, ou *faux Scordium*; *Sauge des bois* ou *sauvage*.

SCORODONIÆ (aut *Verbenæ*) affinis anomala, flore albo, calyce aspero, allii odore, SLOANE. *Chamaras*, ou *faux Scordium*; *Sauge des bois* ou *sauvage*.

SCORODOPRASSUM. *Porreau* ou *Poireau*.

Scorodoprassum, off. *Scorodoprassum secundum*, CLUSII. *Rccambole*.

SCORODOTHLASPI, off. *Scorodothlaspi*, ALDROV. J. B. *Thlaspi* ou *Tharaspic* à odeur d'ail.

SCORPIO, off. *Scorpio*, vel *Scorpiusterrestris*, MATTH. *Scorpium pectinum denticulis triginta*, LINNÆI.

Scorpion terrestre ou commun.

SCORPIUS, *sive* Drypis, THEOPHRASTI. Soude épineuse; Salicote épineuse; Marie épineuse.

SCORZONERA, *off.* Scorzonera latifolia sinuata, C. B. & TOURN. Scorzonera major hispanica, CLUSII. Scorzonera hispanica, *sive* viperaria, GERARD. Scorzonera floribus simplicibus & plenis, CAMER. Scorzonera hispanica seu bohemica, MATTH. Scorzonera hispanica & germanica, TABERN. Scorzonera caule subnudo unifloro, foliis nervosis planis, LINN. *Scorsonere*; *Cercifis* ou *Sersifis* noir ou d'Espagne.

SCROPHULARIA, *off.* Scrophularia nodosa, foetida, C. B. Scrophularia major vulgaris, PARK. Scrophularia foliis cordatis oppositis, racemo terminatrici, LINN. Scrophularia foliis cordatis, conjugatis, caule & ramis spicâ nudâ paniculatâ terminatis, HALLER. *Grande Scrophulaire* commune.

Scrophularia QUORUMDAM. *Enanthe*; *Filipendule* aquatique; *Persil* de marais.

Scrophularia aquatica major, C. B. & TOURN. Scrophularia maxima radice fibrosâ, J. B. Scrophularia foliis cordatis, pediculorum

alis in caulem decurrentibus, GUETTARD. *Scrophulaire* aquatique; *Herbe* du siege; *Bétoine* d'eau ou aquatique.

Scrophularia media vel tertia, BRUNSF. *Orpin*; *Reprise*; *Grassette*; *Joubarbe* des vignes.

Scrophularia minor, OFFIC. *Petite Chélidoine*, ou *petite Scrophulaire*.

SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis, crenatis, LINNÆI. *Centaurée* bleue; *Tertianaire*, ou *Herbe* aux fièvres.

SCYRUS lapis, ALDROV. *Pierre-ponce*.

SEBESTEN, *off.* & ARABUM. *Sébestes*.

Sebesten, *sive* Moxa, J. B. Sebesten domestica, PROSP. ALP. *Arbre* qui produit les sébestes.

SEBESTENA domestica, C. B. *Arbre* qui produit les sébestes.

SECALE, *off.* Secale hibernum vel majus, C. B. & TOURN. Secale vulgaris, PARK. Secale glumarum ciliis scabris, LINN. *Seigle* ou *Segle*.

SECHBENIGI, ARABUM. *Sagapenum*.

SEDUM foliis ferratis, tetrapetalum, sexu distinctum, HALLER. *Orpin-rose*.

Sedum majus vulgare, C. B. Sedum rosulis acaulis, liberis conniventibus, foliis ciliatis, HALLER. *Grande Joubarbe*.

Sedum minus teretifolium album, C. B. *Sedum minus*, folio longiusculo tereti, flore candido, J. B. *Sedum* foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, paniculâ racemosâ, LINN. *Petite Joubarbe*; *Trique-madame*, ou *Tripe-madame*.

Sedum parvum acre, flore luteo, J. B. *Sedum* foliis subovatis, adnato sessilibus, gibbis, erectiusculis alternis racemo triplici, LINN. *Joubarbe âcre*; *Vermiculaire âcre* ou *brûlante*; *Pain d'oiseau*; *Poivre des murailles*.

Sedum tridactylites tectorum, C. B. *Sedum tridactylites* tectorum, flore albo, J. B. *Sedum* foliis laciniatis, NONNULLOR. *Petite Saxifrage* rouge.

SELINON, seu *Apium* THEOPHR. & DIOSCOR. *Perfil* commun ou ordinaire; *Perfil* des jardins ou domestique.

SELINUM, sive *Apium* hircinum, NONNULLORUM. *Grande Saxifrage*; *Pimprenelle blanche*; *grande Pimprenelle saxifrage*; *grande Bouquetine*; *Boucage*; *grand Perfil* de bouc.

Selinum foliis ovato-acutis, acutè serratis & incisiss, LINN. *Petit Perfil* sauvage ou de montagne.

Selinum palustre levissimè lactescens, LINN. *Selinum*

leviter lactescens radice unicâ, HALLER. *Perfil* des marais; *Encens d'eau*.

Selinum pinnis ad angulos obtusos pinnatis, pinnulis incisiss, non ferratis, LINN. *Grand Perfil* de montagne, ou *sauvage*.

SELTÉRANÆ aquæ. *Eaux de Seltz*, dans la basse Alsace.

SEMBELEN, ARABUM. *Nard indien*.

SEMEN contra vermes, off. *Semen sanctum*. *Santoline*; *Barbotine*; *Sementine* ou *Semencine*; *Poudre à vers*.

Semen sabadilli. *Graine de Sabadilli*.

SEMENTINA. *Santoline*; *Barbotine*; *Sementine* ou *Semencine*; *Poudre à vers*.

SEMENTINA. *Santoline*; *Barbotine*; *Sementine* ou *Semencine*; *Poudre à vers*.

SEMPERVIVUM, seu *Barba Jovis*, off. *Sempervivum* foliis radicalibus carnosiss, caulinis umbricatis membranaceiss, corymbo racemoso reflexo, LINNÆI. *Grande Joubarbe*.

Sempervivum marinum, GERARD. & PARK. *Plante* qui fournit le suc nommé aloès hépatique.

Sempervivum minus album, BRUNSF. *Petite Joubarbe*; *Trique-madame*, ou *Tripe-madame*.

Sempervivum minus vermiculatum acre, C. B. *Sempervivum* minimum, sive

- Illecebra, LOBEL. Joubarbe âcre, Vermiculaire âcre où brûlante; Pain d'oiseau; Poivre des murailles.
- Σέννα, ACTUARI. Senné ou Séné d'Alexandrie.
- SENA, off. Senné ou Séné d'Alexandrie.
- Sena, J. B. Sena orientalis, TABERN. Arbrisseau dont les follicules sont connues sous le nom de senné.
- Sena florentina, J. B. Séné d'Italie.
- SENE ARABUM. Senné ou Séné d'Alexandrie.
- SENECIO, off. Senecio major vulgaris, C. B. Senecio vulgaris, sive Erigeron, J. B. Senecio, sive Herbulum, TRAGI. Senecio foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus nudis, sparsis, LINN. Senegon ou Senesson.
- Senecio Indiæ occidentalis ocymi majoris folio profundè crenato, PLUCK. Acnelle.
- Senecio major, sive Flos sancti Jacobi. Jacobée; Fleur de S. Jacques; Herbe de S. Jacques.
- SENECIUM, NONNULL. Senegon ou Senesson.
- SENNÄ, off. Senné ou Séné d'Alexandrie.
- Senna alexandrina foliis acutis, C. B. Arbrisseau dont les follicules sont connues sous le nom de séné.
- Senna europæa, BOERH. Senna pauperum, ejusd.
- Senna Mauritanorum, RUEL. Baguenaudier, ou Senné bâtard.
- Senna italica foliis obtusis, C. B. & TOURNEF. Séné d'Italie.
- SENTIS canis, & Cynosbatos, BRUNSE. Rose sauvage; Rose de chien; Eglantier ou Grattecul.
- SEPIA, off. Sepia corpore oblongo depresso, LINN. Seiche ou Seiche; Bouffion.
- Σηπτικὰ ὀντρία. Septiques, ou Substances septiques.
- SEPTICÆ vel putrefacientes substantiæ. Septiques, ou Substances septiques.
- SEPTIFOLIUM, QUORUMD. Tormentille.
- SER, seu Seres, QUORUMD. Ver à soie, ou Chenille filant la soie.
- SERAPINUM, off. Sagapenum.
- SERIOLO, off. Chicorée blanche, ou Endive commune.
- SERIPHIMUM germanicum, sive Sophia quibusdam, J. B. Seriphium absinthium, FUSCH. Thalitron ou Thalitron; Science des chirurgiens.
- SERIS domestica, LOBEL. Laitue sauvage.
- SERPENS, off. Serpent à collier.
- Serpens aqueus. Arbre d'où se tire le bois néphrétique.
- Serpens indicus coronatus, diademate seu conspicillo insignitus, RAIL. Espece de serpent avec les os duquel on fait une pierre de serpent artificielle, désignée sous ce nom Lapis serpentinus.

- Piedra di cobra de capelos.
 Serpens terreus, CHYMICOR. *Nitre.*
 SERPENTARIA, seu Viperina, QUORUMD. *Vipérine*, ou *Herbe aux viperes.*
 Serpentaria altera virginiana vulgò, RAIL. *Serpentaire de Virginie vivace.*
 Serpentaria cretica. *Serpentaire de Crete.*
 Serpentaria major vel nigra, officin. DALE. *Serpentaire grande ou noire.*
 Serpentaria mas, seu Bistorta, FUSCH. *Bistorte à racines plus tortues.*
 Serpentaria secunda, BRUNSF. *Petite Serpentaire; Ophio-glosse; Langue de serpent; Herbe sans couture.*
 Serpentaria virginiana, officin. Serpentaria virginiana caule nodoso, PLUCK. & CATESBY. *Serpentaire de Virginie; Vipérine de Virginie.*
 SERPENTINUS lapis. *Pierre de serpent.*
 SERPYLLUM, off. Serpyllum vulgare minus, C. B. & TOURNEF. & PARK. Serpyllum vulgare, J. B. Serpyllum minus flore albo & flore purpureo, TABERN. Serpyllum vulgare repens, CLUS. Serpyllum vulgarissimum, NONNULLOR. *Petit Serpolet; Pillolet; Thym sauvage ordinaire.*
 Serpyllum citratum, off. Serpyllum foliis citri & odore, J. B. Serpyllum citri

- odore, C. B. Serpyllum pannonicum primum, & Serpyllum citri odore, CLUSII. Serpyllum foliis citratis, QUORUMD. *Serpolet; Pillolet citronné.*
 SERRATULA, off. C. B. & J. B. & DODON. & RAIL. & LOBEL. & MATTH. Serratula purpurea, GERARD, Serratula vulgaris flore purpureo, PARK. Serratula tinctoria, TABERN. Serratula foliis pinnatifidis; laciniâ terminatrice maxima, LINNÆI. Serratula tinctoris, H. E. *Serrette ou Sarrette.*
 SERRETA, vel Cerreta, CÆSALP. *Serrette ou Sarrette.*
 SERTULARIA ramis teretibus, articulis cylindraceis lapideis, æqualibus, LINNÆI. *Coralline.*
 SERUM lactis. *Petit-lait.*
 SERVILLA; Servillum, aut Chervillum, NONNULLOR. *Chervi, ou Girole.*
 SESAMOIDES majus, LUCÆ GHINI, GESNER. *Herbe maure; Réséda.*
 SESAMUM, off. Selamum veterum, C. B. & SLOANE. Sesamum foliis ovato-oblongis integris, LINNÆI. *Sésame.*
 SESBAN affinis, BREYN. *Arbre des battus; Gajati; Æschynomene à grande fleur.*
 SESELI, off. Sesele, sive Siler montanum vulgare, J. B. *Séséli commun; Livèche; Sermontaine.*

- Seseli creticum*, off. *Seseli creticum minus*, C. B. *Seseli creticum*, *sive Tordylium*, PARK. *Séséli de Candie*.
- Seseli palustre lactescens*, C. B. *Seseli palustre lactescens acre*, foliis ferulaeis, flore albo, seminato, J. B. & RAI. *Perfil des marais ou sauvage*; *Encens d'eau*.
- Seseli peloponnesiacum vel peloponnesense*, NONNULL. *Grand Perfil de montagne ou sauvage*.
- Seseli pratense*, off. *Seseli pratense*, Silaus fortè *Plinio*, C. B. *Seseli pratense Monspeliensium*, LOBEL. *Seseli monspeliense*, QUORUMD. *Saxifrage des Anglois ou des prés*.
- SETACEUM. *Séton*.
- SETO. *Séton*.
- SEXTIENSES aquæ. *Eaux d'Aix, en Provence*.
- SIALOGOGA medicamenta. *Remedes sialogogues*.
- Σιάλον; Σιάλος & Σιέλος. *Salive*.
- SICILIANA, off. *Siciliana*, aliis *Ciciliana*, vel *Androsæmon*, J. B. *Toute-saine*.
- SICLA & Cicla, off. *Bette blanche*, ou *Poirée blanche*.
- SIDERITIS, off. *Sideritis hirsuta procumbens*, C. B. *Sideritis vulgaris hirsuta*, J. B. *Sideritis foliis ovato-prælongis*, supernè crenatis, GUETT. *Crapaudine*.
- Sideritis anglica*, strumosâ radice, PARK. & RAI. *Petite Ortie puante*.
- SIDERITIS heraclea, FRACASTOR. *Orvale*; *Toute-bonne*.
- Sideritis secunda Dioscoridis*, CAL. *Pimprenelle*; *Pimprenelle*; *Pimpinelle*; *Bipinelle*.
- Sideritis tertia GESNERI*, COLUMN. *Bec de grue*, ou *Herbe à Robert*.
- Σίδηρος, GRÆCORUM. *Fer, métal*.
- SIDIUM. *Ecorce de grenade*.
- SIGILLUM beatæ Mariæ, off. *Sceau de Notre-Dame*, ou *Racine vierge mâle*.
- Sigillum capræ*. *Terre sigillée*, ou de *Lemnos*.
- Sigillum Salomonis*, OFFIC. *Sceau de Salomon*; *Signet*; *Genouillet*.
- SII, LINN. *Ninjin*.
- Σικυώνη, HIPPOCR. *Coloquinte*.
- SILAUM quibusdam, flore luteolo, J. B. *Saxifrage des Anglois*, ou des prés.
- SILER montanum, off. *Siler montanum vulgare*, *sive Seseli*, J. B. *Siler montanum*, DODON. & LOBEL. & GERARD. & RAI. *Séséli*; *Livêche*; *Sermontaine*.
- Siler alterum pratense*, DODON. *Saxifrage des Anglois*, ou des prés.
- SILEX fragmentis hinc convexis, inde concavis, subdiaphanis, LINN. *Agate*.

SILIGO, BRUNSP. *Seigle* ou *Segle*.

Siligo spicâ muticâ, LOBEL. *Froment* ; *Bled franc* ou *mutet*.

SILIQUA ægyptiaca, OFFIC. *Casse solutive*.

Siliqua arabica quæ *Tamarindus*, C. B. *Tamarinier*.

Siliqua edulis, C. B. *Carouge* ou *Caroubier*.

Siliqua sylvestris rotundifolia, C. B. *Siliqua fatua*, NONNULL. *Gâinier* ; *Arbre de Judas* ou *de Judée* ; *Arbre d'amour*.

SILICUASTRUM, off. TOURN. *Gâinier*, *Arbre de Judas* ou *de Judée* ; *Arbre d'amour*.

Σιλαφίον, DIOSC. & THEOPH. *Assa-fœtida* ; *Merde au diable des Européens* ; *Manger des dieux des Asiatiques*.

SILURUS, SALVIANI. *Esturgeon ordinaire* ou *commun*.

SILYBUM nervis foliorum albis, HALLER. *Chardon-marie* ; *Chardon de Notre-Dame* ; *Artichaut sauvage*.

SIMARUBA, JUSSIEU. *Simarouba*, *arbre de l'Amérique*, dont l'écorce porte le même nom.

SIMIA, off. *Simia* mammis quaternis capite ad aures crinito, LINN. *Simia unguibus omnibus planis & rotundatis*, BRISSON. *Singe*.

SINAPI album, off. *Sinapi apii folio*, C. B. *Sinapi sili-*

quâ hirsutâ, semine albo vel rufo, J. B. *Sinapi agreste apii aut potius laveris folio*, LOBEL. *Sinapi minus*, NONNULL. *Moutarde blanche*, ou *Senevé blanc*.

Sinapi hortense, L. H. *Roquette des jardins*.

Sinapi rapi folio, C. B. & TOURN. *Sinapi siliquâ latiusculâ glabrâ*, semine rufo, sive vulgare, J. B. *Sinapi sativum*, GERARD. *Moutarde* ; *Senevé ordinaire* ; *grande Moutarde cultivée*.

Sinapi rusticum, NONNULL. *Thlaspi*, ou *Taraspic ordinaire* ; *Moutarde* ou *Senevé sauvage*.

Sinapi septimum & Verbena femina, TRAGI. *Tortelle* ou *Vêlar*.

Sinapi sylvestre, L. *Roquette sauvage*.

SINAPIS siliquis glabris tetragonis. *Moutarde* ; *Senevé ordinaire* ; *grande Moutarde cultivée*.

Sinapis alterum genus, FUCHS. *Roquette des jardins*.

SINKOO vulgò, Japonum Kaworiki, id est Lignum, seu Arbor fragrans, Siamensibus Kissina, Latinis *Arbor aquilæ & Aloës dicta*, cujus fragrans lignum appellatur *Agallochum*. *Agallochum* ; *Bois d'aloës*.

SISARUM, GERMANOR. C. B. *Chervi* ou *Girole*.

Sifarum montanum coræense, radice non tuberosâ, KÆMPF. *Ninjin*.

Sifarum sativum magnum, NONNULL. *Panais ordinaire des jardins ; Panais domestique ou cultivé ; Pastenade ou Pastenaille blanche ; grand Chervi cultivé.*

SISER, off. *Chervi ou Girole.*

SISON, off. Sison quod Amomum officinis nostris, C. B.

Sison, sive Amomum, off.

J. B. Sison vulgare, sive Amomum germanicum, PARK. *Sison, ou faux Amome.*

Sison foliolis subcapillaribus, LINN. *Ammi.*

SISYMBRIUM, seu Mentha aquatica, J. B. Sisymbrium sylvestre, GESNER. Sisymbrium agreste aquaticum, LOBEL. *Menthe aquatique ; Menthe rouge ; Baume d'eau à feuille ronde.*

Sisymbrium annuum absinthii minoris folio, TOURNEF.

Sisymbrium petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis, LINNÆI.

Sisymbrium pinnis foliorum pinnatis, pinnulis subhirsutis linearibus, HALLER. - *Thalitron ou Thaliâtron ; Science des chirurgiens.*

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias divisus, siliquâ breviori, TOURN. Sisymbrium sylvestre, CÆSALP. *Raisfort*

d'eau, ou des marais, à feuilles laciniées.

Sisymbrium cardamine, seu Nasturtium aquaticum, J. B. Sisymbrium Cardamine dictum, GALENI. Sisymbrium foliis pinnatis, foliolis subcordatis, LINN. Sisymbrium foliis pinnatis, angulosis, floribus super folia vix alatis, HALLER. *Cresson d'eau ou aquatique ; Cresson de fontaine ou des ruisseaux.*

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo, TOURN. *Herbe de sainte Barbe, ou Herbe aux charpentiers.*

Sisymbrium foliis cordatis retusis, HALLER. *Alliaire.*

Sisymbrium foliis pinnatifidis, laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto, LINN. *Roquette des jardins.*

Sisymbrium foliis pinnatis, extremo lobo triangulo, siliquis erectis, cauli appressis, HALLER. *Tortelle ou Vêlar.*

Sisymbrium foliis simplicibus dentatis serratis, LINNÆI. *Raisfort d'eau ou aquatique ; Cresson à feuilles de raisfort.*

Sisymbrium hortense, vel Balsamita, OFF. *Menthe commune ; Baume des jardins ; Herbe du cœur.*

Sisymbrium palustre repens, nasturtii folio, TOURN. *Petit Cresson sauvage à fleurs jaunes ; faux Cresson.*

SITZ, seu Sitzdsiu, KÆMPF. *Arbre dont le suc est le vernis de la Chine.*

SIU Siin; vulgò Nifii; Nindsim & Dindsom *sinicè*; Som *tartaricè*; Soasai; Sifarum montanum coræense, radice non tuberosâ, KÆMPFER. *Ninzin*.

Sium, off. Sium, *sive* Apium palustre foliis oblongis, C. B. Sium, *sive* Laver DIOSCORID. olusatris folio, *sive* Pastinaca aquatica, LOBEL. Berle ou Ache d'eau.

Sium alterum aquaticum luteum, *vel* Cardamine tenuifolia montana, COLUMN. *Petit Cresson sauvage à fleurs jaunes; faux Cresson*.

Sium aromaticum, Sison officinarum, TOURN. *Sison*, ou *faux Amome*.

Sium folio infimo cordato, caulinis ternatis, omnibus crenatis, GRONOV. *Ninzin*.

SMARAGDUS. *Emeraude*.

SMERILLUS. *Emeril*.

SMILAX arbor, CAMER. Smilax, DIOSCOR. *If*.

Smilax aspera chinensis, *Lampatam* dicta, *seu* China orientalis, HERMAN. Smilax minus spinosa fructu rubicundo, radice virtuosâ, China dicta, KÆMPF. Smilax caule aculeato, foliis orbiculato-ovatis, inermibus, quinquenerviis, LINN. *Plante dont la racine se nomme squine*.

Smilax aspera fructu rubente, C. B. Smilax aspera, rutilo fructu, CLUSII. Smilax

aspera fructu rubro, PARKER. *Liferon rude; Lifet piquant* ou *épineux*.

Smilax hortenensis, *sive* Phaeolus major, C. B. *Fève; Féverolle; Haricot; Phaséole* ou *Phasiole; Fève peinte* ou *à visage; Fève* ou *Pois de mer*.

Smilax lævis major, DODONÆI. *Grand Liferon* ou *Lifet*.

Smilax lævis minor, DODON. *Petit Liferon* ou *Lifet; Campanette* ou *Clochette; Vrillée commune*.

Smilax viticulis asperis virginiana, foliis angustis, lævibus, nullis articulis prædita, PLUCK. Smilax aspera fructu nigro, radice nodosâ magnâ farinaceâ, China dicta, SLOANE. *Plante dont la racine se nomme squine d'Occident*.

Smilax viticulis asperis virginiana, folio hederaceo lævi, PLUCK. Smilax aspera peruviana, *seu* Sarsaparilla, C. B. Smilax caule aculeato angulato, foliis inermibus, retuso-mucronatis, LINN. *Plante dont la racine est la falsépaille*.

Σμύλπις vel Σμύλπις, DIOSCOR. *Emeril*.

SMIRIS vel Smyris, OFFICIN. *Emeril*.

Σμύλπις vel Σμύλπις, DIOSCOR. *Emeril*.

SMYRIS vel Smiris, OFFICIN. *Emeril*.

Σμύλπις, DIOSCOR. *Myrræ*.

SMYRNIUM, DIOSCORIDIS.
Macéron ; gros Persil de
Macédoine.

Smyrnum, LACUNÆ. Li-
vêche, ou Ache de mon-
tagne.

SNAKEROOT radix novæ An-
gliæ, CORN. *Serpentaire*
de Virginie ; Vipérine de
Virginie.

SOASAI. *Ninzin.*

SODA, officin. Soda, Kali
magnum, sedi medii fo-
lio, semine cochleato,
LOBEL. *Grande Soude ;*
Salicote ; Marie vulgaire.

SOKIO, G. CAMELLI. Pre-
miere espece de bois d'aloës
ou d'agallochum, suivant
G. BAUHIN.

SOLANIFOLIA *Circæa dicta*
major, C. B. Herbe de
S. Etienne, ou Herbe en-
chanteresse.

SOLANUM, off. acinis nigri-
cantibus, C. B. & TOURN.
Solanum hortense, five vul-
gare, CORDI. Solanum
caule inermi herbaceo, fo-
liis angulosis, undulatis,
caule brevi, HALLERII.
Morelle commune à fruit
noir.

Solanum arborescens indi-
cum, foliis napetæ majo-
ribus magis mucronatis,
fructu rotundo, duro, spa-
diceo-nigrescente, semine
orbiculari compresso, ma-
ximis, BREYN. Solanum
arborescens indicum, foliis
napetæ minoribus, fructu
rotundo, duro, & semine

orbiculari, compresso, mi-
noribus, BREYN. Arbre
qui donne le bois de cou-
leuvre.

Solanum arborescens indicum
maximum, foliis œnoplæ
sive napetæ majoribus,
fructu rotundo, duro, ru-
bro, semine orbiculari com-
presso maximo, nuces vo-
micas & lignum colubri-
num officinarum ferens,
BREYN. Arbre qui porte la
noix vomique.

Solanum foetidum, pomo spi-
noso, oblongo, flore albo,
C. B. Pomme épineuse ;
Noix mételle ; Herbe aux
forciers ; Herbe des magi-
ciens ou des démoniaques ;
Herbe du diable ; Herbe à
la taupe.

Solanum furiosum ; Solanum
maniacum ; Solanum le-
thale, off. Solanum mela-
nocerasos, C. B. Solanum
somniferum, LOBEL. So-
lanum maniacum multis,
seu Belladonna, J. B. Bel-
ladonna ; Belladone, & non
pas Belledame.

Solanum mexicanum, flore
magno purpureo seu ker-
messino, C. B. Belle de
nuir.

Solanum pomiferum fructu
oblongo, C. B. Sola-
num hortense & Pyra in-
sana, CÆSALP. Mélon-
gene ou Mélangene ; Maïen-
ne ; Aubergine.

Solanum pomiferum fructu
rotundo, striato, molli,

- C. B. *Pomme d'amour*, ou *Pomme dorée*.
Solanum quadrifolium bacciferum, C. B. *Solanum tetraphyllum*, LOBEL. *Raisin de renard*; *Herbe à Paris*.
Solanum racemosum, off. *Solanum racemosum indicum*, H. R. P. *Solanum magnum rubrum*, virginianum, PARK. *Solanum indicum caule rubro*, NONNULL. *Morelle à grappe*; *grande Morelle des Indes*; *Vermillon* ou *Herbe à la laque*; *Méchoacan du Canada*.
Solanum scandens, seu *Dulcamara*, C. B. *Solanum lignosum*, sive *Dulcamara*, PARK. & RAIL. *Solanum caule perenni*, flexuoso, foliis superioribus hastatis, LINN. *Solanum foliis aliis trifidis*, aliis simplicibus, HALLER. *Morelle*; *Douce-amere*.
Solanum tuberosum, seu *Papas*, off. *Solanum tuberosum esculentum*, C. B. & TOURN. *Truffe rouge*; *Pomme de terre*; *Artichaut des Indes*; *Battate commune des jardins*.
Solanum vesicarium, off. C. B. *Solanum vesicarium vulgare*, fructu & vesicâ rubrâ, H. O. *Solanum halicacabum vulgare*, J. B. & RAIL. *Solanum vesicarium*, sive *Alkekengi*, PARK. *Alkékenge*; *Coqueret*; *Coquerelle*.

- SOLARIA major*, CAMER. *Rosée du soleil*; *Rossolis*; *Herbe de la rosée*; *Herbe de la goutte*.
SOLDANELLA, off. *Soldanella maritima minor*, C. B. *Soldanella*, sive *Brassica maritima*, J. B. *Soldanella vulgaris*, sive *Volubilis marina*, GER. & RAIL. *Soldanelle*; *Chou de mer*; *Chou marin*.
SOLIDAGO consolidæ species, BRUNSF. *Petite Marguerite*; *petite Pâquerette*.
Solidago sarracenica, TRAGI. *Solidago caule erecto*, racemis alternis erectis, LINNÆI. *Verge d'or à feuilles étroites*; *petite Verge dorée*.
Solidago sarracenica latifolia, serrata, seu *Virga aurea*, J. B. *Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis*, LINN. *Verge d'or à larges feuilles*; *grande Verge dorée*.
SOM tartaricè. *Ninjin*.
SONCHO affinis; *Lampfana domestica*, C. B. *Lampfane*; *Herbe aux mamelles*.
SONCHUS asper, off. *Sonchus asper non laciniatus*, C. B. *Sonchus minus laciniatus asperior*, seu *spiniosior*, J. B. *Laitron*, ou *Laceron épineux*.
Sonchus lævis, off. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*, C. B. & TOURN. *Sonchus minus laciniatus*, mitior,

- five minùs spinosus, J. B.
 Sonchus caule ramoso dif-
 fuso, foliis summis am-
 plexicaulibus, VAN ROYEN.
 Sonchus pedunculis tomen-
 tosis, LINN. *Laitron*; *Lac-*
eron doux; *Palais de lie-*
vre.
- Sonchus lævis angustifolius,
 C. B. & TOURN. *Petit Lai-*
tron, ou *Laceron doux*;
Terre crepe.
- Sonchus lævis laciniatus cæ-
 ruleus, seu alpinus cæru-
 leus, C. B. Sonchus Lap-
 ponum altissimus, floribus
 cæruleis, LINN. *Laitron*
des Alpes ou *de Laponie*.
- SOPHIA, off. Sophia chirur-
 gorum, LOBEL. & DOD.
 & GER. & PARK. & RAI. *Thal-*
itron ou *Thaliètron*;
Science des chirurgiens.
- SORBUM ovatum, FUSCHS.
Sorbier; *Cormier domesti-*
que ou *cultivé*.
- SORBUS, off. Sorbus fativa,
 C. B. Sorbus legitima,
 PARK. Sorbus domestica,
 MATTHIOLI. Sorbus escu-
 lenta, CAMER. Sorbus fo-
 liis pinnatis, infernè to-
 mentosis, fructu majori,
 HALLER. *Sorbier*; *Cor-*
mier domestique ou *cultivé*.
- Sorbus sylvestris sive aucupa-
 ria, off. Sorbus sylvestris
 foliis domesticæ similis,
 C. B. Sorbus sylvestris al-
 pina, LOBEL. Sorbus syl-
 vestris, sive Fraxinus bu-
 bula, GER. Sorbus mon-
 tana aucuparia, SCHWENCK.
- Sorbus foliis pinnatis, LIN-
 NÆI. Sorbus foliis pinnatis
 glabris, fructu minimo,
 HALLER. *Sorbier* ou *Cor-*
mier sauvage.
- Sorbus torminalis, off. C. B.
 & J. B. & DODON. &c....
 Sorbus sylvestris sive tor-
 minalis *Matthioli*, L. H.
 Sorbus torminalis folio ace-
 ris, vitis, aut populi albæ,
 LOBEL. Sorbus torminalis
Plinii & herbariorum vulgò,
 Hypomelides fortè PAL-
 LADI. *Alisier* ou *Sorbier*
torminal; *Tormigne*; *Anier*
 ou *Aigrettier*.
- SOREX domesticus, CHAR-
 LET. *Souris*.
- Sorex domesticus, CHARLET.
Rat.
- SORGHUM, J. B. *Grand Millet*
noir; *Blé barbu*; *Sorgo*.
- SORGHUM, off. Sorghum,
 sive Melica, DOD. *Grand*
Millet noir; *Blé barbu*;
Sorgo.
- SORGUM, seu Milium indi-
 cum, RAI. *Grand Millet*
noir; *Blé barbu*; *Sorgo*.
- SPADANÆ aquæ. *Eaux*
de Spa, à neuf lieues de
Liege.
- SPARGULA, off. *Gratteron*;
Rieble.
- SPARTIUM arborescens, se-
 minibus lenti similibus,
 C. B. Spartium dioscori-
 dæum, narbonense & his-
 panicum, LOBEL. Spar-
 tium hispanicum frutex vul-
 gare, PARK. *Genêt d'Es-*
pagne.

SPATULA foetida, *plerisque*
Xiris, J. B. *Glaïeul puant* ;
Spatule ou *Espatule puant* ;
Iris qui sent le gigot.

SPECULARIS lapis, *off.* *Specularis lapis*, *seu* *Glacies Mariæ*, KONIG. *Pierre spéculaire* ; *Verre de Moscovie.*

SPERMATOPŒIA medicamenta. *Remedes spermatopées.*

SPHACELUS *Theophrasti*, qui fortè *salvia major*, C. B. *Grande-Sauge* ; *Sauge franche* ou *ordinaire.*

Sphacelus verus, *Theophrasti*, L. H. *Petite Sauge* ; *Sauge de Provence.*

SPHONDYLUM, *off.* *Sphondylium vulgare hirsutum*, C. B. *Sphondylium pinnarum pinnis hirsutis*, *seminiquinquefidis*, HALLERII. *Bouc* ; *fausse Branc-ursine* ; *Branc-ursine bâtarde.*

SPICA ; *Spica nardi*, *Spica indica*, *off.* *Nard indien.*

Spica gallica ; *Spica romana*, *off.* *Nard celtique.*

Spica italica & domestica, CÆSALP. *Spica & Lavandula brevior folio*, CLUS. *Lavande femelle.*

Spica, *Nardus germanica*, TRAGI. *Lavande mâle* ; *Spic* ; *Aspic* ; *Nard commun.*

SPIGELIA, LINN. *Spigelia ramis indivisis, foliis terminantibus verticillatis*, BUTTNER. *Spigelia.*

SPINA acuta pyri folio, C. B. *Buisson ardent*, ou *Arbre de Moïse.*

Spina ægyptiaca, PARK. *Spina ægyptiaca foliis scorpioidis leguminosæ, floribus luteis, siliquis compressis lupini*, DOUGLASS. *Acacia vrai.*

Spina alba, *off.* *Spina alba tomentosa, latifolia*, vulgaris, C. B. *Chardon commun* ; *grand Chardon aux ânes* ; *Artichaut sauvage* ou *des champs* ; *Présure.*

Spina Burgi Monspeliensium, PARK. *Alaterne*, première espèce.

Spina Christi seu *judaïca*, QUORUMDAM. *Épine de Christ* ; *Paliure* ; *Porte-chapeau* ; *Argalou des Provençaux.*

Spina hirci, GER. *Barbe-renard*, ou *Épine de bouc* ; c'est l'arbre qui produit la gomme adragant.

Spina infectoria vulgaris, seu *Rhamnus solutivus*, PARK. *Spina cervina* vulgè, GESNER. *Nerprun* ; *Noirprun* ; *Bourg-épine.*

Spina murina, seu *Myrtus sylvestris*, LOBEL. *Houx frêlon* ; *Petit-Houx* ; *Housson* ; *Fragon*, *Myrte sauvage* ou *épineux* ; *Brusc* ; *Buis piquant.*

SPINACIA sylvestris, MATTH. *Bon-Henri.*

Spinacia vulgaris, capsulâ seminis aculeatâ, TOURN. *Spinacia mas*, J. B. *Spinacia semine spinoso*, C. B. *Epinard mâle* dont la graine est épineuse.

Spinacia

Spinacia vulgaris, capsulâ feminis non aculeatâ, *TOURNEF.* *Spinacia* femine non pungente, folio majore rotundiore, *C. B.* *Spinacia nobilis*, *TRAGI.* *Epinard mâle* dont la graine n'est pas épineuse.

Spinacia vulgaris sterilis, *TOURN.* *Spinacia femina*, *L.* *Epinard femelle* ou stérile.

SPINOS echini, *WOODW.* *Pierre de Judée.*

SPINUS albus, *J. B.* *Epine blanche*; *Aubépin*; *Aubépine*; *Noble-épine.*

SPIRÆA Theophrasti fortè, *DALEC.* *Viorne*; *Hardeau*; *Bourdene* ou *Bour-daine.*

SPIRITUS salis. *Esprit de sel.* *Σπληνικά φάρμακα.* *Remedes spléniques.*

SPLENICA medicamenta. *Remedes spléniques.*

SPODIUM. *Spode*, ou *Ivoire calciné.*

SPONGIA ad usum præstantissima, foraminibus exquisitis pervia, *TOURNEF.* *Spongia tenax subramosa*, ramis difformibus perforatis, *ROYEN.* *Eponge.*

Spongia sambuci, *SCHROD.* *Oreille de Judas.*

Spongia solis, *MONT.* *Pierre lumineuse*, ou *Phosphore de Bologne.*

SPONSA solis, seu *Rosa solis*, *THAL.* *Rosée du soleil*; *Rosolis*; *Herbe de la rosée*; *Herbe de la goutte.*

Tome VIII.

SPUMA aeris PARACELSITARUM. *Mousse membraneuse*; *Nostoch des Allemands.*

SPUTUM lunæ, *PARACELSITARUM.* *Mousse membraneuse*; *Nostoch des Allemands.*

SQUALUS dorso plano, dentibus ad latera ferratis, *ARTEDI.* *Requin*; *Requien*; *Requiem*; *grand Chien de mer* ou *marin*; *Poisson à deux cents dents*; *Lamie* ou *Poisson anthropophage*; *Tiburon.*

SQUILLA & Scilla, *OFFICIN.* *Scille rouge*; *grande Scille*; *Oignon marin.*

SQUINANTHUM, off. *Jonc odorant.*

STACHYS major germanica, *C. B.* *Stachys foliis oblongo-cordatis*, floribus verticillatis, *LINN.* *Epi fleuri*; *Sauge molle*; *Sauge sauvage* ou *de montagne.*

Stachys palustris foetida, *C. B.* *Stachys aquatica*, *TABERN.* *Petite Ortie puante.*

STANNUM. *Étain.*

Stannum ustum. *Chaux d'étain*; *Potasse.*

STAPHIS agria, *C. B.* *Staphisaigre*; *Herbe aux poux*; *Herbe à la pituite.*

STAPHISAGRIA, off. *Staphisaigre*; *Herbe aux poux*; *Herbe à la pituite.*

STAPHYLINUS, *GRÆCOR. & C. B.* *Daucus vulgaire*; *Chirouis*; *Carotte sauvage.*

STATICE, off. *Statice caule nudo simplicissimo capitato*,

D d

- LINN. *Statice* ; *Gazon d'Olympe* ou de montagne ; *Œillet de Paris* ; *Herbe à sept tiges*.
 STELLA herba *Italica* , GESN. *Pied de Lion* ; *Alchimille*.
 Stella terræ , QUORUMDAM. *Talc*.
 STELLARIA , BRUNSE. *Muguet des bois* ; *petit Muguet* ; *Hépatique étoilée*.
 Stellaria , MATTH. *Pied de lion* ; *Alchimille*.
 STERCUS diaboli. *Assa-fœtida* ; *Merde au diable des Européens* ; *Manger des dieux des Asiatiques*.
 Stercus passerum , NONNULL. *Grande Soude* ; *Salicote* ; *Marie vulgaire*.
 STIBIUM. *Antimoine*.
 ΣΤΥΧΑΣ DIOSCORID. *Stæchas arabe*.
 STÆCHADOS flores , OFFIC. *Stæchas arabe*.
 STÆCHAS arabica , OFFICIN. *Stæchas arabe*.
 Stæchas citrina angustifolia latifolia , seu *Elichrysium* , C. B. *Stæchas citrin*.
 ΣΤΥΧΑΣ GALENI. *Stæchas arabe*.
 STOMACHICA medicamenta. *Remedes stomachiques*.
 ΣΤΩΡΑΞ , DIOSCOR. & GRÆCORUM VETERUM. *Storax solide*.
 STRAMONIUM , seu *Nux metella* , officin. *Stramonium fructu spinoso rotundo* , *flore albo simplici* , TOURN. *Pomme épineuse* ; *Noix mételle* ; *Herbe aux sorciers* ;
Herbe des magiciens ou des démoniaques ; *Herbe du diable* ; *Herbe à la taupe*.
 STRATIOTES millefolia major , L. H. *Millefeuille* ; *Herbe au charpentier* ; *Herbe à la coupure ou aux coupures*.
 STRIX , BELON. *Frésaie* ; *Effraie* ou *Orfraie* ; *Hibou des clochers* ; *petit Chatuant plombé* ; *Chouart* ; *Lucheron*.
 STROUTHOS. *Passereau* ; *Moineau franc* , domestique ou commun.
 STRUMEA , PLINII. *Petite Chelidoine* ; *petite Scrophulaire*.
 STRUTHIO , off. *Autruche* , ou *Cerf-oiseau*.
 STRUTHIOCAMELUS , ALDROV. & WILLUGB. *Autruche* , ou *Cerf-oiseau*.
 STRUTHIUM , QUORUMDAM. *Savonniere* ou *Savonnaire* ; *Saponniere* ou *Saponnaire*.
 STRUTHIUS arabicus. *Autruche* , ou *Cerf-oiseau*.
 STRYCHNOS foliis ovatis , caule inermi , LINN. *Arbre qui porte la noix vomique*.
 Strychnos foliis ovatis , acutis , cirris simplicibus , LINN. *Arbre d'où se tire le bois de couleuvre*.
 STURIO , off. *Sturio* , sive *Silurus* , SALV. *Esturgeon ordinaire* ou commun.
 STYRACI & Euonymo mediæ affinis , Thee , KÆMPF. *Arbrisseau dont les feuilles*

font connues sous le nom de thé.

STYRACIFERA (*seu* Arbor liquidambari) aceris folio , fructu tribuloïde , *id est* pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens , PLUCK. *Arbre des incisions duquel découle le liquidambar.*

STYRACIFLUA , *seu* Liquidambar arbor , aceris folio , fructu tribuloïde , PLUCK. *Arbre d'où coule le storax ou styrax.*

Στόραξ καλαμίτης , GRÆCOR. *Storax calamite ou en larmes.*

STYRAX aceris folio , RAIL. *Arbre des incisions duquel découle le liquidambar.*

Styrax calamita , OFF. *Storax calamite ou en larmes.*

Styrax folio mali cotonei , C. B. *Arbre qui donne la gomme-résine nommée storax.*

Styrax liquidus , OFF. *Storax liquide , ou Styrax.*

Styrax solidus , *vel* Storax , OFF. *Storax solide.*

Styrax vulgaris , *seu* in globos compactus , off. Styrax ruber , QUORUMD. *Storax commun ou en masses ; Résine du storax.*

SUBER , off. Suber latifolium perpetuò virens , C. B. Suber , *seu* Phellos , DODON. *Liege.*

SUBERIFERA latifolia , ilex glande echinato , NONNULOR. *Liege , arbre.*

SUBSTANTIÆ metallicæ. *Substances métalliques.*

Substantiæ septicæ *seu* putrefacientes. *Septiques , ou Substances septiques.*

SUCCINUM. *Succin ou Karabè.*

Succinum nigrum. *Jais ou Jayet.*

SUCCISA , off. Succisa hirsuta , C. B. Succisa , *sive* Morfus diaboli , J. B. & RAIL. Succisa flore caruleo , QUORUMDAM. *Scabieuse des bois ; Succise ; Mors ou Remors du diable.*

SUCCOLADA. *Chocolat.*

SUCCUS aloës , OFF. *Aloës , suc concret , résineux-gommeux.*

SUDORIFICA medicamenta. *Remedes sudorifiques.*

SUFFITUS. *Fumigation.*

SUKHIANG , *Sinenfium* , DALE. *Première espèce de bois d'aloës , ou d'agallochum , suivant G. BAUHIN.*

SULPHUR citrinum. *Soufre.*

Sulphur vivum *seu* virginicum ; Sulphur nativum purum flavum , WALLER. *Soufre vis ou vierge.*

SUMACH , off. J. B. Sumach , *sive* Rhus obsoniorum & coriariorum , PARK. *Sumach ordinaire ou commun ; Roux ou Roure des corroyeurs.*

Sumach , *sive* Rhus virginiana , PARK. *Sumach des jardins ou de Virginie.*

SUPERIORES thermæ. *Eaux de Bade ou Baden en Suisse.*

SUPPOSITORIUM. *Suppositoire.*

SUPPURANTIA vel Suppurativa medicamenta. *Remedes suppuratifs.*

SUS seu Porcus domesticus, RAIL. Sus dorso anticè setoso, caudâ pilosâ, LINN. Sus caudatus, auriculis oblongis, acutis, caudâ pilosâ, BRISSON. *Cochon; Porc ou Pourceau domestique.*

SUS agrestis, sive Aper, RAIL. Sus dorso anticè setoso, caudâ pilosâ, LINN. Sus caudatus, auriculis brevibus, subrotundis, caudâ pilosâ, BRISSON. *Cochon sauvage, ou Sanglier.*

Συγγύβησις, DIOSC. & GALEN. *Gingembre, racine.*

SYMPHYTUM, Consolida major, C. B. Symphytum magnum, J. B. Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus, LINN. Symphytum foliis ovato-lanceolatis, caule alato, HALLER. *Grande Consoude.*

Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia, C. B.

Grande Pulmonaire; Pulmonaire à feuilles larges; Herbe au lait de Notre-Dame; Herbe aux poumons; Herbe du cœur.

Symphytum medium, offic. Teucrium foliis obversè ovatis, crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptraticibus, LINN. *Bugle, ou petite Consoude.*

Symphytum minimum, QUORUM. *Petite Marguerite; petite Pâquerette.*

Symphytum minus. *Brunelle.* SYRINGA, offic. Syringa alba, sive Philadelphus Athenæi, C. B. & TOURN. Syringa flore albo simplici, PARK. Syringa italica seu vulgaris; Syringa floribus candidis, NONNULL. Syringa, ou Seringa commun.

Syringa cærulea, C. B. Syringa flore cæruleo, sive Lilac, J. B. Syringa cærulea lusitanica, LOBEL. *Lilas ou Lilac; Syringa à fleur bleuâtre; Queue de renard des jardins.*

SYRINGITES, NONNULORUM.

SYRUPUS. *Syrop.*



T A M

- T**ABACCA , NONNULLOR. *Tabac de Virginie ; Pétun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.*
- T**ABACCO anglicum , PARK. *Tabac femelle ; faux Tabac ; Tabac du Mexique ; Nicotiane à feuilles rondes ; petite Nicotiane.*
- T**abacco angustifolium , PARK. & RAI. *Tabac de Virginie ; Pétun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.*
- T**ABACUM angustifolium , *sive* Nicotiana folio angustiore , J. B. Tabacum , *sive* Herba sancta minor , LOBEL. *Tabac de Virginie ; Pétun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.*
- T**abacum majus , *sive* Nicotiana major , J. B. Tabacum latifolium , CAM. *Tabac mâle ou vrai ; Nicotiane à larges feuilles.*
- T**ABAXIR , AVICENN. & ARABIB. *Le Suc de Bambu.*
- T**ABELLÆ. *Tablettes.*
- T**ACAMAHACA , off. *Tacamahaca ou Tacamaque.*
- T**acamahaca foliis crenatis , lignum ad ephippia conficienda aptum , PLUCK. *Arbre d'où découle la résine tacamahaca.*
- T**ACOMUREE & Viba , PRISON. *Roseau d'où l'on tire le sucre.*
- T**ALCUM albicans lamellis subpellucidis , WALL. Talcum particulis impalpabilibus diaphanis molliusculis convexis fissilibus , LINN. *Talc.*
- T**ALPA , off. Talpa nostras , nigra communiter , KLEIN. Talpa caudata nigricans , pedibus anticis & posticis pentadactylis , BRISSON. *Taupe.*
- T**AMALAPATHRUM , *sive* Folium indicum , C. B. *L'Arbre qui porte la feuille indienne ou malabathrum.*
- T**AMALAPATRA , GARZ. *Feuille indienne ou Malabathrum.*
- T**AMAR hendi , ARABUM. *Tamarins.*
- T**AMARINDI , off. *Tamarins.*
- T**AMARINDUS , SLOANE. Tamarindus *Detelside* appellata , PROSP. ALPIN. *Tamarinier.*
- T**AMARISCUS germanica , off. LOBEL. Tamariscus folio latiore , PARK. & RAI. Tamariscus altera , seu Myrica , CAMER. *Tamarisc ou Tamarix ; Tamarix d'Allemagne ; le petit Tamarisc.*
- T**amariscus , *sive* Tamarix , off. Tamariscus narbonensis , LOBEL. Tamariscus folio tenuiore , PARK.

Tamarisc ordinaire ou commun ; *Tamaris* de Narbonne.

TAMARIX, off. *Tamarix* altera folio tenuiore, sive gallica, C. B. *Tamarix* major sive arborea narbonensis, J. B. *Tamarix* gallica & prima, sive *Myrica*, MATTH. *Tamarix* pedunculis nudis, floribus pendulis, LINN. *Tamarisc* ordinaire ou commun ; *Tamaris* de Narbonne.

Tamarix fruticosa folio crassiflore sive germanica, C. B. *Tamarix* germanica sive minor, fruticosa, J. B. *Tamarix* humilis, CORD. *Tamarisc* ou *Tamaris* ; *Tamarix* d'Allemagne ; le petit *Tamarisc*.

TAMARUM vulgò, vel *Cerasi* folia, CÆSALP. *Bryone*, ou *Vigne blanche* à baies rouges, ou *Couleuvrée*.

TAMNUS, off. *Tamnus* racemosa, flore minore luteo pallescente, T O U R N E F. *Sceau de Notre-Dame*, ou *Racine vierge mâle*.

Tamnus baccifera flore majori albo, T O U R N E F. *Sceau de Notre-Dame*, femelle.

TANACETUM, off. *Tanacetum* vulgare luteum, C. B. & T O U R N. *Tanacetum* vulgare flore luteo, J. B. *Tanacetum* millefolii foliis, LOBEL. *Tanacetum* foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis incisiss serratis,

LINN. *Tanaisie* ordinaire ; *Herbe aux vers*.

Tanacetum album seu acutum, T R A G I. *Herbe à éternuer*.

Tanacetum hortense foliis & odore menthæ, L. B. *Tanaisie* des jardins à feuilles de menthe ; le grand Baume ; la *Menthe-coq* ; la *Menthe Notre-Dame* ; le *Coq* ; le *Pasté* ; l'*Herbe du coq* ou au coq ; le *Coq des jardins*.

Tanacetum minus album, odore camphoræ. Autre espèce de millefeuille à laquelle TABERN. a donné le nom de noble.

TANUS, H. M. Ray opine que c'est l'arbre qui porte les myrobolans emblics ou embliques.

TAPIRA coaynana *Brasilianensibus*, PISON & MARCG. Arbre qui produit la casse du Brésil.

TARANDUS, GESNER. *Renne* ; & en vieux françois, *Rangier* ou *Ranglier*.

TARASITH, ARABUM. *Hypociste*, suc desséché & noir.

TARAXUM, off. *Taraxacum* pinnis foliorum triangularibus, HALLER. *Pissenlit* ; *Dent de lion*.

TARBELLICÆ aquæ. *Eaux de Dax*, dans les landes de Gascogne.

TARCHON, AVIC. & SETHI. *Estragon*.

TARDA, RECENTIORUM. *Outarde* ; *Otarde* ; *Bitarde*.

Tarda avis. *Outarde; Otarde; Bitarde.*

TARTAGO Hispanorum, E. H. *Tithymale à larges feuilles; Epurge; Cata-puce ordinaire.*

TARTARUM. *Tartre.*

TAURUS, seu Bos æthiopicus, QUORUMD. *Rhinoceros; & par les Portugais, Moine des Indes.*

Taurus volans, OLEAR. *Cerf-volant; grand Escarbot; Scarabée cornu.*

TAXUS, off. *Taxus; vulgò Nassus, flosculos amentaceos ferens, CÆSALP. If.*

TAXUS, RAIL. *Blâireau ou Bléreau; Taïsson ou Tesson; Grisard; Bedouault, ou Bedouau, ou Bedou.*

TECOMAHACA, HERNAND. *Tacamahaca ou Tacamaque.*

Tecomahaca, HERNAND. *Arbre d'où découle la résine tacamahaca.*

TEGULA hibernica, FULLER. & I. M. *Pierre d'Hibernie, ou Ardoise d'Irlande.*

TE-HIANPOU, SINENSIBUS. *Acorus des Indes ou d'Asie; Glaïeul aromatique d'Asie.*

TEHIN-HIANG, Sinensium, DALE. *Seconde espece de bois d'aloës, ou d'agallochum, suivant G. BAUHIN.*

TELEPHIUM vulgare, off. & C. B. *Telephium alterum, sive Crassula, DODON. Orpin; Reprise; Grassette; Joubarbe des vignes.*

TERBADH, AVICENN. *Turbith.*

TEREBINTHINA abietina; Terebenthina argentoratensis, OFF. *Térébenthine de Strasbourg ou de sapin; Résine liquide des sapins; Bigion, ou Bijon.*

Terebinthina chia vel cypria, officin. Terebinthina LATINORUM. *Térébenthine de Chio.*

Terebinthina communis, OFF. *Térébenthine commune.*

Terebinthina veneta vel laticia, OFFICIN. *Térébenthine de Venise ou des Mélezes.*

TEREBINTHUS foliis cordato-ovatis pinnatis, cortice lævi rufescente, floribus masculis spicatis, BROWN. Terebinthus major, betulæ cortice, fructu triangulari, SLOANE. *Simarouba, arbre de l'Amérique.*

Terebinthus indica, THEOPHRASTI. *Pistachier, arbre.*

Terebinthus major, betulæ cortice, fructu triangulari, SLOANE. *Arbre qui porte la résine nommée élémi.*

Terebinthus vulgaris, C. B. Terebinthus, J. B. *Arbre d'où découle la térébenthine de Chio.*

TERMENTHINA, QUORUMD. *Térébenthine de Chio.*

TERRA. *Terre.*

Terra crepula, OFF. *Petit Laitron, ou Laceron doux; Terre-crepe.*

- Terra japonica. *Cachou*; *Ca-téchu*; *Caetchu*; *Castjoe*; *Cate*; *Khaath*; & improprement, *Terre du Japon*.
- Terra lemnia. *Terre sigillée* ou de Lemnos.
- Terra melitensis sigillata. *Terre sigillée de Malte*.
- Terra merita, off. *Curcuma long*; *Souchet des Indes*; *Safran des Indes*.
- Terra sigillata. *Terre sigillée*, ou de Lemnos.
- TERTIANARIA, off. & TABERN. *Centauree bleue*; *Tertianaire*, ou *Herbe aux fievres*.
- TERTIOLA, CÆSALP. *Petite Ortie puante*.
- TESTICULUS morionis mas, DODON. *Testiculus primus*, MATTH. *Orchis*; *Satyrion*; *Testicule* ou *Couillon de chien*, mâle, à feuilles étroites.
- TESTUDO marina, officin. *Testudo marina vulgaris*, RAI. *Testudo marina corticata* seu communis, NONNULL. *Tortue de mer*.
- Testudo palustris*, off. *Testudo nigra palustris*, J. M. *Testudo lutaria*, RONDEL. & BELLON. *Testudo quæ in aqua dulci vivit*, GESN. *Testudo aquæ dulcis & lutaria*, ALDROV. *Tortue d'eau douce*.
- Testudo terrestris*, off. *Testudo terrestris vulgaris*, RAI. *Testudo terrestris variegata nostras*, QUORUMDAM. *Testudo terrena*

- communis; *Testudo montana sylvestris*, campestris seu nemoralis, QUORUMD. *Tortue de terre*.
- TETRAGONIA, QUORUMD. *Fusain*; *Bonnet de prêtre*; *Bois à faire des lardoires*.
- TETRAO macula nuda coccinea ponè oculos, rectricibus ferrugineis, LINN. *Perche de riviere*, poisson.
- Tetrao pedibus nudis, corpore griseo, maculato, lineâ superciliarum albâ, LINN. *Caille*, oiseau.
- TEUCRII tertia species, CLUSII. *Véronique des prés*, ou *Germandrée bâtarde*.
- Teucii quarta species, CLUSII. *Véronique mâle*; *Thé de l'Europe*.
- TEUCRIUM, seu *Betonica Pauli Æginetæ*, TRAGI. *Véronique mâle*; *Thé de l'Europe*.
- Teucrium foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, subsessilibus, floribus solitariis pedunculatis, LINN. *Polion de Crete*.
- Teucrium foliis linearibus trifidis integerrimis, LINN. *Ivette ordinaire*.
- Teucrium foliis ovatis, inciso-crenatis, petiolatis, floribus laxè verticillatis, LINNÆI. *Petit Chêne*; *Chénette*; *Germandrée*.
- Teucrium foliis ovatis, utrinque acutis integerrimis, floribus solitariis spicatis digestis, LINN. *Vrai marum*.

Teucrium foliis ovato-lanceolatis sessilibus, floribus sæpius binatis, LINN. *Chamarras*, ou *vrai Scordium*; *Germandrée d'eau* ou *aquatique*.

Teucrium primum, MATTH. **Teucrium secundum**, TABERN. **Teucrium pratense alterum**, NONNULL. *Véronique des prés*; *Germandrée bâtarde*.

Teucrium tertium minus, TABERN. **Teucrium pratense & supinum spurium chamædroïdes**, LOBEL. **Teucrium pratense**, RUDB. *Véronique des bois* ou *des haies*.

Thalictrum, seu **Thalictron**, off. **Thalictrum majus**, siliquâ angulosâ aut striatâ, C. B. & TOURN. **Thalictrum nigrius**, caule & semine striato, J. B. **Thalictrum magnum** DODON. **Thalictrum majus vulgare**, PARK. **Thalictrum secundum**, sive **latifolium germanicum**, CAMER. **Thalictrum pratense elatius**, longioribus & magis attris foliis, & quodammodo splendentibus, CLUSII. **Thalictrum caule folioso**, striato, sulcato, paniculâ multiplici erectâ, LINN. *Thalictron*, ou *Thalictron commun*; *Rue des prés*.

Thapsus barbatus, OFFIC. *Bouillon blanc mâle*; *Molène*; *Bon-homme*.

Thapsus barbatus alter, seu **femina**, OFFIC. *Bouillon blanc femelle*.

THE, vel **Thea**, OFF. *Thé*. **The Sinensum**, sive **Tsia Japonensibus**, BREYN. *Arbrisseau dont les feuilles sont connues sous le nom de thé*.

THEA, LINNÆI. *Arbrisseau dont les feuilles sont connues sous le nom de thé*.

THEÆ frutex, BONTIUS. *Arbrisseau dont les feuilles sont connues sous le nom de thé*.

THEE europæum aut nostras, SIMON. PAULLI. *Myrte du Brabant*; *Myrte bâtard des pays froids*; *Piment royal*; *Galé*.

Thee europæum vulgò, QUORUM. *Véronique mâle*; *Thé de l'Europe*.

Θείον, GRÆCORUM. *Soufre citrin*.

Θείον ἄπυρον, GRÆCOR. *Soufre naturel*.

Θείον πεποιημένον, GRÆCOR. *soufre artificiel*.

THEOBROMA foliis integerimis, LINN. *Caraque*, *arbre qui produit le cacao*.

THERMALES aquæ. *Eaux thermales* ou *chaudes*.

THERMÆ aquisgranenses. *Eaux d'Aix-la-Chapelle*, *dans le cercle de Westphalie*.

Thermæ austriacæ. *Eaux de Bade* ou *Baden*, *dans l'archiduché d'Autriche*.

Thermæ badenses. *Eaux de Bade*, ou *Baden*, *en Suabe*.

Thermæ carolinæ. *Eaux de Carlsbad* (ou *Eaux carolines*) en Bohême.

Thermæ hirschbergenfes. *Eaux de Hirschberg*, en Silésie.

Thermæ mottenfes. *Eaux de la Motte*, en Dauphiné.

Thermæ sextienfes. *Eaux d'Aix*, en Provence.

Thermæ superiores. *Eaux de Bade* ou *Baden*, en Suisse.

Thermæ wisbadenfes. *Eaux de Wisbad*, dans la Wétiéravie.

THEUTRION, QUORUM D. *Polion de montagne à fleurs jaunes.*

THIMHIO, G. CAMELLI. *Seconde espèce de bois d'aloës* ou *d'agallochum*, suivant G. BAUHIN.

THLASPI, off. Thlaspi arvenfe vaccariæ incano folio majus, C. B. Thlaspi vulgatius, J. B. Thlaspi alterum, DOD. Thlaspi vulgatissimum, GERARD. Thlaspi verum cujus semine in theriacâ utimur, CAMER. Thlaspi siliculis subrotundis, foliis sagittatis incanis, LINNÆI. *Thlaspi*, ou *Tharaspic ordinaire*; *Moutarde*, ou *Senévé sauvage*.

Thlaspi allium redolens, MORIS. & TOURN. Thlaspi alliarium olens, NONNULOR. *Thlaspi* ou *Tharaspic à odeur d'ail*.

Thlaspi fatuum, *Bursa pastoris dictum*, RAI. Thlaspi

filiquis verticaliter cordatis, LINNÆI. *Tabouret*; *Bourse*; *Bourslette* ou *Mallette à berger*.

Thlaspi latius, off. & DODON. Thlaspi arvenfe filiquis latis, C. B. & TOURN. Thlaspi *Dioscoridis*, GERARD. & RAI. Thlaspi drabæ folio, PARK. Thlaspi latifolium, FUCHS. Thlaspi filiquis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris, LINN. Thlaspi alterum, TRAGI. Thlaspi secundum foliis & filiquis latis, NONNULOR. *Thlaspi*, ou *Taraspic des champs à larges filiques*.

Thlaspi montanum, vel Lunare majus, QUORUM D. *Grande Lunaire*; *Bulbonach*; *Médaille satinée*; *Satin blanc*; *Passe-satin*.

THRISSE, RONDEL. *Alose*, *poisson*.

THURI. *Arbre des battus*; *Gajati*; *Æschynomene à grande fleur*.

THURIA. *Arbre des battus*; *Gajati*; *Æschynomene à grande fleur*.

THUS, & Thus masculum, OFF. *Oliban* ou *Encens*.

THYMBRA vera, off. Thymbra sancti Juliani, GER. & RAI. Thymbra genuina, PENÆ. Thymbra montana, seu Thymbron, NONNULOR. *Sarriette vivace*, ou *Herbe de S. Julien*.

Thymbra vera, GESN. Thymbra, seu Satureia sativa,

CORDI. *Sarriette ; Sadrée*
ou *Savourée commune &*
annuelle des jardins.

Thymbra hispanica , majo-
ranæ folio , **TOURN.** *Ma-*
rum mastich.

THYMBRON , seu **Thymbra**
montana , **NONNULL.** *Sar-*
riette vivace , ou *Herbe de*
S. Julien.

THYMELÆA lauri folio sem-
per virens , seu *Laureola*
mas , **TOURN.** *Lauréole*
mâle ; Thymélée mâle des
pays froids.

Thymelæa lauri folio deci-
duo , sive *Laureola femina* ,
TOURN. **Thymelæa** folio
deciduo , flore purpureo ,
officinis ; Laureola femina ,
C. B. **Thymelæa** floribus
spicatis , sub foliis ellipti-
cis , modicè acuminatis ,
levibus , mollibus , **HAL-**
LERII. *Lauréole femelle ;*
Bois gentil ; Thymélée fe-
melle des pays froids.

Thymelæa foliis lini , **C. B.**
& **TOURNEF.** **Thymelæa**
monspeliaca , **J. B.** **Thy-**
melæa granis gnidii , **LO-**
BEL. **Thymelæa** tenuifolia
& nigra *Serapioni* , **CHO-**
MEL. *Garou ; Thymélée de*
Montpellier ; Thymélée à
feuilles de lin ; Trentanel ;
Lin sauvage ou bâtard ;
Sain bois par les habitants
de l'Aunis ; Chamélée noire
à feuilles déliées ; Bois d'o-
reilles.

Θυμιαμα απροσδιανον. *Gomme*
ammoniac.

THYMON vulgatum pusillo
folio & flore serpylli rigi-
dior , **NONNULL.** *Thym à*
feuilles étroites ; petit Thym
des jardins.

THYMUM creticum seu ve-
rum , *off.* **Thymum** creti-
cum sive antiquorum , **J. B.**
Thymum cephaloton , **DO-**
DON. **Thymum** creticum
GERARD. **Thymum** legi-
timum capitatum , **PARK.**
Thymum legitimum , **CLU-**
SII. **Thymum** græcum ,
NONNULLORUM. *Thym de*
Crete ou de Candie ; Thym
de Dioscoride ou des An-
ciens.

Thymum latifolium , **GER.**
Serpolet ; Pillolet citronné.

Thymum minus , *off.* **Thy-**
mum vulgare rigidius folio
cinereo , **J. B.** **Thymum**
durius , **GERARD. & RAIL.**
Thymum durius vulgare ,
PARK. **Thymum** vulga-
tissimum , in hortis cul-
tum ; **Thymum** monspe-
liense ; **Thymum** , seu **Thy-**
mon vulgatum pusillum
folio & flore serpylli rigi-
dior ; **Thymum** narbo-
nense seu mediterraneum ,
NONNULL. *Thym à feuilles*
étroites ; petit Thym des
jardins.

THYMUS capitatus qui *Dios-*
coridis , **C. B.** **Thymus** ve-
rus capitatus sive creticus ,
CAMER. **Thymus** cepha-
lotos creticus , **NONNUL-**
LORUM. *Thym de Crete*
ou de Candie ; Thym de

*Dioscoride , ou des An-
ciens.*

Thymus floribus capitatis ,
caulibus repentibus , foliis
planis obtusis basi ciliatis ,
LINN. *Petit Serpolet ; Pil-
lolet ; Thym sauvage ordi-
naire.*

Thymus vulgaris folio tenuio-
re , C. B. & TOURNEF.

Thymus nostras , CORDI.

Thymus erectus foliis ova-
tis margine reflexis , flori-
bus verticillato-spicatis ,
LINNÆI. *Thym à feuilles
étroites ; petit Thym des
jardins.*

THYSSELINUM , off. Thyffe-
linum palustre , TOURN.
*Perfil des marais ou sau-
vage ; Encens d'eau.*

TIBURONUS , RECENTIOR.
*Requin ; Requien ; Re-
quiem ; grand Chien de
mer ou marin ; Poisson à
deux cents dents ; Lamie ,
ou Poisson anthropophage ;
Tiburon.*

TILIA , off. Tilia femina fo-
lio majore , C. B. & TOUR-
NEF. Tilia vulgaris pla-
typhyllos , J. B. Tilia fe-
mina major , PARK. Tilia
major seu latifolia , QUO-
RUMD. Tilia foliis amplio-
ribus , mollibus , subhir-
sutis , HALL. *Tilleul , an-
ciennement Tillau ou Tillot.*

TINCA , off. & OMNIUM ferè
AUCTORUM. *Tanche ou
Tenche , poisson.*

TINCTORIUS flos , J. B. Ge-
nêt d'Allemagne.

TINCTURA. *Teinture.*

TIPHA cerealis , & *Tipha
Theophrasti*, PORT. *Seigle
ou Segle.*

TITHYMALI myrsinitis specie,
arbuscula æthiopica , folio
penè elato , basi in acu-
tissimum mucronem subito
desinente , capitulis origa-
ni , PLUCK. Tithymali
myrsinitis specie, arbuscula
æthiopica , subrotundis fo-
liis , è stœchadis arabicæ
squamato capitulo duro
lacrymam fundens , ejus-
dem PLUCK. *Arbrisseau
d'où découle la sarcocolle.*

TITHYMALO cyparissia simili-
lis , Pityusa multis , J. B.
*Tithymale à feuilles de pin ;
grande Esule.*

Tithymalo maritimo affinis
linariæ folio , C. B. *Petit
Tithymale à feuilles d'a-
mandier.*

TITHYMALUS amygdaloïdes ,
off. Tithymalus amygda-
loïdes angustifolius , TA-
BERN. & TOURNEF. Ti-
thymalus linifolius parali-
congener , PARK. Tithy-
malus linariæ affinis , Esula
minor altera , NONNULL.
*Petit Tithymale à feuilles
d'amandier.*

TITHYMALUS cyparissias ,
C. B. Tithymalus cupres-
sinus sive humipinus , LO-
BEL. *Tithymale à feuilles
de cyprès ; Esule ; petite
Esule.*

Tithymalus flore exiguo
viridi , apicibus flavis ,

- antequam folia emittit ,
floreus , GRONOV. *Plante*
dont la racine est l'ipéca-
cuanha brun.
- Tithymalus foliis pini , fortè
Dioscoridis Pityusa , C. B.
- Tithymalus pinea , LOBEL.
- Tithymalus pineus , GER.
Tithymale à feuilles de
pin ; grande Esule.
- Tithymalus latifolius , Cata-
putia dictus , TOURNEF.
Tithymale à larges feuilles ;
Epurge ; Catapuce ordi-
naire.
- Tithymalus mauritanicus ,
aphyllos , angulosus , spi-
nosus , ex quo Euphorbium ,
off. HERMAN. *Plante qui*
produit la gomme résine
nommée euphorbe.
- Tithymalus palustris fruti-
cosus , C. B. & TOURNEF.
- Tithymalus magnus multi-
caulis , sive Esula major ,
J. B.
- Tithymalus fruti-
cosus germanicus , CAMER.
- Tithymalus altissimus læ-
vis , foliis sub floribus ter-
nis , cordatis , fructu ver-
rucoso , HALLER.
- Tithy-
malus celandicus , RUDB.
- Tithymale des marais ;*
grande Esule ; Turbith noir
ou bâtard.
- TLAHUELILOCA quahuitl ,
(c. à d. *Arbre de la folie*)
HERNAND. *On en tire par*
incision la gomme de cara-
gne.
- TLAQUILIN , HERN. *Belle*
de nuit.
- TLILXOCHITL , seu Flos ni-
ger Mexicanis dictus , sive

- Aracus aromaticus , HER-
NAND. *Plante dont le fruit*
est la vanille.
- TODDA panna , seu Monta
panna , RHEED. *Arbre*
d'où l'on croit que se tire le
sagou.
- TOLUIFERA , LINN. *L'arbre*
d'où se tire par incision le
baume de Tolu.
- TONICA medicamenta. Re-
medes toniques.
- TOPHUS bovinus. *Balle ou*
Concrétion assez solide qui
se trouve dans l'estomac ou
les intestins du bœuf.
- Tophus calcareus cylindricus
perforatus , LINN. *Ostéo-*
colle.
- Tophus ovinus norwagicus.
Balle assez solide qu'on
trouve dans l'estomac des
brebis.
- TOPICA medicamenta. Re-
medes topiques.
- TORDYLIUM narbonense mi-
nus , TOURN. *Tordylum* ,
sive Seseli creticum , PARK.
Tordylum involucris par-
tialibus longitudine petal-
orum foliolis ovatis laci-
niatis , LINNÆI. *Séséli de*
Candie.
- TORMENTILLA , off. *Tormen-*
tilla sylvestris , C. B. *Tor-*
mentilla vulgaris , PARK.
Tormentille.
- TORNABONA quæ à Torna-
bonio missa , CÆSALPIN.
Tabac mâle ou vrai ; Ni-
cotiane à larges feuilles.
- TORNABONÆ congener , CÆ-
SALP. *Tabac femelle ; faux*
Tabac ; Tabac du Mexique ;

Nicotiane à feuilles rondes ; petite Nicotiane.

TOTA-BONA, off. Orvale ;
Toute-bonne.

Tota-bona, OFFICIN. Bon-Henri.

TOTA-SANA, QUORUMDAM.
Toute-saine.

Τὸρπιθ, GRÆCOR. *Turbith.*

TOXICODENDRON foliis alatis, fructu rhomboïde, DILLEN. Toxicodendron carolinianum foliis pinnatis, floribus minimis herbaceis, MILLER. *Arbre dont le suc est le vernis de la Chine.*

TRACHELIUM, off. Trachelium majus flore purpureo, PARK. *Gantelée, ou Gants de Notre-Dame ; Campanule à feuille d'ortie ; Ortie bleue.*

TRAGACANTHA (gummi.)
Gomme adragant.

Tragacantha, C. B. Tragacantha vera, PARK. Tragacantha, sive Spina hirci, GER. *Barbe-renard ; ou Epine de bouc ; c'est l'arbre qui produit la gomme adragant.*

TRAGIUM *Dioscoridis*, COLUMN. *Petite Saxifrage ; petite Pimprenelle saxifrage ; petite Bouquetine, ou Boucage ; petit Persil de bouc.*

Tragium, sive Tragon secundum, QUORUMDAM. *Soude épineuse ; Salicote épineuse ; Marie épineuse.*

TRAGON *Matthioli*, vel potius *Tragus improbus*

Matthioli, GERARD. Tragon secundum, sive Tragium, NONNULL. *Soude épineuse ; Salicote épineuse ; Marie épineuse.*

TRAGOPOGON hispanicus, sive Escorçonera aut Scorzonera, J. B. Tragopogon peregrinus vel hispanicus, GESNER. *Scorsonere ; Cercifis, ou Sersifis noir ou d'Espagne.*

Tragopogon hortense, off. Tragopogon cæruleo-purpureum porri folio quod *arisi* vulgò, C. B. & TOURNEF. Tragopogon flore purpureo, J. B. *Sercifis ; Cercifis ; Salsifis ; Sarsifis blanc commun des jardins ou d'Italie.*

Tragopogon pratense, offic. Tragopogon pratense luteum majus, C. B. Tragopogon flore luteo, GESN. Tragopogon calycibus corollam æquantibus, foliis integris acuminatis, LINNÆI. *Sercifis sauvage ou des prés ; Barbe de bouc.*

TRAGORIGANUM latifolium, C. B. *Marum vrai.*

TRAGOSELINUM majus, Pimpinella major, TABERN. Tragoselinum majus umbellâ candidâ, TOURNEF. *Grande Saxifrage ; Pimprenelle blanche ; grande Pimprenelle-saxifrage ; grande Bouquetine ; Boucage ; grand Persil de bouc.*

Tragoselinum minus, TOURNEF. Tragoselinum minus, Pimpinella minor,

TABERN. *Petite Saxifrage; petite Pimprenelle-saxifrage; petite Bouquetine ou Boucage; petit Persil de bouc.*

TRAGUS dorcas, Rubicapra, caprea, KLEIN. *Chevre des Alpes*, nommée ordinairement *Chamois* ou *Ysard*.

Tragus spinosus Matthioli, sive Kali spinosum, J. B.

Tragus improbus Matthioli, vel Tragon, GER.

Soude épineuse; Salicote épineuse; Marie épineuse.

TRAPA petiolis foliorum nantium ventricosus, LINN.

Tribule aquatique; Macre ou Macle; Cornouelle, Cornuelle, Corniole ou Corniche; Châtaigne d'eau ou Châtaigne cornue; Truffe d'eau; Saligot ou Echarbot.

Τραυματικά φάρμακα. *Remedes vulnéraires.*

TRAUMATICA medicamenta. *Remedes vulnéraires.*

TREE, INDORUM. *Lacque ou Laque.*

TREMELLA cyathiformis, labio altero inflexo repanso, LINN. *Oreille de Judas.*

Tremella plicata undulata, LINN. *Mousse membraneuse; Noctoch des Allemands.*

TRIBULOIDES vulgare aquis innascens, TOURN. *Tribule aquatique; Macre ou Macle; Cornouelle, Cornuelle, Corniole ou Corniche; Châtaigne d'eau ou Châtaigne cornue; Truffe d'eau; Saligot ou Echarbot.*

TRIBULUS aquaticus, offic.

Tribulus aquatilis, DOD.

Tribulus lacustris, CORDI.

Tribulus aquaticus major,

PARK. Tribulus marinus,

NONNULL. *Tribule aqua-*

tique; Macre ou Macle;

Cornouelle, Cornuelle, Cor-

nirole ou Corniche; Châtai-

gne d'eau, ou Châtaigne

cornue; Truffe d'eau; Sa-

ligot ou Echarbot.

Tribulus terrestris, off. Tri-

bulus terrestris ciceris fo-

lio, fructu aculeato, C. B.

Tribulus terrestris, J. B.

Tribulus terrestris ciceris

folio, seminum integu-

mento aculeato, MORIS.

& TOURN. Tribulus acu-

leatus vulgatiore, NONNUL-

LOR. *Tribule commun ou*

terrestre; Herse; Croix de

Malte ou de Chevalier; Sa-

ligot terrestre.

TRICHECUS, seu Trichich-

thus. *Lamantin ou La-*

mentin; Manaté ou Ma-

nati; Bœuf marin; Vache

marine.

TRICHOMANES, off. *Capil-*

laire rouge, ou Polytric.

TRIFOLIUM, sive Loti species,

CORDI. *Mélilot, ancien-*

nement Mirlitot.

TRIFOLIUM, off. Trifolium

pratense purpureum, C. B.

Trifolium purpureum vul-

gare, J. B. Trifolium pra-

tense purpureum vulgare,

PARK. Trifolium majus,

BRUNSE. Trifolium pra-

tense capitulis florum pur-

pureis, GESN. Trifolium

spicis villosis, foliis insidentibus, vaginarum caudis capillaribus, HALLER. Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis, LINN. *Trefle vulgaire ou commun des prés.*

Trifolium acetosum, off. Trifolium acidum flore albo, seu Oxys, TOURN. Trifolium acetosum vulgare, flore lacteo, C. B. *Pain à coucou; Alleluia.*

Trifolium arvense humile spicatum, vel Lagopus, C. B. Trifolium spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus, LINN. *Petit Trefle des champs; Pied de lievre.*

Trifolium bituminosum, off. Trifolium bitumen redolens, C. B. & TOURN. Trifolium asphaltites, sive bituminosum odoratum & non odoratum, J. B. Trifolium asphaltitium monachorum; Trifolium acutum sive odoratum, NON-NULL. Trifolium asphalticum, seu foetidum, NON-NULL. *Trefle odorant ou bitumineux.*

Trifolium corniculatum, off. Trifolium corniculatum primum, DODON. Trifolium filiquosum minus, GERARD. *Petit Lotier, ou Trefle sauvage jaune.*

Trifolium fragiferum, TABERN. *Fraisier.*

Trifolium hæmorrhoidale, off.

Trifolium album rectum

hirsutum valdè, J. B. Trifolium filiquosum, villosum vel incanum, NON-NULLOR. *Trefle hæmorrhoidal, ou Lotier hæmorrhoidal.*

Trifolium hepaticum flore simplici cæruleo, J. B. Trifolium hepaticum, sive Trinitatis Herba flore cæruleo, J. B. Trifolium magnum, sive aureum, quod nobilis Hepatica, TRAGI. *Hépatique des fleuristes, ou belle Hépatique.*

Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris, flore lacteo, J. B. Trifolium caballinum, CAMER. & ITALORUM. Trifolium floribus racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto, LINN. *Mélilot, anciennement Mirlirot.*

Trifolium odoratum alterum, sive Lotus sativa, DODON. *Lotier odorant; Trefle musqué; faux Baume du Pérou.*

Trifolium palustre, C. B. Trifolium majus, TABERN. Trifolium aquaticum sive paludosum, off. PARK. Trifolium fibrinum Germanorum, RAII. *Ménianthe; Trefle d'eau ou aquatique; Trefle de castor.*

TRIGESIMI sexti generis perniciosorum fungorum species tertia, CLUSII. *Autre espece de vessie de loup.*

TRIGONELLA leguminibus sessilibus strictis, erectiusculis, acuminatis, LINN. *Fenugrec.*

TRINGA,

TRINGA, cristâ dependente, pectore nigro, LINN. *Vanneau*.

TRINITAS herbariorum, NONNULLOR. *Trefle des champs ; Pied de lievre.*

TRINITATIS herba flore cæruleo, seu *Trifolium hepaticum*, J. B. *Hépatique des fleuristes*, ou belle *Hépatique*.

TRITICUM, off. *Triticum hibernum aristis carens*, C. B. & **TOURN.** *Triticum vulgare glumas trititando deponens*, J. B. *Triticum spicâ muticâ*, GERARD. & **PARK. & RAIL.** *Froment ; Blé franc ou mutet.*

Triticum indicum, J. B. *Maïs ; Blé de Turquie.*

Triticum radice repente, foliis viridibus, LINN. *Chien-dent ordinaire.*

TROCHILUS, rex avium, senator & regulus, BELON. *Passereau troglodyte*, ou *Roitelet.*

TROCHISCI. *Trochisques.*

TROPÆOLUM foliis subquinquelobis, petalis obtusis, LINN. *Grande Capucine ; grand Cresson des Indes* ou *du Pérou.*

TRUTTA, off. *Trutta fluvialis*, RONDEL. *Truta, vel Trutta vulgò*, Torina & **Torio, SCH.** *Truite ordinaire* ou *des rivières.*

TSHINKA, PISON. *Arbre qui porte les clous de girofle.*

TSIA Japonensibus, sive *The Sinensium*, BREYN. *Arbrisseau dont les feuilles sont*
Tome VIII.

connues sous le nom de thé.

TSIAM-PANGAM, RHEED. *Arbre qui donne le bois de Campêche ou de Fernambouc.*

TSIANA kua, RHEED. *Plante dont la racine est le costus.*

TUBAC, NONNULL. *Tabac de Virginie ; Pétun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.*

TUBACKA, NONNULL. *Tabac de Virginie ; Pétun des Amazones ; Nicotiane à feuilles étroites.*

TUBER, DIOSC. & **MATTH.** *Tuber brumale pulpâ obscurâ odoratâ*, MICHEL. *Truffe d'hiver.*

TUBERA cervina, OFFICIN. *Truffes de cerf.*

TUBERUM genus quibusdam, cervi boletus, J. B. *Truffe de cerf.*

TUBULUS dentalis lævis, RONDELET. *Dentale*, ou *Dent de chien.*

TUBULUS marinus, RONDELET. *Antale.*

Tubulus marinus. *Dentale*, ou *Dent de chien.*

TUNA, AMERICANORUM. *Plante sur laquelle s'élèvent les cochenilles ; elle se nomme aussi Opuntia*, Figuier d'Inde, Raquette, Cardasse.

TUNICA, off. *Gillet.*

TURBEDH, ARABUM. *Turbith.*

TURBITH, off. *Turbith.*

Turbith nigrum & adulterinum, QUORUM DAM.

*Tithymale des marais ;
grande Esule ; Turbith noir
ou bâtard.*

TURDUS , off. Turdus visci-
vorus minor , BELON. &
WILLUGB. Turdus alis sub-
tus ferrugineis , lineâ suprâ
oculos albicante , LINN.
*Grive de vigne commune ;
petite Grive de gui ; Mauvis.*
Turdus ater , rostro palpe-
brisque fulvis , LINNÆI.
Merle ordinaire ou commun.

TURPETHUM , off. *Turbith.*
Turpethum repens , foliis al-
thææ , vel indicum , C. B.
*Plante dont la racine est le
turbith.*

TUSSILAGO , off. Tussilago
vulgaris , C. B. & TOURN.


Tussilago vulgò , Farfara
aliis , Ungula caballina ,
CÆSALP. Tussilago scapo
imbricato unifloro , foliis
subcordatis angulatis den-
ticulatis , LINNÆI. *Tussi-
lage ; Pas d'âne.*

Tussilago scapo imbricato
thyrsifero , flosculis omni-
bus hermaphroditis , LINN.
*Pétasite ; Herbe aux tei-
gneux ou à la teigne ; grand
Pas d'âne.*

TUTIA vulgaris , OFFIC. *Tu-
tie.*

TYPHA aromatica clavâ ru-
gosâ , H. O. *Le vrai Aco-
rus.*

TYRANNUS aquarum. *Bro-
chet , poisson.*



U R S

ULMARIA, off. Ulmaria vulgaris, PARK. Ulmaria vulgi, LOBEL. Reine des prés ; petite Barbe de chevre ; Vignette.

ULMUS, off. Ulmus campestris, & Theophr. C. B. Ulmus vulgarissimus foliolato scabro, GERARD. Ulmus vulgaris cum samaris, seu seminibus suis, PARK. Ulmus in planis proveniens, ANGUILL. Ulmus (fructu membranaceo) foliis inæqualiter ferratis, LINN. Orme ; Ormeau ; Ormille ; Arbre au pauvre homme.

ULULA flammeata, QUORUMD. Fresnaie ; Effraie ou Orfraie ; Hibou des clochers ; petit Chat-huant plombé ; Chouart ; Lucheran.

UMBILICUS marinus, OFF. Nombril marin ; Ombril marin ; Nombril ou Feve de mer ; Limaçon de mer. Umbilicus terræ, & Cyclaminus terræ, TRAGI. Pain de pourreau.

UMBILICUS Veneris, OFFIC. Nombril de Vénus ; grand Cotylédon ; Escudes, ou Ecuellles communes.

UMBILICUS Veneris alter, OFF. Nombril de Vénus à fleurs jaunes ; Cotylédon à fleurs jaunes.

UNEDO, sive Arbutus, OFF. Arbousier ; Fraiset en arbre.

UNGUENTUM. Onguent.

UNGULA asiniana, & Lactuca ustularia, Germanorum, CORDI. Tussilage ; Pas d'âne.

Ungula caballina, BRUNSE. Ungula caballina ; Tussilage vulgò, aliis Farfara, CÆSALP. Tussilage ; Pas d'âne.

UNICORNU fossile, seu Ebur fossile, OFFICINARUM GERMANIÆ. Unicorne fossile.

UNIO vulgò. Perle.

Υποκίστες, id est suis Faba, (aliis Διοσκύρεος, id est Jovis Faba) DIOSCOR. Jusquiame noire ; Hannebane.

Υποκίστες, DIOSC. Hypociste, suc desséché & noir.

UPUPA, off. Huppe ; Pupa ; Puiput ; Puepue.

URCEOLARIS, sive Perdicium, Helxine, CÆSALP. Pariétaire ; Paritoire ; Vitriole ; Cassé-pierre ; Percemuraille.

URENTIA medicamenta. Remedes caustiques.

URSI vel Ursæ arbor, NONNULL. Sureau commun, ou grand Sureau.

URSUS, officin. Ursus caudâ abruptâ, LINN. Ursus niger, caudâ unicolore, BRISSON. Ours.

E e ij

URTICA iners, & Urtica mortua, *off.* Urtica iners, floribus albis, *sive* Galeopsis, J. B. Urtica iners, *sive* Lamium primum, DODONÆI. *Ortie morte non puante ; Ortie blanche ; Ortie qui ne pique point.*

Urtica iners, flore luteo, *off.* J. B. Urtica iners tertia, *sive* Lamium luteo flore, DODON. *Ortie morte à fleurs jaunes.*

Urtica iners flore purpureo, *off.* Urtica iners, *sive* Galeopsis, flore purpurascence majore, folio non maculato, J. B. *Ortie morte non puante à fleurs purpurines.*

Urtica iners folio & flore minore, *sive* Galeopsis, J. B. Urtica iners altera, DOD. *Ortie morte puante.*

Urtica iners magna foetidissima, J. B. Urtica herculea, TABERN. *Grande Ortie puante.*

Urtica major, *officin.* Urtica urens maxima, C. B. Urtica vulgaris major, J. B. Urtica urens altera, DOD. Urtica major *sive* sylvestris asperior, TABERN. Urtica urens maxima sterilis vel fertilis, PONTHEDE. Urtica foliis cordatis, amentis cylindraceis, sexu distincta, LINN. Urtica clivica, foliis oblongo-cordatis, LINNÆI. *Ortie vulgaire ou commune ; Ortie vivace ; grande Ortie piquante.*

Urtica romana, *off.* Urtica urens pilulas ferens, prima *Dioscoridis*, semine lini, C. B. Urtica romana *sive* mas cum globulis, J. B. Urtica urens prior, DODON. Urtica foliis oppositis, amentis fructiferis, globosis, androgyna, LINNÆI. *Ortie romaine ; Ortie grecque ; Ortie mâle.*

Urtica urens minor, C. B. Urtica minor annua, J. B. Urtica urens minima, DODON. Urtica minor urens, foliis eleganter variegatis, caule intorto rubente, RUDB. *Ortie grièche ; petite Ortie.*

URTICOIDES urens, PONTHEDE. *Ortie grièche ; petite Ortie.*

URUCU, PISON. & MARCG. *Achiote ; Urucu ; Roucou.* USNEA humana, *OFF.* *Mousse de crâne humain ; Usnée humaine.*

Usnea plantarum, PARACELSITARUM. *Mousse membraneuse ; Nostoch des Allemands.*

UVA anguina, *OFF.* *Bryone, ou Vigne blanche à baies rouges, ou Couleuvrée.*

Uva crispa fructu cerasi magnitudine, GESN. *Groseilleur blanc épineux cultivé.*

Uva felium, QUORUMD. *Joubarbe âcre ; Vermiculaire âcre ou brûlante ; Pain d'oiseau ; Poivre des murailles.*

Uva judaïca, QUORUMD. *Joubarbe âcre ; Vermiculaire*

âcre ou brûlante; Pain d'oiseau; Poivre des murailles.

Uva lupina, seu vulpina, NONNULL. Morelle commune à fruit noir.

Uva serpentina, OFF. Bryonne, ou Vigne blanche à baies rouges, ou Couleuvrée.

Uva spina, MATH. Uva crispa, sive Grossularia, J. B. Groseiller blanc épineux.

Uva ursi, QUORUMD. Epinevinette.

Uva ursi, vel ursina, seu vulpina. Airelle; Myrtille; Raisin de bois; Bluets; Morets; Mûres de ronce.

Uva ursi, CLUSII, & TOURN. & GALENI. Vigne d'ours, ou Boufferole.

Uva versa; Uva lupina; Uva vulpina, Germanorum, solanum tetraphyllum, LOBEL. Raisin de renard; Herbe à Paris.

UVÆ passæ maximæ, seu passulæ damascenæ, OFF. Raisins de Damas.

UVÆ passæ minimæ, OFFIC. Raisins de Corinthe.

UVÆ passæ minores seu vulgares, OFF. Raisins passés, ou Passerilles; Raisins de Provence.

UVULARIA, QUORUMDAM. Laurier alexandrin ou d'Alexandrie.

UVULARIA major, TRAGI. Gantelée, ou Gants de Notre-Dame; Campanule à fleur d'ortie; Ortie bleue.



V A L

VACCA. *La vache, femelle du taureau.*

VACCINIA nigra vulgaris, PARK. *Vaccinia nigra*, DODON. *Vaccinia nigra majora*, FRANK. *Airelle*; *Myrtille*; *Raisin de bois*; *Bluets*; *Morets*; *Mûres de ronces.*

Vaccinia palustris, DODON. *Canneberge*; *Cousines*; *Coussinettes*; *Coussinets des marais.*

Vaccinia urfi, GER. *Vigne d'ours*, ou *Bousserole.*

VACCINIUM caule angulato, foliis ovatis serratis deciduis, LINN. *Vaccinium foliis obversè ovatis perennantibus*, LINN. *Airelle*; *Myrtille*; *Raisin de bois*; *Bluets*; *Morets*; *Mûres de ronces.*

Vaccinium ramis filiformibus, repentibus, foliis ovatis perennantibus, LINN. *Canneberge*; *Cousines*; *Coussinettes*; *Coussinets des marais.*

VA-EMBU, H. M. *Acorus des Indes* ou *d'Asie*; *Glaïeul aromatique d'Asie.*

VALERIANA alpina minor, C. B. *Plante qui donne le nard de montagne.*

Valeriana campestris, inodora major, C. B. *Valeriana caule dichotomo*, foliis lanceolatis integris, fructu simplici, LINNÆI.

Mâche; *Blanchette*; *Poule grasse*; *Clairette*; *Doucette*; *Accroupie*; *Salade de chanoine.*

Valeriana celtica, TOURN. *Valeriana floribus triandris*, foliis ovato-oblongis, obtusis, integerrimis, LINN. *Valeriana foliis ovatis*, obtusis, minimè dentatis, HALL. *Autre plante qui donne le nard celtique.*

Valeriana hortenensis, off. *Valeriana hortenensis*, Phu folio olusatris *Dioscoridis*, C. B. & TOURN. *Valeriana major odoratâ radice*, J. B. *Valeriana major*, sive Phu majus, PARK. *Valeriana vera*, seu *Nardus agrestis*, TRAGI. *Valeriana pontica*, TABERN. *Valeriana floribus triandris*, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, LINN. *Valériane des jardins*; *Valériane franche*; *grande Valériane.*

Valeriana maxima pyrenaïca cacaliæ folio, D. FAGON. *Plante qui donne le nard de montagne.*

Valeriana palustris, off. *Valeriana palustris minor*, C. B. & TOURN. *Valeriana minor pratensis vel aquatica*, J. B. *Valeriana minima*, DODON. *Valeriana sylvestris minor*, PARK. *Valeriana foliis caulinis pinnatis sexu distincta*,

- LINN. *Valériane des prés ou des marais ; petite Valériane aquatique.*
- Valeriana sylvestris, off. Valeriana sylvestris major, C. B. & TOURN. Valeriana sylvestris magna aquatica, J. B. Valeriana sylvestris, DODON. Valeriana vulgaris, TRAGI. Valeriana foliis omnibus pinnatis, LINNÆI. *Valériane sauvage ou des bois ; Valériane commune ; petite Valériane.*
- VALERIANELLA arvensis præcox humilis, semine compresso, MORIS. *Mâche ; Blanchette ; Poule grasse ; Clairette ; Doucette ; Accroupie ; Salade de chanoine.*
- VALLENCES aquæ. *Eaux de Vals, dans le bas Vivarais.*
- VALLETRIENSES aquæ. *Eaux de Bareges, dans le comté de Bigorre.*
- VANELLUS, off. Vanellus, seu Capella, ALDROV. & JONST. & WILLUGGB. *Vanneau, oiseau.*
- VANIGLIA. *Vanille.*
- VANILLA. *Vanille.*
- Vanilla flore viridi & albo, fructu nigrescente, PLUMM. *Plante dont le fruit est la vanille.*
- VANILLAS piperis arbori jamaicensis innascens, PLUCK. *Plante dont le fruit est la vanille.*
- VARIOLA, & Vario, & Variolus, NONULL. *Truite ordinaire ou des rivières.*
- VAZABU. *Acorus des Indes ou d'Asie ; Glaïeul aromatique d'Asie.*
- VAZUMBO. *Acorus des Indes ou d'Asie ; Glaïeul aromatique d'Asie.*
- VEELGUTTA, sive Oreoselinum, DODON. *Petit Persil sauvage ou de montagne.*
- VEGETABILE regnum. *Regne végétal.*
- VENENUM. *Poison.*
- VENERIS labrum, MATTH. *Chardon à bonnetier ou à foulon.*
- VENUS, CHYMICOR. *Cuivre ; Airain.*
- VERATRUM flore atro-rubente, TOURNEF. *Ellébore blanc à fleur noire.*
- Veratrum flore subviridi, TOURN. Veratrum caule ramoso, LINN. *Ellébore blanc à fleurs vertes.*
- Veratrum nigrum Dioscoridis, DODON. Veratrum nigrum, seu Atrantia nigra, GERARD. *Sanicle femelle ou de montagne.*
- Veratrum nigrum secundum, DODON. *Ellébore noire à fleur verte.*
- Veratrum nigrum tertium, DODON. *Ellébore noir commun ; Pied de griffon ; Pomme-lée, ou Herbe du cru.*
- VERBASCULUM, QUORUMD. *Velvete ; Véronique femelle.*
- Verbasculum pratense odoratum, C. B. *Primevere ; Primerole ; Fleurs de coucou ; Braies de cocu ; Herbe à la paralysie.*

VERBASCUM femina flore luteo magno, C. B. Verbasum maximum luteum Meridionalium, odoratum, J. B. Verbasum maximum album femina, flore subpallido, LOBEL. *Bouillon blanc femelle.*

Verbasum leptophyllum, CORD. *Herbe aux mites.*

Verbasum mas latifolium luteum, C. B. Verbasum mas & Candela regia, LOBELII. Verbasum foliis utrinque tomentosis decurrentibus, LINNÆI. Verbasum foliis ovato-acutis tomentosis, floribus in spicâ densissimâ sessilibus, HALLER. *Bouillon blanc mâle; Molène; Bon-homme.*

VERBENA, off. Verbena communis flore cæruleo, C. B. & TOURN. Verbena vulgaris, J. B. Verbena communis, sive sacra procerior recta, LOBEL. Verbena tetrandra spicis filiformibus, foliis multifidolaciniatis, LINN. Verbena foliis laciniatis, superioribus tripartitis, spicis angustis longissimis, HALL. *Verveine.*

Verbena femina, BRUNSF. *Senecion ou Senesson.*

Verbena femina, & Sinapi septimum, TRAGI. *Tortelle ou Vêlar.*

VERBENACA recta, DODON. Verbenaca recta, & Verbenaca mas, TABERN. Verbenaca recta, sive Peristemon *Dioscor.* & Verbenaca

mas *Plinii*, HOFF. *Veraine.*

Verbenaca supina femina, seu Hierobotane, sive Herba sacra, DODON. *Véronique des prés*, ou *Germandrée bâtarde.*

VERBENÆ, aut Scorodonix affinis anomala, flore albo, calyce aspero, allii odore, SLOANE. *Chamaras*, ou *faux Scordium*; *Sauge des bois* ou *sauvage.*

VERBESINA, off. Verbesina, seu Cannabina aquatica flore minùs pulchro, elatior & magis frequens, J. B. *Chanvre aquatique*, ou *Eupatoire femelle bâtarde.*

Verbesina foliis oppositis lanceolato-ovatis, petiolatis, ferratis, pedunculis unifloris, dichotomix caulis, LINN. *Acnelle.*

VERMES terrestres majores, MERRIAN. *Vers de terre*; *Lombrics.*

VERMICULARIS crassula minor, off. & Illecebra major, LOBEL. *Petite Joubarbe*; *Trique-madame*, ou *Tripe-madame.*

VERMIFUGA medicamenta. *Remedes vermifuges.*

VERMIS, seu Vermiculus maialis *Germanorum*, NONNULL. *Scarabée onctueux*; *Proscarabée*; *Escarbot onctueux.*

Vermis indus, sive indicus, QUORUMD. *Ver à soie*, ou *Chenille filant la soie.*

Vermis lanificus, vel serificus, QUORUMDAM. *Ver*

- à soie, ou *Chenille filant la soie*.
- Vermis terrestres, OFF. *Ver de terre*; *Lombric*; *Achée* ou *Aschée*; *Lesche*.
- VERNIX, off. *Sandaraque des Arabes*; *Gomme* ou *Résine de genévrier*; *Ver-nis*.
- VERONICA aquatica major, folio subrotundo, MORIS. Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente, LINN. Veronica aquatica foliis ovatis, ex alis ramosa, HALLER. *Grand Beccabunga*.
- Veronica aquatica minor, folio subrotundo, C. B. *Petit Beccabunga*.
- Veronica femina, officin. & FUSCH. *Velvete*; *Véronique femelle*.
- Veronica mas, off. Veronica mas supina & vulgatissima, C. B. & TOURN. Veronica vulgatiore folio rotundiore, J. B. Veronica mas serpens, DODON. Veronica vera & major, GERARD. Veronica mas vulgaris supina, PARK. Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente, LINN. *Véronique mâle*; *Thé de l'Europe*.
- Veronica pratensis, off. Veronica spuria, facie teucrii pratensis, LOBEL. Veronica floribus racemosis decussatis, foliis oblongo-sagittatis dentatis, GUETT. *Véronique des prés*, ou *Germandrée bâtarde*.
- Veronica rotundifolia, officin. Veronica minor, foliis imis rotundioribus, MOR. Veronica floribus racemosis lateralibus, foliis ovatis plicatis dentatis, LINNÆI. *Véronique des bois* ou *des haies*.
- Veronica spicata, off. Veronica spicata minor, C. B. Veronica spicata recta major & minor, J. B. Veronica asurgens sive spicata, GERARD. Veronica erecta angustifolia, PARK. Veronica recta minima, CLUSII. Veronica foliis obtusis, caule non ramoso spicâ nudâ terminato, HALLER. Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule erecto, LINN. Veronica spicata angustifolia; Veronica minor erecta, NONNULL. *Véronique à épi*.
- VERRUCARIA, off. Verrucaria scorpioides, LOBEL. *Herbe aux verrues*; *Héliotrope*.
- VERVONENSES aquæ. *Eaux de Bourbonne, en Champagne*.
- VESICANTIA. *Vessicatoires*.
- VESICARIA, CORDI. *Alkenge*; *Coqueret*; *Coquerelle*.
- VESICATORIUM. *Vessicatoire*.
- VESULLENSES aquæ. *Eaux de Vésoul, en Franche-Comté*.
- VIBA & Tacomuree, PISON. *Roseau d'où l'on tire le sucre*.

VIBURNUM, off. Viburnum vulgò, C. B. Viburnum, MATTH. & TOURNEF. & PARK. & RAIL. Viburnum foliis cordatis acutè crenatis, venosis subtùs tomentosis, LINN. *Viorne*; *Hardeau*; *Bourdene* ou *Bourdaine*.

VICI-COMITIS aquæ. *Eaux de Vic-le-Comte*, dans la basse Auvergne.

VICIA, off. Vicia sativa vulgaris semine nigro, C. B. & TOURN. Vicia vulgaris sativa, J. B. & CLUSII. Vicia major prima, & Orobus sativus, TRAGI. Vicia major, FUCHS. Vicia nigra, NONNULLOR. *Vesce noire* ou *commune*.

Vicia alba, off. Vicia sativa alba, C. B. & TOURN. Vicia albo semine, J. B. Vicia major folio cordato, flore rubro, fructu albo, pisi minoris instar, MOR. Vicia siliquis sessilibus erectis, foliis cordatis, HAL-
LER. Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyl-
lis, foliolis acumine emar-
ginatis, stipulis denta-
tis, LINNÆI. *Vesce blan-
che*.

Vicia caule erecto, petiolis cirrho destitutis, LINNÆI. *Fève de marais*.

VICIENSES aquæ. *Eaux de Vichi*, dans le Bourbon-
nois.

VICTORIALIS longa, CLUS. *Ail serpentin*; *Ail victo-
rial*; *faux Nard*.

VICTORIOLA, QUORUMD. *Laurier alexandrin* ou d'*Alexandrie*.

VICTUS ratio, diæta. *Diete*.

VIDIMARAM, H. M. *Arbre qui produit les sébestes*.

VINACEA. Semences de gre-
nade.

VINCA pervinca minor, GE-
RARD. *Pervenche commune*
à feuilles étroites; petite
Pervenche; petit *Pucelage*;
Violette des forciers.

VINCETOXICUM multis, flo-
ribus albicantibus, J. B. *Vincetoxicum*, DODON. *Dompte-venin*.

VINEA, mater vini seu nec-
taris, QUORUMD. *Vigne*
cultivée.

VIOLA, officin. Viola martia
purpurea, flore simplici
odoro, C. B. Viola martia
purpurea, J. B. Viola ni-
gra sive purpurea, DO-
DON. Viola simplex mar-
tia, PARK. Viola sativa,
BRUNSE. Viola martia præ-
cox purpurea, LOBELII.
Viola simpliciter dicta, vel
nigra cognominata, GESN.
Viola purpurea, MATTH.
Viola acaulis stolonibus
teretibus reptantibus, pe-
dunculis radicalibus, LIN-
NÆI. *Violette de Mars*
ou de *Carême*; *Violette*
ordinaire; *Violier com-
mun*.

Viola alba bulbosa, FUCHS.
Viola alba, THEOPHR. *Perce-neige*; *Violettes de*
Février ou de la *Chandeleur*;
Violier bulbeux; *Campanes*

blanches ; Baguenaudier d'hiver ou de printemps.

Viola flammea, SCALIGER. *Æillet.*

Viola humida & palustris, QUORUMDAM. *Grassette ; Herbe grasse ou huileuse.*

Viola indica scandens, nasturtii sapore, maxima odorata, HERM. *Grande Capucine ; grand Cresson des Indes ou du Pérou.*

Viola lunaria, off. *Viola lunaria major*, siliquâ rotundâ, C. B. *Viola latifolia*, DODON. *Viola lunaris prima*, TABERN. *Grande Lunaire ; Bulbonach ; Médaille ; Satinée ; Satin blanc ; Passe-satin.*

Viola lutea, TRAGI. *Viola lutea petræa*, TABERN. *Giroflier jaune ; Violier jaune.*

Viola matronalis, sive *damascena*, off. *Viola purpurea & Leucoïum*, FRICHS. *Viola moschatellina*, QUORUMDAM. *Julienne ou Julianne ; Violette giroflée des dames ; Giroflée musquée.*

Viola peruviana, TABERN. *Belle de nuit.*

Viola tricolor, DODONÆI.

Viola Trinitatis, TABERN.

Viola tricolor hortensis repens, C. B. *Viola tricolor*, seu *Jacea major*, CAST.

Viola tricolor major & vulgaris, PARK. *Viola flammea*, coloria, calida, LOBEL. *Violette de trois couleurs ; Herte de la Trinité ; Pensée.*

VIORNA, GERARD. & LOBELII. *Clématite ; Herbe aux gueux ; Barbe à dieu ; Viorne des gens de la campagne.*

VIORNUM GALLORUM, BELLONII. *Clématite ; Herbe aux gueux ; Barbe à dieu ; Viorne des gens de la campagne.*

VIPERA, off. *Vipera nostras*, J. M. *Vipera anglica fusca*, dorso lineâ undulatâ nigricante conspicua, PETIVER. *Vipere.*

Vipera cobras de capelo, KÆMPF. *Especie de serpent avec les os duquel on forme une pierre de serpent artificielle, désignée sous ce nom Lapis serpentinus ; Piedra di cobra de capelos.*

VIPERARIA, sive *Scorzonera hispanica*, GER. *Scorso nere ; Cercifs ou Serfifs noir ou d'Espagne.*

VIPERINA, sive *Serpentaria*, QUORUMD. *Vipérine ; ou Herbe aux viperes.*

VIRGA aurea major, officin.

Virga aurea latifolia serrata, C. B. & TOURNEF.

Virga aurea, sive *Solidago*

sarracenica latifolia, serrata, J. B.

Virga aurea, *Arnoldi Villanovani*, GER.

Virga aurea, *serratis foliis*, PARK.

Virga altera aurea, LOBEL.

Virga aurea folio latiore

serrato, QUORUMD. *Verge d'or à larges feuilles ; grande*

Verge dorée.

Virga aurea minor, off. *Virga aurea angustifolia minor ferrata*, C. B. *Verge d'or à feuilles étroites; petite Verge dorée.*

Virga regia major, flore purpureo, CÆSALP. *Digitalis; Gants de Notre-Dame.*

Virga cerata. *Bougie qui s'insère dans l'urethre.*

Viscum baccis albis, C. B. *Gui commun; Gui de chêne.*

Viscus quercûs & cæterarum arborum, J. B. *Gui commun; Gui de chêne.*

Visnaga, J. B. *Visnaga Gingidium appellatum*, PARK. *Fenouil annuel; Visnage; Cure-dent d'Espagne.*

Vitalba, DODON. *Clématite; Herbe aux gueux; Barbe à dieu; Viorne des gens de la campagne.*

Vitex, off. *Vitex*, Agnus castus, RAND. *Vitex, sive Agnus castus*, GER. *Vitex folio angusto*, PARK. *Vitex foliis angustioribus, cannabis modo dispositis*, C. B. & Tourn. *Vitex*, LINN. *Agnus castus.*

Vitis, off. *Vitis vinifera*, ex cujus uvis acerbis immaturis omphacium exprimitur, BOERH. *Vitis sativa, magna, media & parva*, QUORUMD. *Vigne cultivée haute, moyenne & basse.*

Vitis alba, off. *Bryone*, ou *Vigne blanche à baies rouges*, ou *Couleuvrée.*

Vitis damascena, H. R. P. *Vigne qui produit le raisin de Damas.*

Vitis idæa foliis carnosis & veluti punctatis, sive *Idæa radix Dioscoridis*, C. B. *Vigne d'ours*, ou *Bousserole.*

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, C. B. *Vitis idæa angulosa*, J. B. *Vitis idæa, seu Myrtillus primus*, TABERN. *Vitis idæa vulgaris, baccis nigris*, CLUS. *Vitis idæa nigra, seu Vaccinium nigrum. Airelle; Mirtylle; Raisin de bois; Bluets; Morets; Mûres de ronces.*

Vitis idæa palustris, C. B. *Canneberge; Cousines; Coussinettes; Coussinets des marais.*

Vitis marina, OFFIC. *Herbe flottante, ou Lentille de mer.*

Vitis nigra, off. *Vitis sylvestris*, DODON. *Sceau de Notre-Dame; ou Racine vierge mâle.*

Vitis Septentrionalium. *Houblon.*

Vitis sylvestris, CAMERAR. *Morelle; Douce-amère.*

Vitriola, LOBEL. *Pariétaire; Paritoire; Vitriole; Cassé-pierre; Perce-muraille.*

Vitulus marinus, seu Phoca, GESNER. & ALDROV. & JONST. *Vitulus marinus*, BELLON. *Vitulus, seu Bos marinus*, NONNULL. *Veau marin, ou Phocas.*

Viurna vulgi Gallorum & Ruellii, LOBEL. & CAST. *Viorne; Hardeau; Bourdene ou Bourdaine.*

VOLUBILIS major , TRAGI.
Grand Liseron ou Liset.

Volubilis marina , seu Solda-
nella vulgaris , GERARD.
& RAIL. *Soldanelle ; Chou*
de mer ; Chou marin.

Volubilis marina , NONNULL.
Scammonée de Montpellier ;
Apocyn à larges feuilles.

Volubilis minor , TRAGI.
Petit Liseron ou Liset ;
Campanette ou Clochette ;
Vrillée commune.

Volubilis filiquosa mexicana
foliis plantaginis , RAIL.
Volubilis filiquosa planta-
ginis folio , CATESBY.
Plante dont le fruit est la
vanille.

VOMICA liquoris æterni , PLI-
NII. *Mercure ; Vif-argent.*

VOMITORIA medicamenta.
Remedes vomitifs.

VULNERARIA , off. *Vulnera-*
ria rustica , J. B. & TOUR-
NEF. *Vulneraria consolida* ,
GESNER. *Vulneraria rustica*
flore ferrugineo , A. S. *Vul-*
neraria pratensis , loto affi-
nis , C. B. *Vulnéraire des*
paysans.

Vulneraria indica. *Tabac*
mâle ou vrai ; Nicotiane à
larges feuilles.

Vulneraria medicamenta. *Re-*
medes vulnéraires.

VULPARIA. *Aconit bleu ;*
Tue-loup ; Napel ; Coque-
luchon ; Capuchon ; Ca-
puce de moine ; Madriettes.

VULPES , off. *Renard.*

VULVARIA. *Arroche puante.*



W I S

WALINGHURU, *sive* Zingiber sylvestre, Zeylanensis, H. L. B. Plante dont la racine est le zérumbeth.
WILDUNGENSES aquæ. Eaux de Wildungen, en Allemag. dans le cercle du haut Rhin.

WINTERANUS cortex. Ecorce de Wintër, ou Cannelle blanche.

WISBADENSES aquæ, seu thermæ. Eaux de Wisbad, dans la Wétéravie.



X Y L

- Χαλαστικά Φάρμακα.** *Remedes relâchans.*
Χαλβάνη, DIOSC. *Galbanum concret, gommeux-resineux.*
ΧΑΛΧΟCHITL, seu *Pomum arenosum*, HERNAND. *Guaiavier, ou Goyavier, arbre des Indes occidentales.*
Χαλκός, GRÆCOR. *Cuivre; Airain.*
Χαμαιλέων λευκός, DIOSCOR. *Carline gommeuse; Chamé-léon blanc.*
XANTHIUM, off. *Xanthium*, DIOSCOR. *Xanthium caule inermit*, LINN. *Petite Bardane; petit Glouteron, ou Gletteron; Grapelles.*
Χελώνη θαλάσσια, GRÆCOR. *Tortue de mer.*
XIRIS, off. *Xiris, seu Spatula foetida*, J. B. *Xiris, seu Iris foetidissima*, TOURNEF. *Glaïeul puant; Spatule ou Espatule; Iris qui sent le gigot.*
Χλόροσαυρα, GRÆCORUM RECENT. *Lézard verd, ou grand Lézard.*
XOCHIOCOTZO quahuitl, seu *Arbor liquidambari indicæ*, HERNAND. *Arbre des incisions duquel découle le liquidambar.*
XOCOCHITL, sive *Piper Tavaſci*, HERNAND. *Poivre de la Jamaïque; Poivre de Thevet; Amomi; Toutes-épices.*
Χολαγωγὰ Φάρμακα. *Remedes cholagogues.*
Χρυσός. *Or, métal.*
Ξυλαλόη, GRÆCOR. RECENT. *Agallochum; Bois d'aloës.*
XYLOALOE. *Agallochum; Bois d'aloës.*
XYLOCASSIA, GRÆCORUM RECENT. *Casse en bois; c'est une substance ligneuse.*
XYLOSTEA quadrupedum lapidea, WALLER. *Unicorne fossile.*



Y T Z

<p>YQUETAYA Brasiliensium seu brasiliensis, GUL. HOMBERG. & J. MARCHAND. Scrophulaire aquatique ; Herbe du siege ; Bétoine d'eau ou aquatique.</p>	<p>YSALLIENSES aquæ. <i>Eaux d'Youset, dans le bas Languedoc.</i></p> <p>YTZECUINPATH. <i>C'est peut-être sous ce nom que HERNANDÈS désigne l'armoise qui donne le moxa.</i></p>
---	--



ZAGARILLA.

Z I Z

ZAGARILLA. *Cascarille* ou *Chacril.*

ZAIBAR, ARABUM. *Mercure; Vif-argent.*

ZARNIC ahmer, ARABUM. *Réalgar; Orpiment rouge; Sandaraque.*

ZEBED & Zebet, ARABUM. *Zibet, animal quadrupede.*

ZEDOARIA anthora, TABERN. & AVIC. *Aconit salulaire; Anthore; Macclou.*

Zedoaria longa: *Zédoaire longue.*

Zedoaria radice luteâ, BREYN. *Cassumuniar & Casmunar des Anglois.*

Zedoaria rotunda. *Zédoaire ronde.*

ZELIM granum, SERAPION. *Poivre d'Ethiopie.*

ZERUMBETH, off. & GARZ. *Zérumbeth racine; c'est aussi le non. de la plante.*

Zerumbeth, seu Zinziber rubrum, sylvestre, ternatense, CAMEL. DALE. *Cassumuniar & Casmunar des Anglois.*

ZIBIB, ARABUM. *Raisins de Damas.*

ZIBIBE, QUORUMD. *Raisins de Damas.*

ZIMPUPERI & Zingiberi, PLIN. *Gingembre, racine.*

ZINCI minera terrea, colore flavescente aut fusco, WALTER. *Pierre calaminaire.*

Tome VIII.

ZINCUM, Zinctum. Zinc, demi-métal.

Zincum terrestre, LINNÆI. *Pierre calaminaire.*

ZINGI fructus stellatus, sive Anisum indicum, J. B. *Anis de la Chine; Anis de Sibérie; Anis étoilé; Semence de badian.*

ZINGIBER, sive Gingiber, OFF. *Gingembre, racine.*

Zingiber angustiori folio femina, utriusque Indiæ alumna, PLUCK. *Plante dont la racine se nomme gingembre.*

Zingiber sylvestre mas, PISON. *Gingembre mâle.*

ZINGIBERI & Zimpiperi, PLINII. *Gingembre, racine.*

ZINZIBER latifolium sylvestre, HERMAN. *Zinziber sylvestre Zeylanensibus, H. L. B. Zinziber sylvestre majus, fructu in pediculo singulari, SLOANE.* *Plante dont la racine est le zérumbeth.*

Ζιζυφα, GRÆCOR. RECENT. *Jujubes, fruits du jujubier.*

Ζιζυφα, GRÆCOR. RECENT. *Jujubes, fruits du jujubier.*

Ζιζυφα, GRÆCOR. RECENT. *Jujubes, fruits du jujubier.*

ZIZYPHA, off. *Jujubes, fruits du jujubier.*

Zizypha sativa, J. B. *Jujubier, arbre.*

Ff

ZIZYPHUS, DODON. Jujubier, arbre.

Zizyphus humilior alexandrina, latifolia majori fructu, formâ cerasi purpurascence, D. LIPPI. Jujubier d'Alexandrie à feuilles larges, dont le fruit est fort gros.

Zizyphus humilior alexandrina, minori fructu, luceo, formâ cerasi, D. LIPPI. Jujubier d'Alexandrie, dont le fruit est petit.

Zizyphus latifolia, gigas, majori fructu, formâ cerasi purpurascence, D. LIPPI. Jujubier de Memphis, qui est extrêmement grand, & dont le fruit est plus gros que celui des autres espèces.

ZUCCHA omnium maxima; Anguina, LOBEL. Courge, ou Calebasse.

ZURATZEE, SERAPION. Jujubes, fruits du jujubier.

Fin de la Table.

T A B L E

S U I V A N T L E S Y S T È M E

D E

C H A R L E S L I N N É.

§. I.

R È G N E V É G É T A L.

A C

A D

ACANTHUS mollis. Brancursine, t. ij, p. 159, pl. 108.

ACER saccharinum. L'Era-
ble à sucre, t. vij, p. 224,
pl. 696.

ACHILLEA ageratum. L'Eupatoire de mésué, t. iij, p. 278, pl. 268.

Achillea millefolium.
La Millefeuille, tom. v,
p. 144, pl. 443.

Achillea ptarmica.
L'herbe à éternuer, t. iv,
p. 108, pl. 333.

ACHRAS sapota. Le Sapotilier, t. vij, p. 69.

ACONITUM anthora. L'Anthore, l'Aconit salulaire, t. j, p. 193, pl. 12.

Tome VIII.

Aconitum napellus. Le Tue-loup, tom. j, p. 192, pl. 11.

ACORUS calamus. Le Calamus vrai, t. ij, p. 198, pl. 129.

ACTHÆA racemosa. L'herbe de S. Christophe, t. iv, p. 105.

ADIANTUM capillus veneris. Le capillaire de Montpellier, t. ij, p. 231, pl. 140.

Adiantum pedatum.
Le capillaire de Canada, t. ij, p. 232, pl. 140.

ADONIS vernalis. L'Ellébore noir à fleurs d'œil de Bœuf, t. iij, p. 236, pl. 257.

ADOXA moschatellina. La

G g

- Moscatelline , t. v. p. 173, pl. 452.
- ÆSCHINOMENE *grandiflora*. L'arbre des Battus, t. j, p. 204.
- ÆSCULUS *hippostanum*. Le marronnier d'Inde, tom. v, p. 24.
- ÆTHUSA *cynapium*. Petite ciguë, t. iij, p. 20, pl. 204.
- Æthusa *meum*. Le Meu, t. v, p. 143, pl. 442.
- AGARICUS *campestris*. Le Champignon ordinaire, t. ij, p. 296, pl. 172.
- Agaricus *muceronidus*. Le Mouceron, t. ij, p. 294, pl. 142.
- AGRIMONIA *eupatoria*. L'Aigremoine, t. j, p. 211, pl. 18.
- AGROSTEMMA *coronaria*. La Passe-fleur, t. vj, p. 21.
- Agrostemma *githago*. La Nielle de brebis, t. v, p. 243, pl. 480.
- AJUGA *reptans*. La Bugle, t. ij, p. 172, pl. 114.
- ALCEA *rosea*. La Rose d'outremer, t. v, p. 42, pl. 427.
- ALCHEMILLA *vulgaris*. Le Pied de Lion, t. vj, p. 75, pl. 556.
- ALLIUM *ascalonicum* L'Echalotte, t. v, pag. 284, pl. 492.
- Allium *cepa*. L'Oignon, t. v, p. 283, pl. 491.
- Allium *fistulosum*. La Ciboule, tom. v. p. 284, pl. 493.
- Allium *porrum*. Le Porreau, t. vj, p. 156, pl. 580.

- Allium *scoradoprasmum*. La Rocambole, tom. vj, p. 305, pl. 619.
- Allium *sativum*. L'Ail, t. j, p. 213, pl. 20.
- Allium *victorialis*. L'Ail serpent, tom. j, p. 216, pl. 20.
- A LOE *perfoliata*. L'Aloës soccotrin, tom. j, p. 244, pl. 29.
- Aloë *perfoliata*; aloë vera. L'Aloës vraie, t. j, p. 246, pl. 30.
- ALSINE *media*. La Morge-line, t. v, p. 165, pl. 450.
- ALTHÆA *officinalis*. La Guimauve, tom. iv, pag. 88, pl. 326.
- AMARANTHUS *blitum*. L'Amaranthe passe velours, t. j, p. 264, pl. 35.
- AMBROSIA *coronopus*. Le Cresson sauvage, t. iij, p. 105, pl. 236.
- AMOMUM *cardamomum*. Le Cardamome, t. ij, p. 241, pl. 147; tom. iv, pag. 59, pl. 314.
- Amomum *granum paradisi*. L'Amome, tom. j, p. 293, pl. 37.
- Amomum *zerumbet*. Le Cassommunier, tom. ij, p. 260, pl. 159.
- Amomum *zingiber*. Le Gingembre, t. iv, p. 37, pl. 309. Le Zerum betf, t. viij, p. 144.
- AMYGDALUS *communis*. L'Amandier doux, t. j, p. 261, pl. 33.
- Amygdalus *persica*. Le

pêcher ordinaire, t. vj, p. 39, pl. 538.

AMYRIS balsamifera. Le bois de Rhodes, tom. ij, p. 133, pl. 101.

Amyris elemifera. l'Elemi, t. iiij, p. 226.

Amyris opobalsamum. Le Baumier de la Mecque, t. ij, p. 56, pl. 77.

ANACARDIUM occidentales. L'Acajou, t. j, p. 183, pl. 9.

ANAGALLIS arvensis. Le Mouron, tom. v, p. 177, pl. 454.

ANCHUSA officinalis. La Buglose, t. ij, pag. 173, pl. 115.

Anchusa tinctoria. L'Alcanne faux, tom. j, p. 225, pl. 23; l'Orcanette, t. v, p. 313, pl. 23.

ANDROPOGON schœnanthus. Le Jonc odorant, t. iv, p. 177, pl. 361; le Nard Indien, t. v, p. 234, pl. 470.

ANEMONE coronaria. L'Anémone; t. j, p. 309, pl. 42.

Anemone hepatica. L'hépathique des fleuristes, t. iv, p. 98, pl. 328.

Anemone nemorosa. La Renoncule des bois, t. vj, p. 266, pl. 606.

Anemone pulsatilla. La pulsatille, t. iiij, p. 69, pl. 222.

ANETHUM fœniculum. Le Fenouil doux, t. iiij, p. 297.

Anethum graveolens. L'Aneth, tom. j, p. 310,

pl. 43; le Fenouil commun, t. iiij, p. 296, pl. 272.

ANINGA, iba. L'Aninga, t. j, p. 321.

ANTHEMIS cotula. La Camomille puante, tom. ij, p. 202, pl. 133.

Anthemis nobilis. La Camomille romaine, t. ij, p. 202, pl. 132.

Anthemis pyrethrum. La Pyrèthre, t. vj, p. 209, pl. 589.

Anthemis tinctoria. L'œil de Bœuf, t. v, p. 278, pl. 488.

ANTHILLIS vulneraire. La Vulnéraire des paysans, t. viij, p. 141, pl. 764.

ANTIRRHIMUM linaria. La Linaire, tom. iv, p. 286, pl. 400.

Antirrhinum spurium. La Velvete, t. viij, p. 13, pl. 749.

APIUM graveolens. L'ache, t. j, p. 186, pl. 10.

Apium petroselinum. Le Persil commun, t. vj, p. 55-56, pl. 545.

AQUILEGIA vulgaris. L'Ancolie, t. j, p. 302, pl. 40.

ARBUTUS unedo. L'Arbousier, t. j, p. 373, pl. 52.

Arbutus uva ursi. Le Raisin d'ours, t. viij, p. 58, pl. 760.

ARCTIUM lappa. La Bardane, t. ij, p. 44, pl. 74.

ARISTOLOCHIA clematitis. L'Aristolochie clématite, t. j, p. 381, pl. 54.

Aristolochia longa.

L'Aristoloché longue, t. j, p. 382, pl. 55.

Aristolochia pistolochia. La petite aristoloché, t. j, p. 383, pl. 54.

Aristolochia rotunda.

L'Aristoloché ronde, t. j, p. 383, pl. 55.

Aristolochia serpentaria. La Serpentaire de Virginie, t. vij, p. 147, pl. 674.

ARNICA *montana*. La Doronic ou Arnica, tom. iij, p. 153, p. 250.

Arnica scorpioides. Le Doronic rampant, t. iij, p. 155.

ARTEMISIA *abrotanum*. L'Aurone mâle, tom. j, p. 417, pl. 64.

Artemisia absintium. L'Absinthe, t. j, p. 170, pl. 3.

Artemisia contra. La Santoline, t. vij, p. 68.

Artemisia dracunculus. L'Estragond, t. iij, p. 266, pl. 265.

Artemisia pontica. Petite absinthe, t. j, p. 172, pl. 4.

Artemisia sinensis. Le Moxa, t. v, p. 188.

Artemisia vulgaris. L'Armoise, t. j, p. 385, pl. 56.

ARUM *maculatum*. Le Pied de veau, tom. vj, p. 77, pl. 558.

ARUNDO *bambos*. Le Bambu, t. ij, p. 37, pl. 72.

Arundo phragmites. Le Roseau, t. vj, p. 316.

ASARUM *europæum*. Le Cabaret, tom. ij, pag. 178, pl. 119.

ASCLEPIAS *syriaca*. Le Sucre d'Égypte, tom. 7, p. 226, pl. 697.

Asclepias vincetoxicum. Le Dompte-venin, t. iij, p. 150, pl. 249.

ASPARAGUS *officinalis*. L'Asperge, t. j, p. 396, pl. 60.

ASPERULA *cynanchica*. La Rubéole, tom. iv, p. 20, pl. 303.

Asperula odorata. Le Muguet des bois, tom. v, p. 197, pl. 461.

ASPLENIUM *adiantum nigrum*. Le Capillaire noir, t. ij, p. 233, pl. 141.

Asplenium ceterach. Le Cétérach, t. ij, p. 292, pl. 169.

Asplenium ruta muraria. La Rue de muraille, t. ij, p. 234, pl. 142.

Asplenium scolopendrium. La scolopendre vulgaire, t. vij, p. 121, pl. 664.

Asplenium trichomanoides. Le Capillaire rouge, ou polyrric, tom. ij, p. 235, pl. 142.

ASTRAGALUS *tragacantha*. Le Gommier adragantier, t. j, p. 197.

ASTRANTIA *major*. La Sanicle femelle, t. vij, p. 64, Pl. 641.

ATHAMANTA *cervaria*. Grand Persil de montagne, t. vj, p. 59, pl. 549.

Athamanta oreoselinum. Petit Persil sauvage, t. vj, p. 60 pl. 550.

Athamanta cretensis. Le Dâucus de Candie, t. iij, p. 130, pl. 244.

ATRACTYLIS *gummifera*. La Carline gommeuse, t. ij, p. 244, pl. 149.

ATRIPLEX *hortensis*. L'arroche blanche, tome j, p. 391, pl. 57.

ATROPA *belladonna*. La Belladone, t. ij, p. 85, pl. 84.

Atropa mandragora. La Mandragore, t. v, pag. 7, pl. 416.

AVENA *sativa*. L'Avoine blanche, tom. j, p. 426, pl. 68.

AVICENNIA *tomentosa*. L'Anacarde, t. j, p. 297, pl. 38.

BALLOTTA *nigra*. Le Marube noir, t. v, pag. 28, pl. 422.

BALSAMIFERA *peruviana*. Le Baumier du Pérou, t. ij, p. 57, pl. 78.

BDELLIUM. Substance gommeuse, résine, végétale et inconnue, tom. ij, p. 64.

BELLIS *perennis*. Petite Marguerite, t. v, p. 16, pl. 418.

BERBERIS *vulgaris*. L'Épinevinette, tom. iij, p. 251, pl. 264.

BETA *vulgaris*. La Bette

blanche, t. ij, p. 99, pl. 92.

BETONICA *officinalis*. La Bétoine, t. ij, p. 98, pl. 91.

BETULA *alba*. Le Bouleau, t. ij, p. 154, pl. 94.

Betula alnus. L'Aune, t. j, p. 414, pl. 62.

BIDENS *tripartita*. Le chanvre aquatique, t. ij, p. 302, pl. 174.

BIXA *orellana*. L'Achiolt, l'uracu, t. j, p. 188.

BOLETUS *igniarius*. Agaric de chêne, t. j, p. 202.

Boletus laricis. Agaric, t. j, p. 201, pl. 14.

BORRAGO *officinalis*. La Bourrache, t. ij, p. 158, pl. 107.

BRASSICA. Chou, tom. iij, p. 12, pl. 200.

Brassica botrytis. Le Chou-fleur, t. iij, p. 12, pl. 201.

Brassica eruca. La Roquette des jardins, t. vj, p. 309, pl. 622.

Brassica erucastrum. La Roquette sauvage, t. vj, p. 309, pl. 623.

Brassica napus, Navet cultivé, tom. v, p. 235, pl. 472.

Brassica rapa. La Rave mâle, ou ronde, t. vj, p. 251, pl. 601.

BROMELIA *ananas*. L'Ananas, tome j, page 300, pl. 39.

BRYONIA *alba*. La Bryone, la Centaurée, t. ij, p. 169, pl. 113.

BUBON *galbanum*. Le Gal-
G g iij

banum, tom. iv, p. 13,
pl. 299.

Bubon macedonicum.
Persil de Macédoine, t. vj,
p. 57, pl. 546.

BUPLEURUM falcatum. La
Perce-feuille vivace, t. vj,
p. 42.

Bupleurum rotundifo-
lium. La Perce-feuille an-
nuelle, tom. vj, pag. 41,
pl. 539.

BUXUS sempervirens. Le
Buis, t. ij, p. 176, pl. 117.

CÆSALPINIA brasilensis.
Le Bois de Fernambouc,
t. ij, p. 126.

CALAMINTHA arvensis. Ca-
lament des champs, t. ij,
p. 197, pl. 128.

CALAMUS rotang. Le Sang
de dragon d'amboine,
t. vij, p. 52, pl. 637.

CALENDULA arvensis. Le
Souci sauvage, t. vij, p. 178.

Calendula officinalis.
Le Souci de jardin, t. vij,
p. 177. pl. 688.

CAMBOGIA gutta. La gom-
me-gutte, t. iv, p. 56,
pl. 313.

CAMPANULARapunculus. La
Raiponce, t. vj, p. 245,
pl. 597.

Campanula trachelium.
Le Gantelée, t. iv, p. 17,
pl. 301.

CAMPHOROSMA monspelia-
na. La Camphrée, t. ij,
p. 213, pl. 135.

CANNABIS sativa. Le Chan-

vre ou Senevi, tom. ij,
p. 300, pl. 173.

CAPPARIS spinosa Le
Caprier, tom. ij, p. 237,
pl. 144.

CAPSICUM annuum. Le Poi-
vre d'Inde, t. vj, p. 136,
pl. 573.

CARANNA officinalis. La
Gomme de Caragne, t. ij,
p. 240, pl. 146.

CARDONES. Les Chardons,
t. ij, p. 304, pl. 176.

CARDUUS marianus. Le
Chardon marie, tom. ij,
p. 311, pl. 180.

CARLINA acaulis. La Car-
line, t. ij, p. 243, pl. 149.

CARTHAMUS lanatus. Le
Chardon-bénit des Pari-
siens, t. ij, p. 307, pl. 176.

Carthamus tinctorius.
Le Safran bâtard, t. ij,
p. 250, pl. 152.

CARUM carvi. Le Carvi, t. ij,
p. 251, pl. 153.

CARYOPHYLLUS aromati-
cus. Le Girofle, tom. iv,
p. 42, pl. 310.

CASSIA fistula. La Casse
solutive, tom. ij, p. 253,
pl. 155.

Cassia javanica. Casse
de Brésil, t. ij, p. 256,
pl. 156.

Cassia senna, Le Séné,
t. vij, p. 141, pl. 275.

CASSINE peragua. L'Ala-
terne perigua, t. j, p. 224.

CENTAUREA benedicta. Le
Chardon-bénit, tome ij,
p. 305, p. 175.

Centaurea calcirrapa.

- Le Chardon étoilé, t. ij, p. 310, pl. 179.
Centaurea centaureum. Lagrande Centaurée, t. ij, p. 270, pl. 160.
Centaurea cyanus. Le Bleuet, t. ij, p. 116, pl. 96.
Centaurea nigra. La Jacée, t. iv, p. 172, pl. 358.
CERATONIA *siliqua*. La Carouge, t. ij, p. 247, pl. 151.
CERBERA *ahouai*. L'Ahouai, t. j, p. 207.
CERCIS *siliquastrum*. Le Gainier, t. iv, p. 9, pl. 296.
CHEIRANTHUS *cheiri*. Le Giroflier jaune, t. iv, p. 46, pl. 311.
CHELIDONIUM *glauucium*. Le Pavot cornu, t. vj, p. 35, pl. 535.
Chelidonium majus. La grande Chelidoine, t. ij, p. 325, pl. 185.
CHENOPODIUM *ambrosoïdes*. Le Botrys d'Amérique, t. ij, p. 147, pl. 104.
Chenopodium bonus Henricus. Le Bon Henri, t. ij, p. 139, pl. 102.
Chenopodium botrys. Le Botrys vulgaire, t. ij, p. 146, pl. 103.
Chenopodium vulvaria. L'Arroche puante, t. j, p. 392, pl. 58.
CHRYSANTHEMUM *frutescens*, t. vj, p. 209, pl. 589.
Chrysanthemum leucanthemum. La grande Marguerite, t. v, p. 15, pl. 418.
CHRISOSPLENIUM *oppositifolium*. La Saxifrage dorée, t. vij, p. 96, pl. 651.
CICER *arietinum*. Le Pois chiche, tom. vj, p. 127, pl. 569.
CICHORIUM *endivia*. La Chicorée blanche, t. iij, p. 3, pl. 196.
Cichorium intybus. La Chicorée sauvage, t. iij, page 1, pl. 195.
CICLAMEN *europæum*. Le Pain de pourceau, t. vj, p. 6, pl. 517.
CINARA *scolimus*. L'Artichaut, t. j, p. 395, pl. 59.
CINCHONA *officinalis*. Le Quinquina, t. vj, p. 218, pl. 154.
CISSAMPELOS *pareira*. Le Pareira brava, t. vj, p. 17.
CISTUS *cretica*. Le Labdanum, t. iv, p. 201, pl. 370.
Cistus helianthemum. L'Hyssope de garrigues, t. iv, p. 148, pl. 351.
CITRUS *aurantium*. L'Oranger, t. v, p. 310, pl. 495.
Citrus medica. Le Citronnier, tom. iij, p. 20, pl. 205; le Limonier, t. iv, p. 281, pl. 205.
CLEMATIS *viorna*. La Clématite, tom. iij, p. 27, pl. 207.
COCHLEARIA *officinalis*. L'Herbe aux cuillers, t. iij, p. 38, pl. 210.
Cochlearia armoracia. Le Raifort sauvage, t. vj, p. 242, pl. 594.
COCOS *guineensis*. Le Bois d'ébène, t. ij, p. 129.

COFFEA arabica. Le Café, t. ij, p. 190, pl. 121.

COIX lacryma. Les Larmes de Job, t. iv, p. 242, pl. 379.

COLCHICUM autumnale. La Colchique, t. iij, p. 54, pl. 214.

COLUTEA arborescens. Le Baguenaudier, t. ij, p. 1, pl. 69.

CONIUM maculatum. Ciguë, t. iij, p. 18, pl. 203.

CONVALLARIA majalis. Le Muguet, tom. v, p. 198, pl. 462.

Convallaria polygonatum. Sceau de Salomon, t. vij, p. 113, pl. 660.

CONVOLVULUS arvensis. Le petit Liseron, t. iv, p. 299, pl. 406.

Convolvulus jalapa. Le Jalap, t. iv, p. 175, pl. 360. C'est la plante de *Mirabilis jalapa*.

Convolvulus mechoacanna. Le Mechoacan, t. v, p. 428.

Convolvulus Scammonia. La Scammonée, t. vij, p. 103, pl. 657.

Convolvulus soldanella. La Soldanelle, t. vij, p. 171, pl. 685.

Convolvulus sepium. Le grand Liseron, tom. iv, p. 298, pl. 405.

Convolvulus turpethum. Le Turbith, t. vij, p. 301, pl. 742.

CONYZA squarrosa. L'Herbe aux Moucherons, tom. iv, p. 114, pl. 335.

COPAIFERA officinalis. Le Copaïba, t. ij, p. 151, pl. 76.

CORDIA mixta. Sébestes, t. vij, p. 118, pl. 569.

CORIANDRUM sativum. La Coriandre, t. iij, p. 78, pl. 224.

CORNUS mascula. Le Cornier, t. iij, p. 81, pl. 226.

COSTUS arabicus. Le Costus, t. iij, p. 86, pl. 227.

COTYLEDON umbilicus. Le Nombril de Vénus, t. v, p. 268-270, pl. 483-484.

CRATÆGUS torminalis. L'Alisier, le Sorbier torminal, t. j, p. 234, pl. 27.

Cratægus oxyacantha. L'Épine blanche, t. iij, p. 250, pl. 263.

CRITHMUM maritimum. La Passe-pierre, t. vj, p. 21, pl. 524.

CROCUS sativus. Le Safran, t. vij, p. 4, pl. 630.

CROTON cascarilla. La Cascarille, tom. ij, p. 252, pl. 154.

Croton lacciferum. Lacque, t. v, p. 204.

Croton tiglium. Les Pignons d'Inde, t. vj, p. 302, pl. 617.

CUCUBALUS fabarius. Le Behen blanc, t. ij, p. 78, pl. 83.

CUCUMIS colocynthis. La Coloquinte.

Cucumis melo. Le Melon, t. v, p. 87, pl. 432.

Cucumis sativus. Le Concombre cultivé, t. iij, p. 57, pl. 216.

CUCURBITA *citrullus*. La citrouille, t. iij, p. 23, pl. 200.

Cucurbita lagenaria. La Calebasse, t. iij, p. 89, pl. 229.

CUMINUM *cuminum*. Le Cumin, tom. iij, p. 119, pl. 238.

CUPRESSUS *sempervirens*. Le Cyprès, t. iij, p. 128, pl. 243.

CURCUMA *longa*. Le Curcuma long, t. iij, p. 120, pl. 339.

CUSCUTA *europæa*. Le Cuscuta, t. iij, p. 123, pl. 240.

CYCAS *circinalis*. Le Sagou, t. vij, p. 11, pl. 631.

CYNANCHUM *monspeliacum*. La Scammonée de Montpellier, t. vij, p. 109, pl. 658.

CYNOGLOSSUM *officinales*. Cynoglosse, t. iij, p. 127, pl. 242.

CYPERUS *longus*. Le Souchet long, t. vij, p. 175, pl. 687.

Cyperus rotundus. Le Souchet rond, tome vij, p. 176, pl. 687.

CYTISUS *laburnum*. L'Aubour, t. j, p. 413.

Cytisus hypocistis. L'Hypociste, t. iv, p. 145, pl. 349.

DAPHNE *gnidium*. Le Garou, t. iv, p. 24, pl. 305.

Daphne laureola. Le Lauréole mâle, tom. iv, p. 242, pl. 380.

Daphne mezereum. La Camelée, tom. ij, p. 199, pl. 130; Lauréole femelle, t. iv, p. 243, pl. 381.

DATURA *stramonium*. La Pomme épineuse, t. vj, p. 146, pl. 577.

DAUCUS *carotta*. La Carotte, t. ij, p. 246, pl. 150.

Daucus sylvestris. Le Daucus vulgaire, t. iij, p. 131, pl. 245.

Daucus visnaga. Le Fenouil annuel, tom. iij, p. 298, pl. 273.

DELPHINIUM *staphisagria*. La Staphisaigre, t. vij, p. 200, pl. 692.

DIANTHUS *caryophyllus*. L'Œillet, t. v, pag. 279, pl. 489.

DICTAMNUS *albus*. Le Dictame blanc, t. iij, p. 139, pl. 246.

DIGITALIS *purpurea*. La Digitale, t. iij, pag. 147, pl. 248.

DIPSACUS *fullonum*. Le Chardon à bonnetier, t. ij, p. 307, pl. 177.

DORONICUM *pardalianches*. Le Doronic, t. iij, p. 152, pl. 250.

DORSTENIA *contrayerva*. Le Contrayerva, t. iij, p. 62, pl. 219.

DRACÆNA *draco*. Le Sang de Dragon, t. vij, p. 52.

Dracæna ferrea. Le Bois de fer, t. ij, p. 129.

DROSERÀ *rotundifolia*. Le Rossolis, tom. vj, p. 317, pl. 627.

ECHIU *vulgare*. La Vipérine, tom. viij, p. 119, pl. 763.

EPIDENDRON *vanilla*. La Vanille, tom. viij, p. 7, pl. 147.

EPILOBIUM *angustifolium*. L'Herbe de S. Antoine, t. iv, p. 99.

EQUISETUM *arvense*. La petite Prêle, t. vj, p. 174, pl. 583.

Equisteum fluviatile. La grande Prêle, t. vj, p. 174, pl. 583.

ERICA *vulgaris*. La Bruyère, t. ij, p. 168, pl. 112.

ERVUM *ervillia*. L'Orobe, t. v, p. 322, pl. 501.

Ervum lens. La petite Lentille, t. iv, pag. 252, pl. 387.

ERINGIUM *campestre*. Le Chardon-roland, tom. ij, p. 312, pl. 181.

Eryngium maritimum. Le Panicaud de mer, t. vj, p. 13, pl. 520.

ERYSIMUM *alliarica*. L'Aliaire, t. j, p. 243, pl. 28.

Erysimum barbarea. L'Herbe-de-sainte-Barbe, t. iv, p. 100.

Erysimum vulgare. La Tortelle, t. vij, p. 317, pl. 730.

ERYTHRINA *corollodendrum*. L'Arbre de Corail, t. j, p. 374.

EVONYMUS *europæus*. Le Fusain, tom. iij, p. 360, pl. 293.

EUPATORIUM *cannabinum*.

• L'Eupatoire d'Avicenne, t. iij, p. 277, pl. 267.

EUPHORBIA *cyparissias*. La Tithymale à feuilles de pin, t. vij, p. 309, pl. 724.

Euphorbia esula. La Tithymale à feuilles de cyprés; l'Esule, t. vij, p. 309, pl. 724.

Euphorbia lathyris. La Tithymale à larges feuilles, t. vij, p. 311, pl. 726.

Euphorbia officinarum. L'Euphorbe, t. iij, p. 279, pl. 269.

Euphorbia palustris. La Tithymale des marais, t. vij, p. 310, pl. 725.

Euphorbia paralias. Petite Tithymale à feuilles d'amandier, tom. vij, p. 312, pl. 727.

Euphorbia officinalis. L'Euphrase, t. iij, p. 282, pl. 270.

EXCOECARIA *agalloche*? L'Agallachum; le Bois d'Aloès, t. j, p. 199.

FAGUS *castanea*. Le Châtaignier, tom. ij, p. 318, pl. 184.

FERULA *assa-fætida*. L'Assa-fætida, tom. j, p. 398, pl. 61.

Ferulæ species? Le Sagapenum, t. vij, p. 10.

FICUS *carica*. Le Figuier, t. iij, p. 322, pl. 279.

FRAGARIA *vesca*. Le Fraisier, t. iij, p. 344, pl. 287.

FRAXINUS *excelsior*. Le Frêne, tom. iij, p. 348, pl. 289; t. v, p. 12, pl. 417.

Fraxinus ornus. L'Orne, t. v, p. 13, pl. 417.

FUCUS *natans*. L'Herbe flottante, t. iv, p. 109.

FUMARIA *officinalis*. La Fumeterre, t. iij, p. 355, pl. 292.

GALANTHUS *nivalis*. Le Perce-neige, tom. vj, p. 43, pl. 540.

GALIGA *officinalis*. Le Gallega, t. iv, p. 16, pl. 300.

GALEOPSIS *galeobdolon*. L'Ortie morte à fleurs jaunes, tom. v, p. 333, pl. 508.

GALIUM *aparine*. Le Gratteron, t. iv, p. 65, pl. 317.

Galium molugo. Le Caille-lait à fleur blanche, t. ij, p. 195, pl. 123.

Galium verum. Le Caille-lait à fleur jaune, t. ij, p. 194, pl. 123.

GARCINIA *mangostana*. Le Mangostan, t. v, p. 11.

GENISTA *germanica*. Le Gênet d'Allemagne, t. iv, p. 30, pl. 307.

GENTIANA *centaurium*. La petite Centaurée, t. ij, p. 271, pl. 161.

Gentiana lutea. La grande Gentiane, t. iv, p. 34, pl. 298.

GERANIUM *columbinum*. Bec de Grue; Pied de Pigeon, t. ij, p. 66, pl. 79.

Geranium moschatum.

Bec de Grue musqué, t. ij, p. 68.

Geranium robertianum.

Bec de Grue; Herbe à Robert, t. ij, p. 66, pl. 80.

Geranium sanguineum.

Bec de Grue sanguin, ou à grandes Fleurs, t. ij, p. 67, pl. 81.

GEUM *virginianum*. Benoîte sauvage d'Amérique, t. ij, p. 95.

Geum urbanum. L'Herbe S. Benoît, t. ij, p. 94, pl. 88.

GLECOMA *hederacea*. Le Lierre terrestre, tom. iv, p. 270, pl. 395.

GLYCYRRHIZA *echinata*. La Réglisse, t. vj, p. 256, pl. 602.

GNAPHALIUM *arenarium*. Le Stæchas citrin. t. vij, p. 203.

Gnaphalium dioicum. Le Pied-de-chat, t. vj, p. 74, pl. 332.

Gnaphalium sylvaticum. L'Herbe à coton, t. iv, p. 106, pl. 332.

GRAMEN *repens*. Le Chien-dent ordinaire, t. iij, p. 7, pl. 199.

GRATIOLA *officinalis*. La Gratiolle, tom. iv, p. 64, pl. 316.

GUAIACUM *officinale*. Le Gaïac des boutiques, t. iv, p. 1, pl. 294-295.

GUILANDINA *moringa*. Le Ben, t. ij, p. 89, pl. 86, Bois néphrétique, t. ij, p. 131, pl. 100.

HÆMATOXYLIUM *campechianum*. Le bois de Campêche, t. ij, p. 126, pl. 98.
HEDERA *helix*. Le Lierre en arbre, t. iv, p. 268, pl. 394.
HEDYSARUM *alhagi*. L'Alhagi, t. j, p. 232, pl. 26.
 Hedysatum onobrychis. Le Sainfoin, t. vij, p. 20, pl. 632.
HELIANTHUS *annuus*. Le Soleil, t. vij, p. 172.
 Helianthus tuberosus. Le Topinambour, t. vij, p. 314, pl. 728.
HELIOTROPIUM *europæum*. L'Herbe aux Verrues, t. iv, p. 120, pl. 338.
HELLEBORUS *fætibus*. L'Elébore noir commun, t. iij, p. 237, pl. 258.
 Helleborus niger. L'Elébore noir à fleurs de rose, t. iij, p. 233, pl. 256.
HERACLEUM *sphondylium*. La Berce, t. ij, p. 96, pl. 89.
HERNIARIA *glabra*. La Turquette, tom. vij, p. 343, pl. 743.
HESPERIS *matronalis*. La Julienne, t. iv, p. 189, pl. 366.
HIBISCUS *abelmoschus*.

L'Ambrette, ou Graine musquée, tom. j, p. 271, pl. 35.
HIERACIUM *murorum*. La Pulmonaire des François, t. vj, p. 193, pl. 587.
 Hieracium pilosella. La Piloselle, t. vj, p. 94, pl. 560.
HOLCUS *sorghum*. Le grand Millet noir, t. v, p. 149, pl. 446.
HORDEUM *vulgare*. L'Orge, t. v, p. 318, pl. 498.
HUMULUS *lupulus*. Le Houblon, t. iv, p. 135, pl. 344.
HYMENÆA *courbaril*. L'Anisé, t. j, p. 319, pl. 47.
HYOSCIAMUS *albus*. La Jusquiame blanche, t. iv, p. 194, pl. 368.
 Hyosciamus niger. La Jusquiame noire, t. iv, p. 190, pl. 367.
HYPERICUM *androsæmum*. La Toute-saine, t. vij, p. 324, pl. 732.
 Hypericum perforatum. La Millepertuis, t. v, p. 147, pl. 444.
HYPNUM *sericeum*. La Mousse commune, t. v, p. 180, pl. 456.
HYSSOPUS *officinalis*. L'Hyssope, tom. iv, p. 146, pl. 350.

IATROPHA *curcas*. La Fève purgative, t. vj, p. 297, pl. 615.

Iatropha multifida. Noix purgative, tome vj, page 299, pl. 616.

IGNATIA *amara*. La Fève de S. Ignace, tome iij, page 318, pl. 278.

ILEX *aquifolium*. Le Houx, t. iv, pa. 136, pl. 344.

ILICIUM *anisatum*. L'Anis étoilé, tome j, page 329, pl. 49.

IMPATIENS *noli me tangere*. La Balsamine jaune, t. ij, page 33, pl. 71.

IMPERATORIA *ostruthium*. L'Impératoire, tome vj, p. 141, pl. 344.

INDIGOFERA *tinctoria*. L'Anil, t. j, pag. 316, pl. 46.

INULA *helenium*. L'Auné, t. j, p. 414, pl. 63.

IRIS *florentina*. L'Iris de Florence, t. iv, pag. 169, pl. 355.

Iris fœtidissima. Le Glaieul puant, t. iv, p. 47 pl. 312.

Iris germanica. L'Iris ordinaire, t. iv, page 167, pl. 355.

Iris pseud acorus. Le faux Acorus, t. j, p. 195, pl. 13.

Iris spuria. L'Iris des marais, t. jv, page 169.

Iris tuberosa. L'Hermoadacte, tome iv, pag. 123, pl. 340.

ISATIS *tinctoria*. Le Pastel, t. vj, p. 271, pl. 527.

IUGLANS *regia*. Le Noyer, t. v, p. 272, pl. 488.

JUNIPERUS *communis*. Le Genevrier, t. iv, pag. 30, pl. 308. Voyez le Sandraque, t. vij, p. 49.

Juniperus lycina. L'Encens, t. v, p. 288, pl. 130.

Juniperus sabina. La Sabine, tom. vij, page 2, pl. 630.

JUSTICIA. voy. l'Herbe des Charpentiers, t. iv, page 102, 104, pl. 330.

IXORA *coccinea*. Le bois d'Inde, t. ij, p. 130.

KÆMPFERIA *rotunda*. La Zédoaire, t. viij, pa. 143.

LACTUCA *sativa*. La Laitue pommée, la Laitue romaine, tom. iv, p. 233, pl. 373, 374.

Lactuca scariola. La Laitue sauvage, tom. iv, p. 234, pl. 375.

LAMIUM *album*. L'Ortie morte non puante, to. v, p. 334, pl. 509.

Lamium lævigatum. L'Ortie morte non puante, t. v, p. 335, pl. 510.

Lamium purpureum. L'Ortie morte puante, t. v, p. 335, pl. 511.

LAPSANA *communis*. La Lampsane, t. iv, pag. 238, pl. 377.

LASERPITIUM *siler*. Le Séseli commun. tom. vij, p. 155, pl. 680.

LAVANDULA *spica*. La Lavande mâle, t. iv, p. 249, pl. 385 et 386.

Lavandula stæchas. La Stæchas arabe. to. vij, p. 202, pl. 694.

LAURUS *benzoin*. Le Benjoin, t. ij, p. 91, pl. 87.

Laurus camphora. Le Camphdier, t. 2, pa. 206, pl. 134.

Laurus cassita. Casse qui sent le girofle, t. ij, p. 257, pl. 157 et 158.

Laurus cinnamomum. Le Cannelier, tome ij, p. 217, pl. 138.

Laurus culilaban. Ecorce de Culilawan, tom. iiij, page 215.

Laurus malabattrum. La Feuille indienne, t. iiij, p. 314, pl. 275.

Laurus nobilis. Le Laurier de France, tome iv, p. 245, pl. 382.

Laurus persea. L'Avocatier, t. j, p. 421, pl. 67.

Laurus sassafras. Le Sassafras, t. vij, pag. 76, pl. 295.

LAWSONIA *inermis*. L'Alcane vraie, t. j, p. 225.

LEMNA *minor*. La Lentille d'eau, tome jv, p. 243, pl. 388.

LEONURUS *cardiaca*. L'a-

gripaume, tom. j, p. 208, pl. 16.

LEONTODON *taraxacum*. La Dent de lion, tom. vj, p. 102, pl. 563,

LEPIDIUM *iberis*. La Passerage sauvage, t. vj, p. 23, pl. 526.

Lepidium latifolium. La Passerage, t. vj, p. 22, pl. 525.

Lepidium sativum. Le Cresson des jardins, t. iiij, p. 101, pl. 233.

LICHEN *caninus*. Mousse contre la rage, tome v, p. 182, pl. 447.

Lichen islandicus. Le Lichen d'Islande, t. iv, p. 263, pl. 392.

Lichen pulmonarius. Le Pulmonaire, de chêne t. vj, p. 194, pl. 588.

Lichen saxatilis. Mousse de crâne humain, t. v, p. 183, pl. 458.

LIGUSTICUM *leviticum*. Le Liveche, t. iv, page 302, pl. 407.

LIGUSTRUM *vulgare*. Le Troène, t. vij, pag. 383, pl. 740.

LILIUM *album*. Le Lys blanc, tom. iv, pag. 295, pl. 403.

LINUM *catharticum*. Le Lin purgatif, t. iv, p. 285, pl. 399.

Linum usitatissimum. Le Lin cultivé, tome iv, p. 282, pl. 398.

LIQUIDAMBAR *styracifolia*. Le Liquidambar,

- tom. iv, p. 294, pl. 402.
Styrax liquide, tom. vij, p. 206.
- LITHOSPERMUM** *arvense*.
 Le Grémil rampant, t. iv, p. 67, pl. 318.
Lithospermum officinale. Le Grémil, t. iv, p. 67, pl. 318.
- LONICERA** *periclymenum*.
 Le Chevrefeuille, t. ij, p. 349, pl. 194.
- LOTUS** *corniculatus*. Petit Lotier, tome vij, p. 328, pl. 737.
Lotus hirsutus. Trèfle Hemmoroidal, t. vij, p. 228, pl. 736.
- LUNARIA** *rediviva*. La Lunaire, t. iv, p. 318, pl. 411.
- LUPINUS** *albus*. Le Lupin, p. 319, pl. 412.
- LYCOPodium** *clavatum*.
 Mousse rampante à massue, t. v, p. 180, pl. 456.
- LYCOPERDON** *bovista*. La Vesse de Loup, tome ji, p. 298, pl. 172.
Lycoperdon. cervinum.
 La Truffe de Cerf, t. vij, p. 334, pl. 497.
Lycoperdon tuber. La Truffe d'Hiver, tome vij, p. 335.
- LYSIMACHIA** *nummularia*.
 La nummulaire, tome v, p. 276, pl. 486.
Lysimachia vulgaris.
 La Corneille, t. iij, p. 80, pl. 225.
- LYTHRUM** *salicaria*. La Salicaire, tome vij, p. 30, pl. 635.
- MALVA** *ægyptia*. Lalcée indienne, tome j, p. 227.
Malva alcea. Lalcée, t. j, p. 226, pl. 24.
Malva gangetica. Fausse Guimauve, t. iv, p. 89.
Malva rotundifolia. La petite Mauve, t. v, p. 41, pl. 426.
Malva sylvestris. La grande Mauve, t. v, page 40, pl. 425.
- MARANTA** *galanga*. Le Galanga, tome iv, p. 10, pl. 297 et 298.
- MARCHANTIA** *conica*.
 L'Hépatique commune, t. iv, p. 97, pl. 327.
- MARRUBIUM** *vulgare*. Le Marrube blanc, t. v, p. 26, pl. 421.
- MATRICARIA** *Chamomilla*. La Camomille ordinaire, t. ij, page 201, pl. 132.
Matricaria parthienium.
 La Matricaire, t. v, page 38, pl. 424, *bis*
- MELISSA** *Calaminta*. Le Calament ordinaire, t. ij, p. 196, pl. 125.
Melissa grandi flora.
 Le Calament de montagne, t. ij, p. 196, pl. 127.
Melissa officinalis. La Melisse, t. v, p. 83, pl. 430.
Melissa nepeta. Le Calament à odeur de Pouliot, t. ij, p. 196, pl. 126.
- MELLITIS** *Mellyssophilum*. La Melisse sauvage,

tome v, page 86, pl. 431.

MENISPERMUM *coculus*.

Coque du Levant, t. iij, page 71.

MENTHA *aquatica*. La Menthe aquatique, t. v, p. 94, pl. 438.

Mentha crispa. La Menthe frisée d'Allemagne, t. v, p. 92.

Mentha gentilis. La Menthe commune, t. v, p. 91, pl. 435.

Mentha pulegium. Le Pouliot commun, t. vj, p. 171, pl. 581.

Mentha rotundi folia. La Menthe sauvage, t. v, p. 95, pl. 439.

Mentha sativa. La Menthe frisée, tome v, p. 91, pl. 436.

Mentha viridis. La Menthe verte, t. v, p. 93, pl. 437.

MERCURIALIS *annua*. Le Mercuriale, t. v, p. 134; 135, pl. 440.

MESSIPUTUS *germanica*. Le Neflier, t. v, p. 236, pl. 473.

Messipulus pyracantha. Le Buisson ardent, t. ij, p. 178, pl. 119.

MIMOSA *Cathecua*. Le Cachou, t. ij, p. 184. Non *Areca cathecua*, pl. 120.

Mimosa Myrrifera. La Myrrhe, t. v., p. 215.

Mimosa nilotica. L'Acacia vrai, t. j, p. 178, pl. 5, Gomme de Sénégal, t. iv, p. 50, pl. 7.

Mimosa Senegal. L'Acacia du Sénégal, t. j, p. 181, pl. 7.

Mimosa sensitiva. L'herbe Mimeuse, t. vij, p. 143.

MIRABILIS *jalapa*. La Belle de nuit, t. ij, p. 88, pl. 85.

MOMORDICA *elaterium*. La Concombre sauvage, t. iij, p. 57, pl. 217.

MORUS *alba*. Le Mûrier blanc, t. v, p. 202, pl. 464.

Morus nigra. Le Mûrier noir, t. v, p. 201, pl. 463.

MUSA *paradisiaca*. Le Bananier, t. ij, p. 40, pl. 73.

Musa sapientum. Le Figuier Bananier, t. ij, p. 43.

MYAGRUM *sativum*. Cameline, t. ij, p. 200, pl. 131.

MYRICA *gale*. Myrthe du Brabant, t. v, p. 229, pl. 469.

MYRISTICA *officinalis*. Le Muscadier, t. v, p. 207, pl. 465.

MYROBALANUS *belliricus*. Myrobolan belliric, t. v, p. 212.

Myrobalanus chebulæ. Myrobolan chébule, t. v, p. 211, pl. 466.

Myrobalanus eithrina. Myrobalan citrin, t. 5, p. 212.

Myrobalanus indica nigra. Myrobalan noir, t. v, p. 211.

Myrobalanus emblica. Myrobolan emblic, t. v, page

- page 213, planche. 467.
MYRTHUS communis. Le Myrthe commun, t. v, p. 227 et 228, pl. 468.
Myrthus pimenta. Le Poivre de la Jamaïque, t. vj, p. 135, pl. 572.
NEPETA cataria. L'Herbe au Chat, t. iv, p. 104, pl. 331.
NERIUM antidysentericum. Le Codaga pala, t. iij, p. 46, pl. 212.
Nerium oleander. Le Laurier rose, t. iv, p. 248, pl. 281.
NICOTIANA tabacum. Le Tabac mâle ou vrai, t. vij, p. 243, pl. 701 et 702.
Nicotiana rustica. Le Tabac sémelle, t. vij, p. 244, pl. 703.
NIGELLA arvensis. La Nielle des champs, t. v, p. 241, pl. 477.
Nigella orientalis. La Nielle orientale, t. v, p. 243, pl. 479.
Nigella sativa. La Nielle romaine, t. v, p. 242, pl. 478.
NYMPHÆA alba. Le Nenuphar blanc, t. v, p. 238, pl. 474.
NYMPHÆA lutea. Le Nenuphar jaune, t. v, p. 239, pl. 475.
Ocymum basilicum. Le Basilic, tome ij, p. 47, p. 75.
Tome VIII.

- Ocymum minimum.* Petit Basilic, t. ij, p. 48, pl. 75.
OLEA europea. L'Olivier, t. v, p. 388, pl. 130.
ŒNANTHE aquatica. Persil des maïs, t. vj, p. 58, pl. 548.
ŒNANTHE pimpinelloides. L'Œnanthe, t. v, p. 280, pl. 281.
ŒNOTHERA biennis. L'Herbe aux Anes, t. iv, p. 99.
OLAMPI gommi. Gomme Olampi, t. iv, p. 51.
ONONIS arvensis. Bugrande, t. ij, p. 174, pl. 116.
ONOPORDUM acanthium. Le Charlon commun, t. ij, p. 308, pl. 178. Le Pet d'Ane, t. vi, p. 65, pl. 542.
OPHIOGLOSSUM vulgatum. petite Serpentaire, t. vij, p. 149, pl. 675.
OHIORRHIZA mungos. Racine de Serpent, t. vj, p. 236. *Ophris ovata*, la double feuille, t. iij, page 156, pl. 251.
ORCHIS mascula. L'Orchis, t. v, p. 314, pl. 496. Le Salep, t. vij, p. 39.
Orchis militaris. Le Satyrion à larges feuilles, t. v, p. 315, pl. 496.
ORIGANUM dictamnus. Le Dictame de Crete, t. iij, p. 141, pl. 247.
Origanum majorana. La marjolaine vulgaire, t. v, pl. 419.

- Origanum vulgare.*
L'Origan commun, t. v,
p. 319, pl. 499.
ORNITHOPUS perpusillus.
Le pied d'Oiseau, t. vi,
p. 76, pl. 557.
ORYZA sativa. Le Ris, t.
vi, p. 303, pl. 618.
OSMUNDA regalis. La fou-
gère fleurie, t. 3, p. 336,
pl. 284.
OXALIS acetosella. Le Pain
à Concou, t. vi, page 5,
pl. 516.

- P**
ÆONIA officinalis. La
Pivoine mâle, t. vi, page
104, pl. 565.
PANCRATIUM maritimum.
La Scille blanche, t. vij,
p. 117.
PANAX quinque folium. Le
Ginseng, t. iv, p. 39, pl.
310.
PANICUM dactylon. Le
Chiendent pied de Poule,
t. iij, p. 7, pl. 199.
Panicum italicum. Le
Panis, t. vi, page 14, pl.
521.
PANICUM miliaceum. Le
Millet commun jaune, t.
v, p. 148, pl. 445.
PAPAVER rhæas. Le Pavot
rouge des champs, t. vj,
p. 37, pl. 537.
Papaver somniferum.
Le Pavot blanc, t. vj, p.
34 et 36, pl. 534 et 536.
PARNASSIA palustris. Le
Parnassia, t. vj, p. 20.
PARIS quadrifolia. Le Rai-

- sin de Renard, t. vj, page
246, pl. 599.
PASTINACA sativa. Le Pa-
nais ordinaire de jardins,
t. vj, p. 12, pl. 519.
PASTINACA oppoponax.
L'opoponax, t. v, page
306, pl. 494.
PENÆA sarcocolla. La Sar-
cocole, t. vij, p. 71.
PETIVERIA alliacea. Le
faux Scordium, t. 2 page
295, pl. 171.
PEUCEDANUM officinale.
La Queue de Pourceau,
t. vj, p. 217, pl. 592.
Peucedanum silaus. Le
Saxifrage des Anglais, t.
vij, p. 97, pl. 652.
PEZIZA auricula. L'Oreille
de Judas, t. v, page 317,
pl. 497.
PHÆNIX dactylifera. Le
Palmier d'Attier, t. vj,
p. 7, pl. 518.
PHALLUS esculentus. La
Morille, t. v, p. 167, pl.
451.
PHASEOLUS lablab. Le La-
blab, t. iv, p. 203.
Phaseolus vulgaris.
Fève, t. iij, p. 317.
PHILLYREA media. La Fi-
laria, t. 3, page 325, pl.
280.
PHYSALIS alkekengi. L'Al-
kekengi, t. , 241, pl.
28.
PHYTEUMA spicata. La
Raiponce sauvage ordi-
naire, t. vj, p. 246, pl.
598.
PHYTOLACCA decandra. La

Morelle à grappes, t. v, p. 164, pl. 449.

PIMPINELLA *anisum*. L'Anis, t. j, page 322, pl. 48.

Pimpinella magna. La grande Saxifrage, t. vij, p. 97, pl. 654.

PINGUICULA *vulgaris*. La Grassette, t. iv, p. 63, pl. 315.

PINUS *pinea*. Le Pin, t. vj, p. 100, pl. 562.

Pinus pinea. LaThérebentine de Strashourg. t. vij, 281. pl. 713.

Pinus sylvestris. La Thérebentine commune, t. vij, p. 282, pl. 714.

PIPER *cubeba*. Les Cubebes, tome ij, p. 109, pl. 37.

Piper longum. Le Poivre long, t. vj, p. 132, pl. 571.

Piper nigrum. Le Poivre noir, t. vj, p. 130, pl. 570.

PISTACIA *lariæ*. La Thérebentine de Venise, t. 7, p. 280, pl. 712.

PISTACIA *lentiscus*. Le Lentisque, t. iv, p. 254, pl. 389.

Pistacia vera. Le Pistachier, t. vj, page 104, pl. 564, la Thérebentine de Cho, t. vij, p. 279, pl. 711.

PISUM *sativum*. Le Pois commun, t. vj, p. 125, pl. 568.

PLANTAGO *cynops*. L'Her-

be aux Puces, t. iv, page 116, pl. 336.

Plantago lanceolata. Le petit Plantin, t. vj, p. 108 pl. 566.

Plantago major. Le grand Plantin, t. 6, page 107, pl. 566.

Plantago media. Le Plantin moyen, t. vj, p. 107, pl. 566.

Plantago psyllium. L'Herbe aux Puces annuelle, tome iv, p. 116, pl. 336.

POINCIANA *pulcherrima*. La Poincillade, t. vj, p. 120.

POLYGALA *senega*. La Polygala de Virginie, t. vj, p. 140.

Polygala vulgaris. La Polygala commune, t. vj, p. 139, pl. 575.

POLYGONUM *aviculare*. La Renouée, t. v, p. 270, pl. 609.

Polygonum bistorta. La Bistorte, t. ij, p. 109, pl. 94.

Polygonum fagopyrum. Le Sarrazin, t. vij, p. 73, pl. 642.

Polygonum hydropiper. La Persicaire âcre, t. vj, p. 54, pl. 544.

Polygonum persicaria. La Persicaire, t. vj, page 52. pl. 543.

POLYPODIUM *felix mas*. La fougère male, t. 3, p. 333, pl. 282.

Polypodium fontanum.
H h ij

- Le Capilaire blanc , t. ij ,
p. 233 , pl. 141.
Polypodium vulgare.
Le Polypode de chêne ,
t. vj , p. 142 , pl. 576.
POLYTRICHUM *commune.*
Le Capillaire doré , t. ij ,
p. 236 , pl. 143.
POPULUS *alba.* Le Peu-
plier , t. vj , p. 66 , pl. 554.
Populus balsamifera.
Le Tacamahaca , t. vj , p.
250 , pl. 705.
Populus nigra. Le Peu-
plier noir , t. vj , p. 67 , pl.
554.
PORTULACA *oleracea.* Le
Pourpier , t. vj , p. 172 et
173 , pl. 582.
POTENTILLA *anserina.*
L'Argentine , t. j , p. 380 ,
pl. 53.
Potentilla repens. La
Qninte feuille commune ,
t. vj , 234 , pl. 592.
POTERIUM *sanguisorba.*
La Pimprenelle , t. vj , p.
94 , pl. 560.
PRINOS *glaber.* L'Alaterne
Cassine , t. j , p. 223.
PRIMULA *veris.* La Prime-
vère , t. vj , page 176 , pl.
584.
PRUNELLA *vulgaris.* La
Ptunelle , t. ij , page 167 ,
pl. 111.
PRUNUS *armeniaca.* L'A-
bricotier , t. j , page 169 ,
pl. 2.
Prunus avium. Le Mé-
risier , t. ij , p. 291 , pl.
168.
Prunus cerasus. Le

- Cerisier , t. ij , page 289 ,
pl. 167. Gomme de notre
pays , t. iv , p. 52.
Prunus domestica. Le
Prunier , t. vj , p. 179 ,
pl. 585.
Prunus spinosa. Le
Prunier sauvage , t. j , p.
181 , pl. 7.
PSIDIUM *pyriferum.* Le
Guaiavier , t. iv , p. 82.
PSORALEA *bituminosa.* Le
Trèfle odorant , t. vij , p.
327 , pl. 735.
PSYCHOTRIA *emetica.*
L'lpecacuanha du Brésil ,
t. iv , p. 161.
PTEROCARPUS *draco.* Le
Sang de Dragon des In-
des , t. vij . p. 54 , pl. 638.
PTEROCARPUS *santalinus.*
Le Santal , t. vij , p. 65.
PULMONARIA *angustifo-
lia.* La petite Pulmonai-
re , t. vj , p. 192.
Pulmonaria officinalis.
La grande Pulmonaire ,
t. vj , p. 192 , pl. 586.
PUNICA *granatum.* Le Gre-
nadier , t. iv , p. 68 , pl.
322.
PYROLA *rotundifolia.* La
Pyrole , t. vj , page 213 ,
pl. 590.
PYRUS *communis.* Le Poi-
rier domestique , t. vj , p.
133 , pl. 567.
PYRUS *cydonia.* Le Coi-
gnassier , t. 3 , p. 48 , pl.
213.
PYRUS *malus.* Le Pommier
cultivé , t. vj , p. 148 ,
pl. 579.

QUASSIA *simaruba*. Le Simarouba, t. vij, p. 164, pl. 682.

QUERCUS *ilex*. Le Kermès, t. iv, p. 196, pl. 369.

Quercus robur. Le Chêne commun à larges feuilles, t. ij, p. 328, pl. 187.

Quercus suber. Le Liège, t. 4, p. 266, pl. 393.

RANUNCULUS *bulbosus*. La Renoncule bulbeuse, t. vj, p. 265, pl. 605.

Ranunculus ficaria. Petite chelidoine, t. ij, p. 327, pl. 186.

Ranunculus repens. La Renoncule des prés, t. vj, p. 267, pl. 609.

Ranunculus sceleratus. La Renoncule des marais, t. vj, p. 268, pl. 608.

RAPHANUS *sativus*. Le Raifort cultivé, t. vj, p. 241, pl. 593.

RESEDA *lutea*. L'Herbe maure, t. iv, p. 111.

Reseda luteola. La Gaude, t. iv, p. 27, pl. 316.

RHAMNUS *alaternus*. L'Alaterne, t. j, p. 222, pl. 22.

RHAMNUS *catharticus*. Le Nerprun, t. v, p. 240, pl. 476.

RHAMNUS *frangula*. Le Bourgène ou aune noir, t. 2, p. 156, pl. 106.

RHAMNUS *ziziphus*. Le Ju-

jubier, t. iv, p. 182, pl. 364.

RHEUM *palmatum*. Lavraie Rhubarbe, t. vj, p. 287, pl. 612. La figure est celle du *Rheum Rhabarbarum*.

Rheum raponticum. Le Rapontic, t. vj, p. 283, pl. 610.

RHIZOPHORA *mangle*. La Mangle, t. v, p. 9.

RHUS *copallinum*. La Gomme Copal, t. iij, p. 64, pl. 220.

Rhus coriaria. Le Sumac ordinaire, t. vij, p. 233, pl. 698.

Rhus Typhinum. Le Sumac des jardins, t. vij, p. 234, pl. 698.

Rhus vernix. Le Vernis de la Chine, t. vitj, p. 27.

RIBES *glossularia*. Le Groseiller à maquereau, t. iv, p. 77, pl. 322.

Ribes nigrum. Le Groseiller noir, t. iv, p. 80, pl. 323.

Ribes rubrum. Le Groseiller rouge, t. iv, p. 78, pl. 332.

RICINUS *communis*. Le Ricin commun, tome vj, p. 296, pl. 614.

ROBINIA *pseudo acacia*. L'Acacia commun, le faux acacia, t. j, p. 179, pl. 6.

ROSA *alba*. La Rose blanche, t. vj, p. 310, pl. 624.

Rosagallica. La Rose pâle, tom. vj, page 312, pl. 624.

- Rosa rubiginosa*. La Rose sauvage, tome vj, p. 314, pl. 626.
- Rosa semper virens*. La Rose musquee, t. vj, p. 113, pl. 625.
- ROSMARINUS *officinalis*. Le Romarin, t. vj, p. 306, pl. 620.
- RUBIA *tinctorum*. La Garance, tome iv, page 18, pl. 302.
- RUBUS *fruticosus*. La Ronce ordinaire, t. vj, p. 307, pl. 621.
- Rubus idæus*. Le Framboisier, tome iij, p. 346, pl. 288.
- RUMEX *acetosa*. L'Oseille ordinaire, t. v, page 339, pl. 514.
- Rumex alpinus*. La Rhubarbe bâtarde, t. vj, p. 294.
- Rumex aquaticus*. La Patience aquatique, t. vj, p. 33, pl. 533.
- Rumex crispus*. La Patience sauvage, frisée, t. vj, p. 32, pl. 532.
- Rumex obtusifolius*. La Patience sauvage, t. vj, p. 3, pl. 531.
- Rumex patientia*. La Patience, t. vj, p. 29 et 295, pl. 528 et 613.
- Rumex pulcher*. Le Lathyrion violon, tome vj, p. 30, pl. 529.
- Rumex sanguineus*. La Patience rouge, tome vj, p. 30, pl. 530.
- Rumex scutatus*. L'O-
- seille ronde, t. v, p. 341, pl. 514.
- RUSCUS *aculeatus*. Le Houx Irélon, t. iv p. 138, pl. 346.
- Ruscus hypophyllum*. Le Laurier alexandrin, t. iv, p. 246, pl. 383.
- UTA *graveolens*. La Rue des jardins, t. vj, p. 320, pl. 628.
- SACCHARUM *officinarum*. L'Erable à sucre, t. vij, p. 224, pl. 696.
- SALICORNIA *herbacea*. La grande Soude, tome vij, p. 178, pl. 689.
- SALIX *alba*. La Saule vulgaire, t. vij, p. 81, pl. 647.
- Salix caprea*. La Saule marseau, t. vij, page 82, pl. 648.
- SALSOLA *kali*. La Soude épineuse, t. vij page 179, pl. 690.
- SALVIA *hispanica*. La Sauge de Catalogne, t. vij, p. 80, pl. 645.
- Salvia officinalis*. La grande Sauge, tome vij, p. 78, pl. 645 et 646.
- Salvia pratensis*. L'Orvale sauvage, t. v, p. 338, pl. 513.
- Salvia sclarea*. L'Orvale, t. v, p. 336, pl. 512.
- SAMBUCUS *ebulus*. L'Iéble, t. iv, p. 149, pl. 352.
- Sambucus nigra*. Le Sureau commun, t. vij, p. 236, pl. 699.
- SAMOLUS *valerandi*. Le

- Mouron aquatique, t. v, p. 179, pl. 455.
- SANICULA europea*. La Sanicle, t. vij, p. 63, pl. 640.
- SANTOLINA chamæ cyparissus*. L'Aurone fémelle, t. j, p. 418, pl. 65.
- SAPONARIA vulgaris*. La Savonière, t. vij, page 92, pl. 649.
- SATUREIA capitata*. Le Thym de Crète, tome vij, p. 304, pl. 721.
- Satureia hortensis*. La Sariette, t. vij, page 74, pl. 643.
- Satureia juliana*. La Sariette vivace, tome vij, p. 75, pl. 644.
- SAXIFRAGA granulata*. La Saxifrage blanche, t. vij, p. 94, pl. 650.
- Saxifragatridactylites*. La petite Saxifrage rouge, t. vij, p. 95, pl. 651.
- SCABIOSA arvensis*. La Scabieuse ordinaire des prés, t. vij, p. 101, pl. 655.
- Scabiosa succisa*. La Scabieuse des bois, t. vij, p. 102, pl. 656.
- SCANDIX cerfolium*. Le Cerfeuille, t. ij, p. 287, pl. 165.
- Scandix odorata*. Le Cerfeuille musqué, t. ij, p. 287, pl. 166.
- Scandix pecten*. L'aiguille ou peigne de Vénus, tome j, p. 212, pl. 19.
- SCILLA maritima*. La Scille rouge, t. vij, page 114, pl. 661.

- SCORZONERA hispanica*. Le Scorsonère, tome vij, p. 125, pl. 666.
- SCROPHULARIA nodosa*. La Scrophulaire, t. vij, p. 126, pl. 667.
- Scrophularia aquatica*. La Scrophulaire aquatique, t. vij, p. 127, pl. 668.
- SCUTELLARIA galericulata*. La Centaurée bleue, t. ij, p. 272, pl. 162.
- SECALE cereale*. Le Seig'le, t. vij, p. 131, pl. 671.
- SEDUM acre*. La Joubarbe âcre, tome iv, page 181, pl. 364.
- Sedum album*. La petite Joubarbe, t. iv, pag. 180, pl. 363.
- Sedum telephium*. L'Orpin rose, t. v, page 326, pl. 503.
- SELINUM palustre*. Persil des marais, t. vj, p. 58, pl. 547.
- SEMPERVIVUM tectorum*. La grande Joubarbe, t. iv, p. 179, pl. 362.
- SENECIO abrotanifolia*. L'Achillée, t. j, p. 187.
- Senecio jacobea*. La Jacobée, t. iv, p. 172, pl. 359.
- Senecio vulgaris*. Le Seneçon, t. vij, p. 139, pl. 672.
- SERRATULA tinctoria*. La Serrette, t. vij, p. 152, pl. 677.
- SEZAMUM orientale*. La Sézanne, t. vij, p. 154.
- SIDERITIS hirsuta*. La
- H h ix

- Crâpaudine , t. iij, p 99 ,
pl. 232.
- SINAPIS** *alba*. La Moutarde
blanche, t. v, page 185,
pl. 460
Sinapis nigra. La Mou-
tarde, t. v, p. 185, pl. 459.
- SISYMBRIUM** *amphibium*.
Le Raifort d'eau, t. vj,
p. 243, pl. 595.
Sisymbrium silvestre.
Le petit Cresson sauvage,
t. iij, p. 105, pl. 236.
Sisymbrium nasturtium
Le Cresson de fontaine,
t. iij p. 103, pl. 235.
Sisymbrium palustre.
Le Raifort des marais,
t. vj, p. 244, pl. 596.
Sisymbrium isophia. La
Science des chirurgiens,
t. vij, p. 297, pl. 716.
- SISON** *ammi*. L'Ammi, t. j,
p. 275, pl. 3.
Sison amomum. Le Si-
son, t. vij, p. 170.
- SIUM** *angustifolium*. La
Berle, t. ij, p. 97, pl. 90.
Sium ninsi. Le Ninzier,
t. v, p. 244, pl. 310.
Sium sisarum Le Cher-
vi, t. ij, p. 331, pl. 189.
- SMILAX** *aspera*. Le Liseron
rude, t. iv, p. 297, pl. 404.
Smilax aspera. La Sal-
se pareille, t. vij p. 47,
pl. 613.
Smilax china. La Squi-
ne, t. vij p. 197, pl. 691.
Smilax pseudo-china.
La Squine d'occident, *id.*
- SMYRNIUM** *osulatum*. Le
Maceron t. v, p. 1, pl. 413.

- SOLANUM** *dulcamara*. La
Douce amère, t. v, p. 161,
pl. 447.
Solanum lycopersicum.
La Pomme d'amour, t. vj,
p. 145.
Solanum melongena.
La Melongène, tome v,
p. 88, pl. 433.
Solanum nigrum. La
Morelle commune à fruit
noir, t. v, p. 163, pl. 448.
Solanum tuberosum. La
Pomme de terre, t. vij,
p. 336, pl. 741.
- SOLIDAGO** *minuta*. La Ver-
ge d'or à feuilles étroites,
t. vijj, p. 21, pl. 751.
Solidago virgaurea. La
Verge d'or à larges feuil-
les, t. vijj. p. 21.
- SONCHUS** *oleraceus*. Le Lai-
tron doux, t. iv, p. 230,
pl. 371 et 372.
- SORBUS** *aucuparia*. Le Sor-
bier des oiseleurs, t. vij,
p. 174.
Sorbus domestica. Le
Sorbier, t. vij, page 173,
pl. 686.
- SPARTIUM** *junceum*. Le
Genêt d'Espagne, t. iv,
p. 29, pl. 307.
- SPIGELIA** *anthelmia*. La
Spigelie, t. vij, p. 197.
- SPINACIA** *oleracea* L'Epi-
nard mâle et femelle,
t. iij, p. 247, pl. 261.
- SPIRÆA** *filipendula*. La Fi-
pendule, tome iij, p. 326,
pl. 281.
Spiræa ulmaria. La
Filipendule, tome vj,

page 258, planche 603.
SPONDIAS *myrobalanus*.
 Prunes de Monbain, t. vj,
 p. 178.

STACCHIS *palustris*. La
 petite Ortie puante, t. v,
 p. 333, pl. 507.

Stacchis sylvatica. La
 grande Ortie puante, t. v,
 p. 331 pl. 506.

STATICE *armoria*. La Sta-
 tice, t. vij, p. 201, pl. 693.

STRYCHNOS *nux vomica*.
 La Noix vomique, t. v,
 p. 267, pl. 481 et 482.

STYRAX *officinalis*. Le Sto-
 rax calamite, t. vij p. 207,
 pl. 695.

SYMPHITUM *officinale*. La
 grande Consoude, t. iij,
 p. 60, pl. 218.

SYRINGA *vulgaris*. Le Lilas
 ou Lilac, t. iv, page 275,
 pl. 396. T. vij, p. 239.

T **AMARINDUS** *indica*. Le
 Tamarin, t. vij, p. 252,
 pl. 706.

TAMARIX *gallica*. Le Ta-
 marisc ordinaire, t. vij,
 p. 259, pl. 708.

Tamarix germanica.
 Le Tamarisc, tome vij.
 p. 258, pl. 707.

TAMUS *communis*. Sceau
 de notre Dame, t. vij,
 p. 112, pl. 659.

TANACETUM *vulgare*. La
 Tanasie ordinaire, t. vij,
 p. 260, pl. 709.

TAXUS *baccata*. L'If, t. iv,
 p. 150, pl. 353.

TEUCRIUM *botrys*. L'Ivette
 musquée, t. iv, p. 171,
 pl. 357.

Teucrium chamædis.
 Le petit Chêne, tome ij,
 p. 330, pl. 188.

Teucrium chamæpitys.
 L'Ivette ordinaire, t. iv,
 p. 170, pl. 356.

Teucrium luteum. Po-
 lion des montagnes à fleurs
 jaunes, t. vj, p. 137, pl.
 574.

Teucrium multiflorum.
 Le Marum Mastich, t. v,
 p. 32, pl. 424.

Teucrium marum. Le
 Marum vrai, t. v, p. 31,
 pl. 423.

Teucrium scordium. Le
 Chamaras, t. ij, p. 293,
 pl. 170.

THALICTRUM *flavum*. Le
 Thalictron, t. vij, page
 297, pl. 716.

THEA *bohea*. Le Thé bouc,
 t. vij, p. 299, pl. 717.

THEOBROMA *cacao*. Le
 Cacaotier, t. ij, p. 181,
 pl. 119.

THLASPI *arvense*. Le Thlas-
 pi des champs, t. vij, p.
 303, pl. 719.

Thlaspi bursa pastoris.
 Le Tabouret, t. vij, p.
 249, pl. 704.

Thlaspi campestre. Le
 Thlaspi ordinaire, t. vij,
 p. 302, pl. 718.

THYMUS *communis*. Le
 Thym commun, t. vij,
 p. 305, pl. 720.

Thymus serpyllum. Le

- Serpolet, t. vij, p. 150, pl. 676.
- TILIA** *europæa*. Le Tilleul, t. vij, p. 307, pl. 722.
- TOLVIFERA** *balsamum* Le Baume de Tolu, tome ij, p. 60.
- TORDYLIUM** *officinale*. Le Seseli de Candie, t. vij, p. 156, pl. 681.
- TORMENTILLA** *vulgaris*. La Tormentille, t. vij, p. 316, pl. 729.
- TRAGOPOGON** *porrifolium*. Le Sersifi, t. vij, p. 153, pl. 678.
Tragopogon pratense. Le Sersifi sauvage, t. vij, p. 154, pl. 679.
- TRAPA** *natans*. La Tribule aquatique, t. vij, p. 330, pl. 739.
- TREMELLA** *nostoch*. Mousse membraneuse, t. 5, p. 181, pl. 445.
- TRIBULUS** *terrestris*. Le Tribule terrestre, t. vij, p. 329, pl. 738.
- TRIFOLIUM** *arvense*. Le petit Trefle des champs, t. vij, p. 326, pl. 734.
Trifolium pratense. Le Trèfle commun, t. vij, p. 325, pl. 733.
Trifolium melilotus cærulea. Le Lotier odorant, t. iv, p. 308, pl. 409.
Trifolium melilotus officinalis. Le Melilot, t. v, p. 81, pl. 429.
- TRIGONELLA** *fœnum græcum*. Le Fénu grec, t. ij, page 299, pl. 274.
- TROLLIUS** *asiaticus*. L'Elebore noir d'Orient, t. ij, p. 235, pl. 256.
- TROPEOLUM** *majus*. La grande Capucine, t. ij, p. 239.
- TRITICUM** *hybernum*. Le Froment, t. ij, p. 353, pl. 291.
- TUSSILAGO** *furfara*. Le Tussilage, t. vij, p. 344, pl. 744.
Tussilago petasites. La Petasite, t. vj, p. 65, pl. 553.
- VACCINIUM** *oxicoccus*. Le Canneberge, t. ij, p. 216, pl. 137.
Vaccinium vitis idæa. L'Airelle, t. j, p. 221, pl. 21.
- VALANTIA** *cruciata*. La Croisette, t. -ijj, p. 106, pl. 237.
- VALERIANA** *celtica*. Le Nard celtique, t. 5, page 232, pl. 470.
Valeriana dioica. La Valeriane des prés, t. viij, p. 6, pl. 747.
Valeriana officinalis. La Valeriane sauvage, t. viij, p. 5, pl. 746.
Valeriana locusta. La Mâche, tome v, p. 2, pl. 414.
Valeriana phu. La Valeriane des jardins, t. viij, p. 2, pl. 745.
Valeriana tripteris. Le

- Nard de montagne, t. v, p. 234, pl. 471.
Valeriana tuberosa. Le Nard des Alpes, t. v, p. 234, pl. 470.
- VERATRUM *album*. L'Ellebore blanc, t. iiij, p. 231, pl. 255.
Veratrum sabadilli. La Sabadilli, t. vij, p. 1.
- VERBASCUM *tapsus*. Le Bouillon blanc mâle, t. ij, p. 150, pl. 105.
- VERBENA *officinalis*. La Verveine, t. viij, p. 32, pl. 757.
- VERBESINA *calendulacea*. L'Acnelle, t. i, p. 190.
- VERONICA *beccabunga*. Le Beccabunga, t. ij, p. 69, pl. 82.
- VERONICA *chamædris*. La Véronique des bois, t. viij, page 30, planche. 754, 755.
Veronica officinalis. La Véronique mâle, t. viij, p. 29, pl. 752.
Veronica spicata. La Véronique à épi, t. viij, p. 31, pl. 756.
Veronica teucrium. La Véronique des prés, t. viij, p. 30, pl. 753.
- VIBURNUM *lantana*. La Viourne, t. viij, p. 78, pl. 761.
Viburnum opulus. L'O-bier, tome 5, p. 276, pl. 487.
- VICIA *sativa*. La Vesce noire ou commune, tom. viij, p. 36, pl. 758.
- Vicia faba* La Fève de marais, t. iiij, p. 315, pl. 276.
- VINCA *major*. La grande Pervenche, t. 6, p. 62, pl. 551.
Vinca minor. La Pervenche commune à feuilles étroites, t. vj, p. 61, pl. 551.
- VIOLA *odorata*. La Violette de Mars, t. viij, p. 76, pl. 760.
Viola ipecacuanha. L'Ipécacuanha blanc, t. iv, p. 161.
- VISCUM *album*. Le Gui commun, t. iv, pag. 83, pl. 325.
- ULMUS *campestris*. L'Orme, t. v, page 321, pl. 500.
- ULVA *latissima*. L'Algue porte sucre, tome j, p. 232.
- URTICA *dioica*. L'Ortie vulgaire, t. v, p. 327, pl. 504.
Urtica pilulifera. L'ortie romaine, t. v, p. 329, pl. 505.
Urtica urens. L'Ortie grièche, t. v, page 328, pl. 504.
- VITEX *agnus castus*. L'Agnus castus, t. j, p. 206, pl. 15.
- VITIS *vinifera*. La Vigne, t. viij, pl. 759.
- WINTERANA *canella*. La Cannelle blanche, t. ij, p. 221, pl. 138.

XANTHIUM *strumarium*.
La petite Bardane, tom.
ij, page 46, planche
74. *bis*.

ZEA *mays*. Le Mais, t.
v, p. 5, pl. 415.
ZOSTERA *oceanica*. L'Al-
gue commune, tome j,
page 231, pl. 25.

T A B L E

S U I V A N T L E S Y S T Ê M E

D E

C H A R L E S L I N N É.

§. I I.

R È G N E M I N É R A L.

A N

A N

AETITES *aquilinus*. La
pierre d'Aigle, t. vj, p. 80.

AGARICUS *mineralis*. L'A-
garic minéral marne, t. v,
p. 23.

ALUMEN *commune schisti*.
L'Alun, t. j, p. 256.

Alumen saphirus. Le
Saphir, t. vij, p. 69.

AMBRA *ambrosiaca grisea*.
L'Ambre gris, t. j, page
267.

AMIANTHUS *plumosus*.
L'Alun en plume, t. j,
p. 256.

AMMONIACUM *sal*. Le Sel
Ammoniac, t. j, p. 278.

ANTIMONIUM *crudum*.

L'Antimoine, t. j, p. 333.

AQUA. Eau, tome iij,
p. 158.

AQUÆ *Alectenses*. Les
eaux de Rennes, t. iij,
p. 208.

Aquæ Amandinæ. Les
eaux de Saint-Amand,
t. iij, p. 180.

AQUÆ *Acausenses*. Les eaux
d'Ancouse, t. iij, p. 180.

Aquæ Antonianæ. Les
eaux de Tillerborn, t. iij,
p. 172.

Aquæ Bagnerienses.
Les eaux de Bagnières,
t. iij, p. 185.

Aquæ Balneolenses.

Les eaux de Bagnols ,
t. iij , p. 185.

Aquæ Baregienses. Les
eaux de Barèges , t. iij ,
p. 187.

Aquæ Bellilucanæ. Les
eaux de Balaruc , t. iij ,
p. 185.

Aquæ Bonenses. Les
eaux de Bones , t. iij ,
p. 187.

Aquæ Bononienses. Les
eaux de Boulogne , t. iij ,
p. 166.

*Aquæ Borbonicæ Ar-
cimbaldicæ.* Les eaux de
Bourbon l'Archambaut ,
t. iij , p. 189.

*Aquæ Borbonienses
Anselmienses.* Les eaux
de Bourbon Lancy , t. iij ,
p. 190.

Aquæ Cauterisenses. Les
eaux de Cauterets , t. iij ,
p. 194.

Aquæ Cranenses. Les
eaux de Cransac , t. iij ,
p. 166.

Aquæ Danielicæ. Les
eaux de Daniel , tom. iij ,
p. 167.

Aquæ Dinienses. Les
eaux de Digne , tome iij ,
p. 198.

Aquæ Egranæ. Les eaux
d'Egra , t. iij , p. 167.

Aquæ Embsenses. Les
eaux d'Embs , tome iij ,
p. 200.

Aquæ forgienses. Les
eaux de forges , tom. iij ,
p. 168.

Aquæ Hirschbergenses.

Les eaux d'Hirschberg ,
t. iij , p. 201.

Aquæ Jaudenses. Les
eaux de Jaude , tom. iij ,
p. 201.

Aquæ Malovenses. Les
eaux de Malou , tome iij ,
p. 202.

Aquæ Marcænæ. Les
eaux de Saint - Marc ou
de Saint-Mars , tome iij ,
p. 202.

Aquæ Mainenses. Les
eaux de Meine , tome iij ,
p. 169.

Aquæ minerales. Les
eaux minérales , tome iij ,
p. 165.

Aquæ Montferinenses.
Les eaux de Montfrin , t.
iij , p. 169.

Aquæ Montis - Aurei.
Les eaux du Mont-d'Or ,
t. iij , p. 203.

Aquæ Passianæ. Les
eaux de Passy , tome iij ,
p. 170.

Aquæ Plumberianæ. Les
eaux de Plombières , t. iij ,
p. 207.

Aquæ Provinenses. Les
eaux de Provins , t. iij ,
p. 170.

Aquæ Pyrmontanæ.
Les eaux de Pyrmont , t.
iij , p. 170.

Aquæ Reginenses. Les
eaux de Sainte - Reine ,
t. iij , p. 171.

Aquæ Selteranæ. Les
eaux de Seltz , tome iij ,
p. 171.

Aquæ Schwalbacenses.

Les eaux de Schwalbach, t. iij, p. 171.

Aquæ Spadanæ. Les eaux de Spa, tome iij, p. 172.

Aquæ Tarbellicæ. Les eaux de Dax, tome iij, p. 197.

Aquæ Tercienses. Les eaux de Tercis, tome iij, p. 209.

Aquæ Vallenses. Les eaux de Vals, tome iij, p. 173.

Aquæ Vervonenses. Les eaux de Bourbonne, t. iij, p. 191.

Aquæ Vesullenses. Les eaux de Vesoul, tom. iij, p. 174.

Aquæ Veyrenses. Les eaux des Maîtres de Veyre, t. iij, p. 203.

Aquæ Vicienses. Les eaux de Vichy, tome iij, p. 211.

Aquæ Vicus Comitis. Les eaux de Vic-le-Comte, t. iij, p. 210.

Aquæ Wildugenses. Les eaux de Wildungen, tom. iij, p. 175.

Aquæ Wisbadenses. Les eaux de Wisbad, t. iij, p. 213.

Aqua marina. L'eau de la mer, t. iij, p. 165.

ARGENTUM nativum. L'Argent, t. j, p. 376.

ARGILLA bolus. Le Bol, t. ij, p. 135.

ARSENICUM sandaraca. L'Orpiment rouge, t. vj, p. 253.

AUREUM nativum. L'Or, t. v, p. 307.

BITUMEN asphaltum. Le Bitume de Judée, t. ij, p. 110.

Bitumen liquidum. L'Huile de Pétrole, t. iv, p. 139.

BORAX smaragdus. L'Émeraude, t. iij, p. 238.

Borax tincal. Le Borax, t. ij, p. 140.

CALCULUS bezoard. Le Bezoard, t. ij, p. 104.

CALX creta. La Craie blanche, t. iij, p. 92.

CARBO terreus. Le Charbon de terre, t. ij, p. 303.

COBALTUM arsenicula. Le Cobalt, t. j, p. 393.

CUPRUM armenus. La Pierre d'Arménie, t. vj, p. 81.

Cuprum lazuli. La pierre d'azur, t. vj, p. 82.

Cuprum nativum. Le Cuivre, t. iij, p. 112.

DENTALE arcuatum. Le Dentale, t. iij, p. 133, pl. 50.

FERRUM hematicum. Pierre hématite, t. vj, p. 83.

Ferrum magnes. L'Aimant, t. j, p. 217.

Ferrum salcatum. Le fer, t. iij, p. 300.

FLUOR *amethystus*. L'Améthyste, t. vj, p. 81.

GLOSSOPETRA. La Glossopetre, t. iv, p. 239.

GYPsum *alabastrum*. L'Albâtre, t. vj, p. 80.

HELMENTOLITUS *belemnites*. La Belemnite, t. ij, p. 80.

Helmintholitus judaicus. Pierre de Judée, t. vj, p. 87.

HYDRARGYRUS *virgineus*. Le Mercure vierge, t. v, p. 96.

JASPIs. Jaspe, tome vj, page 87.

LAPIS *bononiensis*. Pierre lumineuse, t. vj, p. 88.

Lapis calcavius. La pierre à Chaux, tom. ij, p. 321.

Lapis hybernicus. La pierre d'Hybernie, tome vij, p. 87.

Lapis Serpentinus. La pierre de Serpent, tome vj, p. 90.

MICA *talcosa*. Le Talc, t. vij, 251.

NATRUM *glaciale*. La

pierre spéculaire, tome vj, p. 89.

NITRUM *chrystallus montana*. Le Chrystal de Roche, t. iij, p. 107.

Nitrum nativum. Le Nitre, t. v, p. 247.

ONYCHITES. L'Onix, t. v, p. 294.

OPALUS. L'Opale, tome v, p. 295.

PISSAPHALTUS. La Pissaphalle, t. vj, p. 101.

PLUMBUM *nativum*. Le Plomb. Voy. Bismuthum. *Plumbum nativum*. Le Plomb, t. vj, p. 110.

PUMEX *volcani*. La pierre Ponce, t. vj, p. 89.

PYRITES *vivus*. Le Soufre natif, t. vij, p. 180.

SAL *commune*. Le Sel commun, tome vij, page 132.

SILEX *carneolus*. L'Agathe, t. j, p. 203.

SMERILLUS. L'Émeril, t. iij, p. 239.

STANNUM *chrystallinum*. L'Etain, t. iij, p. 271.

STIRIUM *gipseum*. L'Alun verdâtre, t. j, p. 256.

SUCCINUM *electricum*. Le Succin, t. vij, p. 209.

Succinum nigrum. Le Jayet, tome iv, p. 173.

TALCUM

TALCUM *nephreticus*. La pierre néphrétique, t. vj, p. 89.

Talcum rubra. La craie rouge, t. iij, p. 94.

TARTARUM *vini*. Le Tartre, t. vij, p. 264.

THERMÆ *Badenses*. Les eaux de Bade, t. iij, p. 182.

Thermæ Carolinæ. Les eaux de Carlsbad, t. iij, p. 193.

Thermæ aquisgranenses. Les eaux d'Aix-la-Chapelle, t. iij, p. 178.

Thermæ Sextienses. Les eaux d'Aix en Provence, t. iij, p. 179.

THERMALES *Mottenses*. Les eaux de la Motte, t. iij, p. 207.

TOPHUS *osteocollus*. L'Osteocolle, t. v, p. 342.

TUTIA *vulgaris*. La Tutie, t. vij, p. 345.

VITRIOLUM *martis*. Le Vitriol, t. viij, p. 120.

VISMUTUM *naticum*. Le Bismuth, t. ij, p. 107.

UNICORNU *fossile*. L'Unicorne fossile, tome viij, page 1.

ZINCUM *calaminaris*. La pierre calaminaire, t. vj, p. 82.

ZINCUM *mineralizatum*. Le Zinc, t. viij, p. 148.

T A B L E

S U I V A N T L E S Y S T È M E

D E

C H A R L E S L I N N É.

§. I I I.

R È G N E A N I M A L.

A P

ACIPENSER *sturio*. L'Esturgeon, t. iij, p. 269, pl. 266, poisson.

ALAUDA *vulgaris*. L'Alouette ordinaire, t. j, p. 253, pl. 32, oiseau.

ALCEDO *ispida*. Le Martin, pêcheur, t. v, p. 29, pl. 32, ois.

ALOSA seu *Clupea*. L'Alose, tome j, p. 252, pl. 31, poiss.

ANAS *Anser*. L'Oye, t. v, p. 281, pl. 490, ois.

Anas boschas. Le Canard sauvage, t. ij, p. 215, pl. 136, ois.

APIS *mellifica*. L'Abeille,

A R

tome j, p. 161, planc. 1, insecte.

AQUILA *aquatica*. L'Anhima, tome j, p. 313, ois.

Aquila regalis. L'Aigle royal, t. j, p. 209, pl. 17, ois.

ARANEUS *domesticus*. L'Araignée, t. j, p. 371, pl. 51, inse.

ARDEA *ciconia*. La Cigogne, tome iij, p. 17, pl. 202, ois.

Ardea Cinerea. Le Héron gris, tom. iv, p. 125, pl. 341, ois.

Ardea Grus. La Grue,

- tome 4 , p. 81 , pl. 324.
Oiseau.
- A**SELLUS *merluccius*. La
La Morue, le Cabelian,
tome v , pag. 168 , pl. 45.
Poisson.
- B**ALÆNA *officinalis*. La
Baleine , t. ij , p. 9 , pl.
70. *Poisson.*
Balæna minor. Petite
Baleine , le Cachalot , t.
ij , p. 23 , pl. 70. *Poisson.*
- B**OMBIX *officinalis*. Le Ver
à soie , t. viij , p. 16 , pl.
750. *Insecte.*
- B**OS *Taurus*. Le Bœuf , t. ij ,
page 97 , planche 115.
Quadrupède.
- C**AMELLUS. Le Chameau ,
tome ij , p. 296 , pl. 71.
Quadrupède.
- C**ANCER *pagurus*. Le Cra-
he , t. iij , p. 90 , pl. 223.
Crustacée.
- C**ANIS *carcharias*. Le Re-
quin , t. vj , p. 273 , pl. 31.
Poisson.
Canis familiaris. Le
Chien , t. iij , p. 4 , pl. 197.
Quadrupède.
Canis Lupus. Le Loup ,
tom. iv , p. 309 , pl. 410.
Quadrupède.
Canis Vulpes. Le Re-
nard , t. vj , p. 263 , pl.
604. *Quadrupède.*
- C**APRA *hircus*. La Chèvre
commune , t. ij , p. 338.
pl. 192. *Quadrupède.*

- C**APRA *moschifera*. La Chè-
vre d'Afrique , tome ij ,
p. 346 , pl. 193. *Quadrup.*
- C**APRICERVA *occidentalis*.
Chèvre du Besoard occi-
dental , tome ij , p. 348.
Quadrupède.
- C**APRICERVA *orientalis*.
Chèvre du Besoard , t. ij ,
page 102 , pl. 93 et 193.
Quadrupède.
- C**APRIMULGUS *europæus*. La
Têtechèvre , tome vij , p.
294. *Oiseau.*
- C**ASTOR *fiber*. Le Castor ,
t. ij , p. 261 , pl. 159 , *bis.*
Quadrupède.
- C**ERVUS *alces*. L'Élan , t.
iij , p. 223 , planche 254.
Quadrupède.
Cervus elaphus. Le Cerf ,
tom. ij , p. 261 , pl. 159.
Quadrupède.
Cervus rangifer. La Re-
nue , t. vi , p. 263 , pl. 604.
Quadrupède.
- C**IMEX *lectuarius*. La Pu-
naise , t. vj , p. 195 , pl.
286. *Insecte.*
- C**OCCUS *caeti*. La Cochenil-
le , t. iij , p. 33 , pl. 209.
Insecte.
Coccus illicis. Le Ker-
mès animal , t. iv , p. 195.
Insecte.
- C**OLUBER *natrix*. Le Serpent
à collier , t. vij , p. 145 ,
pl. 673. *Amphibie.*
Coluber vipera. La Cou-
leuvre , t. viij , p. 80 , pl.
762. *Amphibie.*
- C**OLUMBA *cærulescens*. Le
Pigeon , tome vj , page

32, planche 559. *Oiseau*.
CORALLINA officinalis. La
 Coralline, t. iij, p. 74,
 pl. 233 *Ver*.

**CORALLUM album et ru-
 brum.** Le Corail blanc et
 rouge, t. iij, p. 71, pl.
 223. *Ver*.

CORVUS corax. Le Corbeau,
 tome iij, p. 75, pl. 122,
Oiseau.

COTURNIX officinalis. La
 Caille, t. ij, p. 193, pl.
 122. *Oiseau*.

CUCULUS canarus. Le Cou-
 cou, t. iij p. 88, pl. 228.
Oiseau.

CYNIPS quercus folii. La
 Noix de Galle, t. v, p.
 265.

CYPRINUS Carpio. La Carpe,
 tome ij, p. 248, pl. 110.
Poisson.

CYPRINUS trunca. La Tan-
 che, t. vij, p. 262, pl.
 110. *Poisson*.

ELEPHAS maximus. L'Éle-
 phant, t. iij, p. 229, pl.
 254. *Quadrupède*.

EQUUS asinus. L'Ane, t.
 j, p. 303, pl. 41. *Quadrupède*.

Equus caballus. Le Che-
 val, t. ij, p. 332, pl. 190.
Quadrupède.

Equus Mulus. Le Mu-
 let, t. v, p. 300, pl. 41.
Quadrupède.

ERINACEUS europeus. L'Hé-
 risson terrestre, t. iv, p.
 122, pl. 339. *Quadrupède*.

ESOX lucius. Le Brochet,
 tome ij, p. 166, pl. 110.
Poisson.

FORMICA rufa. La Four-
 mie, tom. iij, p. 341, pl.
 286. *Insecte*.

FRINGILLA carduelis. Le
 Chardonneret, tome ij,
 p. 314, pl. 182. *Oiseau*.

FELIS catus. Le Chat, t. ij,
 page 315, planche 183.
Quadrupède.

FRINGILLA domestica. Le
 Passereau ou Moineau,
 t. vj, p. 24. *Oiseau*.

Fringilla troglodites.

Le Roitelet, t. vj, p. 26,
 pl. 441. *Oiseau*.

FRINGILLARIUS Accipiter.
 L'Épervier, t. iij, p. 245.
 pl. 259. *Oiseau*.

GADUS Merlangius. Le
 Merlan, t. 5, p. 136. pl.
 45. *Poisson*.

GRILLUS acheta domesticus.
 Le Grillon domestique, t.
 iv, p. 74. *Insecte*.

*Grillus tettisonia viri-
 dissimus.* La Sauterelle,
 tome vij, p. 86, pl. 208,
Insecte.

HARANGUS flandricus. Le
 Hareng, t. iv, p. 92, pl.
 31. *Poisson*.

HIPPOTOTAMUS amphibius.
 Le Cheval marin, tome
 ij, p. 334, pl. 191. *Quadr.*

HIRUDO medicinalis. La Sangsue , t. vij , p. 56 , pl. 639. *Ver.*

HIRUNDO urbica. L'Hirondelle domestique , tome iv , p. 126 , planche 221. *Oiseau.*

HOMO sapiens. L'Animal raisonnable , t. iv , p. 129 , pl. 343.

HUSO germanorum. Grand Esturgeon , t. iij , 269 , pl. 266. *Poisson.*

LACERTA agetis. Le Lézard ver , tome iv , p. 258. pl. 391. *Amphibie.*

Lacerta aquatica. La Salamandre aquatique. tome vij , p. 21 , pl. 633. *Amphibie.*

Lacerta Salamandra. La Salamandre terrestre , t. vij , p. 21 , pl. 633. *Amphibie.*

Lacerta sincus. Le Scinc marin , t. vij , p. 118 , pl. 663. *Amphibie.*

Lacerta vulgaris. Le Lézard commun , tome iv , p. 256 , pl. 390. *Amphib.*

LEO latinorum. Le Lion , tome iv , p. 290 , pl. 411. *Quadrupède.*

LEPUS timidus. Le Lièvre , tome iv , p. 273 , pl. 376. *Quadrupède.*

LIMAX albus. Le Limaçon , tome iv , p. 277 , pl. 387 , *Insecte.*

Limax rufus. Grande Limace à couleur roussâ-

tre , t. iv , p. 276 , pl. 397. *Insecte.*

LUMBRICUS terrestris. Ver de terre , t. viij , p. 19 , pl. 453. *Ver.*

MADREPORA oculata. Le Madrepore , t. v , p. 3. *Ver.*

MATER perlarum. Nacre de perle , tome v , p. 230 pl. 50.

MELOE vesicatorius. La Cantharide , t. ij , p. 223 , pl. 139. *Insecte.*

MONOCEROS officinalis. Le Narwal , t. ij , p. 30 , pl. 70. *Poisson.*

MOTACILLA alba. Le Hochaqueue commun. La Lavandière , t. iv , p. 128 , pl. 342. *Oiseau.*

MURÆNA unicolor. L'Anguille , t. j , p. 312 , pl. 45. *Poisson.*

MUSCULUS ex cæruleo niger. Moule de mer , tome v , p. 174 , pl. 453. *Vermisseau.*

MUS Marmotta. La Marmotte , tom. v , p. 20 , pl. 420. *Quadrupède.*

Mus musculus. La Souris , t. vij , p. 195 , pl. 600. *Quadrupède.*

Mus rattus. Le Rat , t. vj , p. 247 , planç. 600. *Quadrupède.*

MUSTELA Herminea. L'Hermine , t. ij , p. 83. *Quadrupède.*

Mustela Lutra. La

Loutre, t. iv, p. 313, pl. 376. *Quadrupède*.

Mustela vulgaris. La Fouine, tom. ij, p. 81, tome iij, p. 338, pl. 285. *Quadrupède*.

ONISCUS *asellus*. Le Cloporte, tom. iij, p. 28, pl. 208. *Insecte*.

OSTREA *edulis* L'Huître, tome iv, p. 131, pl. 447. *Vermisseau*.

OTIS *tarda avis*. L'Outarde, tome v, p. 351, pl. 290. *Oiseau*.

OVIS *Aries*. La Brebis, tom. ij, p. 160, pl. 109. *Quadrupède*.

PARUS *major*. La grosse Mesange, t. v, p. 140 pl. 441. *Oiseau*.

PAVO *cristatus*. Le Paon, tome vj, p. 15, pl. 522. *Oiseau*.

PEDICULUS *humanus*. Le Pou, t. vj, p. 166, pl. 208. *Insecte*.

PERCA *fluviatilis*. La Perche, t. vi, p. 44, pl. 541. *Poisson*.

PHASIANOS *Gallus*. Le Coq et la Poule, t. iij, p. 66, pl. 221. *Oiseau*.

PHASIANUS *officinalis*. Le Faisan, t. iij, p. 289, pl. 271. *Oiseau*.

PHOCA *vitulina*. Le Veau Marin, t. viij, p. 10, pl. 748. *Poisson*.

PICUS *viridis*. Le Pic-Vert, tome vj, p. 69, pl. 555. *Oiseau*.

PROSCARABÆUS *officinalis*. Le Scarabé onctueux, t. vij, p. 3, pl. 164. *Insecte*.

RANA *Bufo*. Le Crapaud, tome iij, p. 94, pl. 231. *Amphibie*.

RANA *temporaria*. La Grenouille aquatique, t. iv, p. 71, pl. 321. *Oiseau*.

RHINOCEROS *unicornu*. Le Rhinoceros, t. vj, p. 285, pl. 611. *Quadrupède*.

RUPICAPRA. Le Chamois, tome ij, p. 343, pl. 193. *Quadrupède*.

SALMO *salar*. Le Saumon, tome vij, p. 83, pl. 541. *Poisson*

Salmo Trutta. La Truite, t. vij, p. 339, pl. 541. *Poisson*.

SCARABÆUS *cornutus*. Le Cerf-Volant, t. ij, p. 286, pl. 164. *Insecte*.

Scarabæus pilularis. Le Fouille-Merde, t. iij, p. 337. *Insecte*.

Scarabæus tridulus. Le Hanneton, t. iv, p. 90, pl. 164. *Insecte*.

SCIURUS *glis*. Le Loir, t. iv, p. 305, pl. 403. *Quadrup*.

Sciurus rufus. L'Écureuil, t. iij, p. 222. *Quadrupède*.

SCORPIO *europæus* Le Scorpion, tome vij, p.

122, planç. 665. *Insecte*.
SEPIA officinalis. La Sèche,
 tome vij, p. 129, pl. 670.
Vermisseau.
SPONGIA officinalis. L'É-
 ponge, tome iij, p. 254.
Ver.
STRIX flammea. La Frésaie,
 tome iij, p. 350, pl. 290.
Oiseau.
STUTHIUS arabicus. L'Au-
 truche, t. j, p. 419, pl.
 66. *Oiseau*.
SUS Aper. Le Sanglier. t. iij,
 p. 43, planç. 211. *Qua-*
drupède.
Sus scrofa. Le Cochon,
 tome iij, p. 40, pl. 211.
Quadrupède.

T *ALPA europæa*. La Tau-
 pe, t. viij, p. 265, pl. 515.
Quadrupède.
TAXUS raii. Le Blaireau,
 tome ij, p. 113, pl. 95.
Quadrupède.
TESTUDO terrestris. La Tor-
 tue terrestre, t. vij, p. 318,
 pl. 731. *Amphibie*.
TETRAO Perdrix. La Perdrix,

tome vj, p. 47, pl. 542.
Oiseau.
TRICHETUS manatus. L'A-
 mantin, t. iv, p. 235, pl.
 376. *Poisson*.
TRINGA squaterola. Le Van-
 neau, t. viij, p. 8, pl. 348.
Oiseau.
TUBUS marinus. L'Antale,
 tome j, p. 326, pl. 50.
Coquillage.
TURDUS marula. Le Merle,
 tome v, p. 138, pl. 342.
Oiseau.
TURTUR europæus. La
 Tourterelle, t. vij, p. 322,
 pl. 559. *Oiseau*.

V *IVERRA Zibetha*. La
 Civette, tome iij, p. 24,
 tome viij, p. 146. *Qua-*
drupède.
UMBILICUS masinus. Le
 Nombril de Vénus, t. v,
 p. 271. *Coquillage*.
UPU PA apops. La Hupe,
 tome iv, p. 142, pl. 348.
Oiseau.
URSUS arctos. L'Ours, t. v,
 p. 345, pl. 515. *Quadrup.*



